

Revista Științifică

« V. ADAMACHI »

S U M A R

George Mastacan. — Aplicația fenomenului de difracție al razelor X la studiul metalelor și al aliajelor (cu 5 figuri în text).

G. Alexa. — Fibre textile artificiale

Dr. I. Gheorghiu. — Observații și fapte experimentale asupra unei epizotii de cancer de cușcă la șoarecii albi (cu 5 figuri în text).

C. Lacrișeanu. — Evoluția sau transformismul evolutiv al ființelor, în starea de azi a cercetărilor biologice.

Andrei Incze. — Factorii climatici în cercetările de geografie și etiologie medicală (cu o hartă).

Ilie I. Popa. — Profesorul Gheorghe Țițeica (cu portret).

NOTE ȘI INFORMAȚIUNI

C. Moțaș: Pericolul aero-chimic și protecția populației civile; **Dr. Gr. Gr. Iamandi și Dr. veterinar M. Teclu:** Date epidemiologice asupra unui focar de ankylostomiază canină din Stepa Bălților; **Alexandru Obreja:** Limita de nord a „Masivului Bicului”; **Prof. Stan Ionescu:** Donația profesorului universitar Dr. Inginer Otin Cristea; **Elena Cozubschi:** Aspecte principale ale evoluției Chimiei în veacul al XX-lea; **E. C.:** Centenarul nașterii lui Ernest Solvay; **N. A. F.:** Conferințe; **R.:** Al II-lea congres internațional al Federațiunii Societăților Latine de Eugenică; **Personalia.**

DĂRI DE SĂMĂ

Lucie Manolescu-Pavelescu: Les phénomènes de coloration des dérivés de la thio-2-aryl-3-hidroxy-4-tetrahydro-1.2.3.4-quinazoline (*A. Barbos*); **G. Macovei:** Les gisements de pétrole (*Ion Atanasiu*); **Ion Simionescu:** Fauna României (*I. Șoarec*); **Aurelian A. Popescu:** Noui contribuțiuni la fauna lepidopterelor din București și împrejurimi (*A. Alexinschi*); **Teodoresco E. C.:** Sur les mouvements d'agglomération et de dispersion des zoospores d'algues (*Varvara V. Radu*); **Constantin Papp:** Caracterul florei împrejurimilor orașului Iași (*M. R.*); **Constantin Papp:** Contribution à la Bryogéographie des environs de Iași (II-ème Note) (*Mihai Răvuruț*); **Marie Celan:** Sur les chondriosomes, les plastes et les noyaux, au cours de l'évolution du cystocarpe chez Halophilys pinastroides (*C. Burduja*); **Const. Papp și Gh. Petcu:** Catalog de semințe oferite în schimb de Grădina Botanică a Univ. Mihailene din Iași (*M. R.*); **Marie Celan:** Nouvelles recherches préliminaires sur les synapses des Algues rouges (*C. Burduja*); **Ion T. Tarnavski:** Karyologische Untersuchungen an Halophyten aus Rumänien im Lichte Zyto-ökologischer und Zyto-geographischer Forschung (*Mihai Răvuruț*); **Dr. C. N. Cernescu:** Facteurs de climat et zones de sol en Roumanie (*Nat. Șenchea*).

LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ ROMÂNĂ

Prețul 50 Lei

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ «V. ADAMACHI»

APARE TRIMESTRIAL SUB ÎNGRIJIREA UNUI COMITET COMPUS DIN D-NII:

I. Simionescu (Profesor Univ. București), **Petru Bogdan**, **Const. Motăș**,
I. G. Botez, **Radu Cernătescu**, **Șt. Procopiu**, **T. Ionescu**, **I. I. Plăcinteanu**, **V. Zăhărescu**, **C. V. Gheorghiu** și **Const. Papp**
(Profesori la Universitatea Iași)

Tot ce privește redacția (articole, reviste, publicații) a se adresa D-lui **Prof. Petru Bogdan** sau D-lui **Prof. C. Motăș**.

Tot ce privește administrația (mandate, subvențiuni) să se trimeată D-lui **Prof. P. Bogdan** (Laboratorul de Fizică, Universitatea Iași).

ABONAMENTUL

Un an: 150 lei.

Pentru foștii bursieri ai Academiei din fondul V. Adamachi: 180 lei.

Pentru instituțiuni (laboratoare etc.): 200 lei.

Pentru studenți, preoți, învățători: 60 lei.

Abonamentele se plătesc înainte, după primirea primului număr.

Cei ce nu vor să se aboneze, sunt rugați cu insistență a face cunoscut prin o carte poștală sau a refuza primul număr.

Domnii colaboratori sînt rugați a ține în samă cele ce urmează:

a) Nu se pot tipări articole mai lungi de șase pagini de tipar, nici cu „urmare“; pentru fiecare notă și dare de samă, spațiul rezervat este cel mult 2 coloane.

b) Articolele să fie scrise de preferință la mașină, pe o singură pagină iar figurile definitiv desemnate, separat de text.

c) Colaboratorilor li se trimete numai înțuia corectură, dacă doresc.

d) Costul separatelor privește pe autori, care le comandă direct la tipografie.

Ele nu vor putea fi ridicate înainte de apariția revistei și vor purta subtitlul: „Extras din Revista științifică V. Adamachi“. Autorii care doresc separate sînt rugați să indice pe manuscris numărul lor.

e) Manuscrisele se publică în ordinea sosirii; cele nepublicate nu se înapoiază.

Pentru numerele neprimite, ad-ția nu răspunde; cei care doresc, pot căpăta revista recomandat, adăugînd la prețul abonamentului încă 34 lei.

Pentru orice schimbare sau completare de adresă, rugăm a fi vestiți.

Laboratorul de Geologie al Universității posedă colecția revistei noastre dela vol. IX — pînă la ultimul volum. Deasemeni există vol. VII, din care au apărut numai n-rele 1 și 2 din cauza războiului. Vol. I—VI inclusiv sînt complet epuizate, iar din vol. VIII ne lipsește nr. 1.

Prețul unui număr vechi, începînd dela vol. X înainte, este de 50 lei, iar acel al unui număr din vol. VII-IX, de 80 lei.

N. R.—Facem cunoscut cetitorilor noștri că subvenția acestei reviste a fost suprimată. Dacă dorește ea să mai apară, rugăm stăruitor să plătească abonamentele.

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ

«V. A D A M A C H I»

Vol. XXV. — Nr. 1.

Ianuarie-Martie 1939.

Aplicația fenomenului de difracție al razelor X la studiul metalelor și al aliajelor

de

GEORGE MASTACAN

Asistent la Lab. de Mineralogie, Universitatea Iași

Biblioteca U.S.A.M.V. Iași



X05616

În afară de numeroasele întrebări ale razelor X în medicină, grație proprietăților lor de a traversa corpurile opace, ele se întrebunțează în ultimul timp — cu mult succes — și în metalurgie pentru studiul intim al omogeneității pieselor metalice turnate.

Una din proprietățile care interesează în particular studiul metalelor și aliajelor, este proprietatea de difracție descoperită în 1912, de *Laue*, *Friederich* și *Knipping*, care dă posibilitatea să se întrevadă schema aranjării chiar a atomilor în corpurile cristaline și cu această ocazie să se studieze astfel structura agregatelor de cristale, care sînt metalele și aliajele lor.

Trecînd la studiul structurii metalelor cu ajutorul acestor raze, se constată, dacă considerăm un fascicol de raze X care cade pe un corp că: 1) o parte din raze traversînd corpul păstrează direcția, după ce a suferit totuși o scădere de intensitate care este în funcție de grosimea și natura păturilor traversate. 2) O parte va fi difractată de atomii, care devin oarecum, sub acțiunea razelor X, centre emițătoare de noi surse de lumină de aceeași frecvență (sau de frecvențe foarte puțin diferite, fenomenul Compton) ca și undele incidente.

Dacă atomii sînt dispuși ca în corpurile cristaline, după anumite legi simple, suprapunerea undelor de aceeași fază se va manifesta în anumite direcțiuni într'un fel permanent.

Acesta fiind fenomenul de difracție care va interesa în deosebi.

3) O parte va da naștere datorită unui fenomen intra-atomic, la raze secundare sau de fluorescență care pot fi sau raze X de lungime de undă diferită de aceea a razelor incidente sau raze catodice adică corpusculare.

Acestea interesează mai puțin ca cele difractate.

Înainte de a studia fenomenul de difracție al razelor X, este necesar a aminti cîteva noțiuni ce privesc corpurile cristalizate.

Atomii și moleculele care intră în edificiul unui cristal, sînt dispuși după un sistem determinat; acest aranjament regulat caracterizează starea cristalizată spre deosebire de starea amorfă.

În general, un corp cristalizat, ia o formă poliedrică cu fețe plane, mai mult sau puțin dezvoltate, cînd trece din starea lichidă sau gazoasă în stare solidă, sau cînd se depune dintr'o soluție solidă sau lichidă.

Metalele și aliajele se supun acestei reguli.

Să presupunem că divizăm un corp cu o structură cristalină dată, în elemente mici de volum, avînd fiecare cel mai mic număr de atomi posibili, cu con-

diția ca toate grupele astfel constituite să fie identice, la fel orientate și astfel aranjate, încât asocierea lor să permită să se reproducă cristalul în întregime.

Să alegem după aceea un punct care să aibă o poziție bine definită și bine determinată în fiecare din grupe, de exemplu centrul unuia dintre atomi și să ne servim de aceste puncte astfel alese pentru a indica poziția grupelor corespunzătoare. Vom putea, în acest fel, să neglijăm arhitectura mai mult sau mai puțin complicată a grupurilor de atomi și să nu ținem samă decât de punctele izolate astfel alese.

Se constituie în felul acesta un soi de schelet împrejurul căruia crește cristalul. Ansamblul punctelor de acest gen se traduce sub numele de rețea cristalină.

O serie de puncte din spațiu nu pot forma o rețea decât dacă ele satisfac anumite condițiuni, în particular fiind alese la fel în toate elementele de volum a structurii, situația lor, respectiv, a unora față de celelalte, trebuind să fie riguros aceiași.

Metoda următoare rezumă toate procedeele care se pot imagina pentru a desemna o rețea ținând cont de condițiunea precedentă: spațiul este divizat în elemente paralelipipedice prin trei serii de plane paralele care se intersectează unele cu altele, planele unei serii sînt equidistante, dar distanța între plane poate varia dela o serie la alta și cele trei serii pot să facă între ele unghiuri diferite.

Unirea tuturor punctelor de intersecție a planelor constituie o rețea, iar punctele lor de intersecție se numesc noduri.

Planul ce trece prin trei noduri ale rețelei, este numit plan reticular.

Să considerăm o serie de particule, toate situate în același plan și, evident, paralel cu o serie de plane reticulare. Acestea reprezintă atomii ce constituiesc centrele, care fac să disperseze undele electromagnetice, razele X.

Cînd se imprimă o mișcare acestor atomi, fiecare dintre ei emite atunci o pulsație difractată, de aceeași frecvență care se propagă după o undă sferică. Toate undele difractate de diferiții atomi ai planului reticular au ca înfășurată o undă reflectată R , care este plană dacă unda P este ea însăși plană.

Folosindu-ne de o construcție analoagă cu aceea a lui Huygens în cazul reflexiunii luminii pe o suprafață plană, se vede că razele reflectate sînt simetrice cu razele incidente față de norma la planul care conține atomii (fig. 1).




Fig. 1.




Fig. 2.

Ori, într'un cristal, planului BB' îi corespund o infinitate de plane paralele p , equidistante; aceste diverse plane vor reflecta undele, însă pentru fronturi de unde monocromatice de lungime de undă λ va exista o incidență: $\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$ pentru care undele reflectate de diversele plane se vor suprapune, și pentru această incidență constatăm existența maximului de intensitate a fenomenului de reflexiune (fig. 2).

Maximul de intensitate va fi cînd se va avea:

$$A' B' C = ABC + \lambda \text{ sau } ABC + 2\lambda \text{ etc.}$$

$$A'' B'' C = ABC + 2\lambda \text{ „ } ABC + 2(2\lambda) \text{ etc.}$$

$$A''' B''' C = ABC + 3\lambda \text{ „ } ABC + 3(2\lambda) \text{ etc.}$$

Să ducem normala BN la A'D, vom avea atunci:

$$A' B' C - ABC = A' D - A' N = ND = 2d \sin \theta \text{ deci } \lambda = 2d \sin \theta.$$

La fel $A' B' C - A' B' C = 2d \sin \theta$ și așa mai departe.

Dacă fazele nu sînt în perfectă concordanță, adică dacă DN diferă foarte puțin de λ de exemplu $1/1000 \lambda$, atunci miile de fronturi de undă reflectată ar prezenta între ele diferență de fază oarecare și amplitudinea resultantă ar fi nulă.

Se vede prin urmare că, dacă un front de undă monocromatică cade pe o serie de plane reticulare, nu va exista reflexie decît pentru anumite valori bine determinate ale unghiului θ date de relațiile:

$$\lambda = 2d \sin \theta_1$$

$$2\lambda = 2d \sin \theta_2$$

$$3\lambda = 2d \sin \theta_3$$

$$\dots \dots \dots$$

Aceste relațiuni au fost descoperite de savantul englez Bragg.

Reflexiunea corespunzînd lui θ_1 este numită reflexiune de prim ordin, cea a lui θ_2 reflexiune de ordinul 2 și așa mai departe.

În fine planele cele mai simple sînt cele paralele cu fețele de cristal; sînt cu alte cuvinte cele care vor reflecta mai intens undele primite și numai pe aceste plane fenomenele de reflexiune sînt ușor de observat.

Măsura unghiurilor $\theta_1 \theta_2 \dots$ dă o relație între λ și d (d fiind una din constantele rețelei). Întrebuințînd o aceeași față cu putere de reflexie și diferite radiațiuni, se pot observa lungimile de undă de vibrațiuni monocromatice.

Întrebuințînd, din contra, o aceeași vibrație, se poate observa distanța relativă a diverselor fețe ale unui aceluiaș cristal sau la cristale diferite.

Plecînd dela teoria lui Bragg, se pot descrie principalele metode actuale întrebuițate în metalurgie pentru aplicarea razelor X la studierea proprietăților metalelor:

1) Metoda Laue; 2) Metoda Cristalului turnant; 3) Metoda Debye și Sherrer și 4) Metoda Diagramelor din fibre.

1. Metoda lui von Laue. Un fascicol de raze X complex se obține, de exemplu, utilizînd 2 ecrane E de plumb de 2-5 milimetri grosime, prevăzute fiecare cu o gaură de un diametru de cîteva zecimi de milimetru, aranjate la cîteva centimetri una de alta și aliniate pe direcția razelor focale ale unui tub de raze X.

Cristalul de studiat este fixat cu ceară pe un plan ce se poate învîrți. Filmul sau placa fotografică este închisă într'o cutie de lemn sau de aluminiu și este

căptușită pe suprafața anterioară cu o hîrtie neagră în centrul căreia s'a lipit o mică rondelă de plumb, destinată să ascundă fascicolul direct (fig. 3).

Din cele ce am văzut, fascicolul incident trebuie să dea un număr de fascicule reflectate de fețele de clivaj ale cristalului. Fiecare din aceste fascicule, care se supune relației lui Bragg corespunde la o întreagă serie de plane reticulare și la o oarecare radiațiune.




Fig. 3.

Se constată că, se obține pe placa fotografică o serie de urme constituind diagrama lui Laue. Aceste urme sînt simetric repartizate pe elipse a căror urmă centrală este un punct. Toate celelalte urme situate pe o aceeași elipsă, provin din plane reticulare paralele cu o aceeași dreaptă.

Din examenul diagramelor lui Laue, se poate deduce sistemul de simetrie al cristalului, chiar în lipsa tuturor fețelor naturale de clivaj, avînd deaface numai cu un simplu fragment de cîțiva milimetri, rupt într'un mod oarecare.

2. Metoda cristalului turnant. Am văzut după metoda stabilită de Bragg, că dacă un fascicol de raze heterogene lovește o lamă cristalină, a căror plane reticulare sînt distanțate de d nu se reflectă decît raza care satisface relația: $n\lambda = 2d \sin \theta$, adică numai razele de lungime de undă: $2d \sin \theta$, $d \sin \theta$, $\frac{2d \sin \theta}{3}$, $\dots$, $\frac{2d \sin \theta}{n}$ ceiace ne dă imediat posibilitatea de a analiza un fascicol de raze X făcînd să varieze unghiul θ . Această variație poate să se obțină făcînd să se învîrtească ușor lama cristalină împrejurul unei paralele la planele reticulare de distanța d . Ele vor reflecta succesiv toate radiațiunile a căror lungime de undă este $< 2d$. Aceste raze reflectate, primite pe o placă fotografică sau pe un film, vor da o serie de raze constituind spectrul fascicolului de raze al anticatodei utilizate, raze care provin în realitate din deplasarea unei pete a lui Laue.

Invers, utilizînd razele X monocromatice se poate determina distanța reticulară a planelor cristaline, paralele cu axa de rotație a cristalului și determina astfel structura. Ea se potrivește în particular pentru studiul fasciculelor de raze X emise de anticatoda constituită din substanța de examinat.

3. Metoda Debye-Sherrer sau a pulberii microcristaline. De Broglie în 1914 în Franța, Debye și Sherrer în 1916 în Germania și Hull în America, au indicat o metodă a cărei importanță practică este considerabilă și care a dat indicații foarte importante în ceiace privește structura metalelor, aliajelor, pulberilor, etc.

Principiul metodei este următorul: Se ia o pulbere cristalină foarte fin fărâmițată și se proiectează asupra ei un fascicol de raze X monocromatice. Este ușor de închipuit că microcristalele se prezintă sub toate orientările posibile față de fascicolul incident; însă întotdeauna vom avea și granule orientate în așa fel, încît să satisfacă relația lui Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

încît distanța între planele reticulare ale microcristalelor să fie cel puțin egală cu $\lambda/2$. Un plan reticular, făcînd unghiul θ cu fascicolul incident se va reflecta după un fascicol care ar face unghiul 2θ cu direcția incidentă; cum fenomenul este de revoluție, toate fasciculele reflectate după unghiul 2θ vor forma un con de revoluție, avînd ca deschidere 4θ și ca axă fascicolul incident.

Intersecția acestui con cu placa fotografică va da un cerc. Prin urmare clișeuul va fi format din cercuri concentrice (fig. 4).

Dacă notăm cu r raza unuia din aceste cercuri, cu a distanța substanță-placă se va avea:

$$r = a \operatorname{tg} 2\theta$$

ceiace permite să se calculeze θ și prin urmare λ sau d .

Dacă în loc de o placă plană se întrebuintează un film cilindric centrat împrejurul substanței care radiază, se va obține raza reflectată sub toate unghiurile, în timp ce cu placa plană nu s'ar putea obține cercuri provenind din unghiuri superioare lui 45° . În acest caz figurile obținute sînt intersecția unui con de revoluție și a unui cilindru a cărui axă este perpendiculară pe aceia a cercului.

Dacă notăm cu R raza unui film cilindric și cu $2l$ distanța între 2 raze simetrice, vom avea :

$$2l = R \times 4\theta$$

Cu cît o rază este vecină centrului, cu atît distanțele reticulare corespondent sînt mai mari și invers.

Interpretarea diagramelor Debye-Sherrer este extrem de complicată cînd este vorba de sisteme cristaline puțin complicate. Ea este cu toate acestea relativ ușoară pentru sistemul cubic, care este în adevăr sistemul cel care se întîlnește în general în metalurgie. În loc de pulbere fină se poate examina o parte din metal care nu este altăceva decît o aglomerație de microcristale. Teoria este evident identică.

4. Metoda diagramelor din fibre (Faserdiagrame). Am văzut că o masă cristalină, compusă din elemente ce ar prezenta toate orientările posibile, ar da o diagramă compusă din cercuri concentrice.

Să considerăm o substanță compusă din aceleași elemente cristaline, dar în loc să fie dispuse la întîmplare, să prezinte o orientare definită, datorită, de exemplu, unei acțiuni mecanice, laminaj sau unei acțiuni fizice cum ar fi răcirea într-o anumită direcție mai mult sau mai puțin lentă.

Razele difractate se vor proiecta totdeauna pe conul de deschidere $4\theta_1$, $4\theta_2$ etc., după cum s'a văzut în cele de mai înainte. Dar intensitatea, în loc să fie repartizată uniform în lungul inelelor, va fi în general localizată după anumite porțiuni ale acestor inele. Inelul complet se va găsi astfel divizat într'un oarecare număr de arcuri de deschidere variabilă.

Insuși aspectul acestor diagrame caracterizează o distribuție disimetrică a cristalelor împrejurul fascicolului incident.

Distribuirea porțiunilor întărite pe cercurile lui Debye-Sherrer ar varia dacă s'ar schimba orientarea masei cristaline față de direcția razelor X. Repartiția intensității în lungul inelelor de difracție ar permite să se pună în evidență anisotropia statică a distribuției granulelor cristaline și a calcula cantitativ modul lor de aranjare sau felul de orientare în substanța primitiv isotropă.

Un metal tras sau laminat, sau un fir metalic poate să fie considerat ca o aglomerare de cristale foarte mici, avînd o orientare comună, care este direcția de laminaj sau axa firului. Dispoziția cristalelor, și prin urmare a planelor reticulare împrejurul unei axe, se găsește deci realizată cu această ocazie automat. Ne putem deasemenea da sama de o cantitate destul de mică din metal în stare de ecruisaj.

Dacă avem deaface cu un fir, se așează așa fel, ca axa sa să fie normală pe fascicolul incident. Dacă-i vorba de o placă laminată, să așează normal pe fascicolul incident.

După ce am văzut care sînt metodele, să vedem acum la ce servesc.

1. *Determinarea structurii atomice a metalelor și aliajelor.* Metalele se prezintă de ordină sub formă de agregate compuse dintr'un număr mare de microcristale și cîteodată sub formă de cristale cu dimensiuni destul de mari. În primul caz, aplicația metodei Debye-Sherrer este cea mai indicată, în al doilea caz, se pot examina prin metoda lui Laue.

Rezultatele obținute pot fi controlate grație observațiunilor următoare : la




Fig. 4.

fiecare specie de rețea corespunde un număr determinat de atomi pe ochi de rețea. Acest număr este determinat prin analiza cu razele X.

Pe de altă parte, dacă ρ este densitatea metalului, d latura ochiului (e vorba de sistemul cubic în cazul considerat) M greutatea atomică împărțită prin numărul lui Avogordo ($N=6,07 \times 10^{23}$) acest număr este dat de relația:

$$n = \frac{\rho d^3}{M}$$

care permite deasemeni să se calculeze d dacă cunoaștem pe n . Acest rezultat bazat pe o ipoteză, este găsit totdeauna în acord remarcabil cu rezultatele obținute cu ajutorul razelor X.

În ce privește aliajele, studiul cu ajutorul razelor X, este posibil de făcut numai în cazul când se întâlnesc aliaje cu o singură fază.

Se disting 2 categorii de aliaje cu fază unică: acele a căror cristale sînt de o compoziție definită și aliajele cu soluții solide; această soluție solidă posedă proprietatea de a exista într-o singură fază, pentru o întreagă serie de compoziții cuprinse între oarecare limite.

Cristalele cu o compoziție definită dau la razele X o diagramă caracteristică, care s'ar putea interpreta după metodele obișnuite; soluțiunile solide au o structură mai dificilă de stabilit.

2. *Determinarea mărimii granulelor.* Cunoașterea mărimii granulelor unui metal sau, mai bine, a numărului mediu de cristale mici într'un volum dat, prezintă în metalurgie un deosebit interes.

Studiul secțiunilor micrografice permite să se ajungă deja la un grad de mărime, mai ales când numărul cristalelor este mic pentru o suprafață lucietă dată.

Întrebuințarea razelor X dă posibilitatea de extindere a acestor cercetări și prezintă în afară de aceasta avantajul de a nu necesita decît o cantitate destul de mică de substanță care nu are nevoie de nicio preparație specială; mai mult, metoda se aplică la substanțele microcristaline sau la coloide. Ea prezintă deci o mare importanță.

Determinarea mărimii granulelor metalelor se poate face prin 2 procedee, fie utilizînd un fascicol de raze complex (metoda lui Laue), fie un fascicol de raze monocromatice (metoda Debye-Sherrer).

a) *Principiul metodei lui Laue.* Luminînd cu ajutorul unei anticatode de tungsten, funcționînd de exemplu sub 80—100.000 volți un singur cristal, se obține pe placa fotografică urme caracteristice. Dacă în loc de un cristal se găsesc două, se găsesc 2 figuri a lui Laue suprapuse la întîmplare și din a căror urme va rezulta dispoziția celor 2 cristale.

Cu cît deci numărul de cristale va fi mai mare, cu atît mai numeroase vor fi urmele așa fel că examenul comparativ al clișeeilor va permite să se fixeze un ordin de mărime, destul de apropiat de numărul cristalelor pe elementul de volum, adică tocmai dimensiunile lor.

b) *Principiul metodei Debye-Sherrer.* Operînd cu un fascicol de raze monocromatic, care cade pe un mic fragment de metal, se vor obține inele a căror structură poate să aducă indicații asupra mărimii mijlocii a granulelor. Este suficient să avem cîteva clișee tip corespunzînd la dimensiuni cunoscute pentru a putea, prin simplă comparare, să fixăm un ordin de mărime a organelor din proba de studiat. Evident că, trebuie să se opereze cu fragmente de aceeași grosime. Pe măsură ce dimensiunea granulelor scade, razele sau cercurile obținute devin din ce în ce mai clare și homogene.

3. *Studiul tensiunilor interne în metale.* Cînd un cristal este deformat dincolo de limita sa elastică, figurile lui Laue obținute, mai întîi eliptice, se alungesc

considerabil și diagrama ia atunci un aspect cu totul particular de striuri de asterism (fig. 5).

Se admite astăzi că eforturile exterioare sau contracțiunile termice aduc o alunecare a diferitelor plane reticulare în acelaș timp cu o distorsiune sau o curbura împrejurul unor oarecare direcțiuni cristalografice.

Reflexiunea razelor X nu se face numai pe plane dar și pe suprafețe cilindrice, de unde rezultă alungirea urmelor și producerea acestor dire radiale. Dacă, în loc de un singur cristal, se supune la deformare mecanică sau tratamente termice un ansamblu întreg de microcristale, ceiace ar constitui de ex. o foaie metalică; efectul produs este suma efectelor elementare și se obține astfel, prin metoda lui Laue, diagrame sau figuri cu numeroase trăsături radiale caracteristice tensiunii interne.

Apariția fenomenului de asterism este deci o probă de prezența tensiunilor interne. Se poate ușor da sama de importanța acestor tensiuni prin comparație cu clișeele tip.

4. *Studiul ecruisajului.* Se face cu ajutorul metodei „Diagramelor de fibre” (Faserdiagrame). Prin compararea cu probele tip se poate ușor da sama de gradul de ecrisaj, de exemplu în cazul tragerii firelor metalice sau a laminării tablei de fier.

5. *Studiul coacerit după ecrisaj. Recristalizarea.* Cristalele lucrate la rece suferă schimbări în timpul încălzirii, traducându-se în general printr'o întoarcere la proprietățile metalului nelucrat și la o recristalizare.

Grație spectrografiei, putem cunoaște mărimea medie a cristalitelor, după cum s'a indicat, și putem urmări schimbările acestor dimensiuni prin tratamente termice sau mecanice, cât și fenomenele de dezorientare sau de recristalizare care le însoțesc.

BIBLIOGRAFIE

M. Savul. — Structura reticulară a cristalelor metalelor. Rev. Adamachi, XXIII, 1937.

W. L. Bragg. — Rayons X et structure cristalline.

Schiebold. — Methoden der Krystallstrukturbestimmung mit Röntgenstrahlen.

J. J. Trillat. — Les applications des rayons X.


Jean Tibaud. — Les rayons X, 1930.

Maurice de Broglie. — Les rayons X, 1922.

R. Ledoux-Lebord et A. Douvillier. — La physique des rayons X, 1921.



Fig. 5.



Fibre textile artificiale

de

G. ALEXA

Conferențiar la Școala Politehnică din Iași

lăta o mare industrie, care cu toate că nu e prea veche, totuși s'a dezvoltat enorm, considerînd cantitățile mari de textile artificiale care se produc și se consumă anual. Între aceste produse, mătasa artificială stă în fruntea tuturor. Dela început trebuie să menționăm că, acest produs nou n'are nici o relațiune cu mătasa naturală, secretată de viermii de mătasă (*bombix mori*), cunoscută de Chinezi cu 2600 ani înainte de Christos. Din punct de vedere chimic, mătasa naturală este formată din 60—70% fibroină (constituentul fundamental al mătasei pure) și din 25—35% sericină, ambele de natură albuminoidă.

Mătasa artificială este o invenție a chimiei moderne, o nouă cucerire a științei, și din punct de vedere chimic, nu este altceva decît o celuloză hidratată, care păstrează toate caracterele generale ale produșilor vegetali. Se aseamănă cu mătasa naturală numai în ceiace privește strălucirea ei, și cîteodată strălucirea mătasei vegetale este chiar mai mare. Materia primă care servește la fabricare mătasei artificiale este celuloza, această minunată substanță de compoziție așa de simplă, formată din C, H și O, însă a cărei moleculă este așa de complexă.

Compoziția chimică a celulozei. Obîșnuit se atribue celulozei formula $(C_6H_{10}O_5)_n$. Nu se cunoaște valoarea lui n , dar, în celuloza de bumbac, trebuie să fie destul de mare. Dacă considerăm formula simplă în care $n=1$, constituția sa este încă foarte mult discutată. În general se admite formula $C_6H_7O_2(OH)_3$ în care se găsesc trei grupe alcoolice, esterificabile, iar pentru a explica formarea derivatului undecantric, care se formează prin nitrarea celulozei, trebuie să considerăm un multiplu al acestei formule, adică $C_{24}H_{28}O_8(OH)_{12}$. De oarece celuloza dă la hidroliză numai glucoză, este aproape sigur că ea rezultă din asocierea mai multor molecule de glucoză, probabil prin anhidrisare. Celuloza este deci o polioză.

Structura fizică a celulozei. Dacă celuloza este întrebuințată la fabricarea textilelor artificiale, aceasta se datorește în primul loc structurii sale fizice. Prin radiografie și prin procedee moderne de investigații, s'a încercat a se cunoaște structura intimă a compușilor fibroși naturali și artificiali și s'au obținut rezultate interesante. *P. Scherrer, R. Herzog și W. Jancke*, au arătat că fibrele celulozice naturale, cum și acelea care derivă din ele, se prezintă sub formă de agregări de cristaliți, înțelegîndu-se sub această denumire microcristali filiformi, care nu sînt caracterizați printr'o formă cristalină externă definită, însă în timp ce în fibrele naturale acești cristaliți sînt dispuși în sensul lungimei, paralel cu axa însăși a fibrei sau formează cu ea un unghi determinat și constant, în fibrele artificiale, structura fizică depinde de modul cum aceste fibre au fost tratate: cu cît aranjarea cristaliților se apropie de structura fibrei naturale în care toți cristaliții sînt orientați, în mod precis, cu atît rezistența fibrelor artificiale va fi mai mare, așa fel că uneori această rezistență a produșilor artificiali poate atinge și chiar să întrecă pe aceia a produșilor naturali. Diagrama la razele X permite să se determine dimensiunile cristaliților. Admițînd o formă cubică pentru aceste elemente, se găsește pentru fibrele naturale o latură de 100 Å, (angströmi) sau 10^{-6} cm. În realitate, e mai verosimil să se admită cristaliți de formă pris-

matică. Cercetările experimentale făcute de *Herzog* au arătat, că în cazul unei acțiuni chimice moderate, acțiune ce are loc întotdeauna cînd se prepară celuloza, cel puțin elementul substanței care se găsește într'un cristalit, străbate aceste acțiuni fără să se desagrege.

Dacă se nitrează celuloza nativă și apoi se denitrează, observînd totuși condiții experimentale determinate, se poate deduce din diagrama obținută cu razele X, că între mărimea particulelor fibrei primitive și aceea a fibrei denitrate nu este o diferență apreciabilă.

În practică însă izolarea fibrelor celulozice din materiile brute nu este posibilă fără a cauza, pînă la un punct, o alterare a formei și a structurii micelare. Tratatul în vederea obținerii fibrelor va fi mai mult sau mai puțin accentuat, după gradul impurităților ce întovărășesc întotdeauna fibrele celulozice. În cazul bumbacului, acest tratament va fi mult mai ușor, de oarece bumbacul este celuloză aproape curată; din contra, pentru extragerea celulozei din lemn, e nevoie de unele operații fizice și chimice foarte drastice cum sînt: sfărîmarea lemnului și fieberea lui cu soluții acide sau alcaline la temperaturi și presiuni ridicate timp de mai multe ore, după care urmează o înălbire cu hipocloriții.

Tratamentele acestea au o influență esențială asupra celulozei, deoarece particulele elementare n'au rămas intacte, ci au fost fragmentate, cristalii nativi fiind desagregați, desagregarea continuîndu-se apoi în cursul operațiilor succesive, necesitate de fabricarea mătasei artificiale. Trebuie deci de lucrat în astfel de condiții, încît particulele inițiale să păstreze caracterul lor primitiv, atît ca mărime cît și ca aranjament inițial, deoarece proprietatea produsului terminat va fi din punct de vedere al elasticității, al turgescenței, colorării și tenacității cu atît mai bun, cu cît starea primitivă a particulelor fibrei va fi fost mai puțin modificată. În ultimii anii s'a lucrat mult pentru găsirea unei metode, care ne-ar permite determinarea proprietăților fizice ale celulozei, pentru a putea apoi judeca asupra întrebunțărilor, ce am putea să-i dăm. Mijloacele fizice și chimice de laborator nu pot spune exact dacă o celuloză oarecare poate fi întrebunțată într'un scop determinat. Metodele de investigație care se aplică pastelor de celuloză se referă la: rezistență, rupere, îndoire, destrămare. Examenul individual al fibrelor, foarte delicat și încă susceptibil de cercetări, ca și încercările chimice, ca de exemplu la înălbire, pot să aducă lămuriri utile, însă numai încercările quasi-industriale făcute asupra pastei de celuloză ar putea să ne dea indicații mult mai sigure asupra produselor, ce ar putea fi obținute în condiții determinate.

Celuloza pentru mătasa artificială. Materialul brut pentru fabricarea celulozei nu se limitează astăzi numai la bumbac, ci se face apel și la celuloza din lemn, (coniferele în general și fagul) preparată după metoda bisulfidului de calciu. Întrebunțarea celulozei din lemn n'a fost posibilă decît atunci cînd s'a putut fabrica o celuloză, a cărei puritate să fie apropiată de aceea a celulozei de bumbac. În lemn, celuloza, nu este curată ci amestecată cu o mulțime de substanțe străine și anume: lignina, hidroxi de carbon diferiți ca: pentozane și hexozane, materii minerale, materii colorante, materii tanante, rășină, etc. Procedeele tehnice n'au ajuns pînă acolo ca să poată elimina complet substanțele străine care întovărășesc celuloza de lemn, așa încît în acest fel de celuloză se mai găsesc cantități considerabile de materii străine. Cenușa în celuloza de lemn, după metoda bisulfidului, este formată în cea mai mare parte din săruri de calciu (carbonat, sulfat, sulfid); ea trebuie să fie cît mai mică pentru a evita orice neajuns în procesul chimic de transformare a celulozei în mătasă artificială. Dacă se tratează celuloza cu o soluție de sodă caustică, se constată că o parte se dizolvă iar o parte rezistă la acțiunea sodei; aceasta din urmă se numește α celuloză. Cu cît procentul în α celuloză este mai mare cu atît celu-

loza este mai apreciată. Această apreciere nu este numai din punct de vedere economic (pierderea mai mică în timpul tratării cu sodă), ci și din punct de vedere tehnic, deoarece o celuloză, care are un procent mai mare de alpha celuloză, dă o mătăsă mai rezistentă și mai fină.

Dacă procentul în alpha celuloză este scăzut, aceasta se datorește faptului că celuloza, în timpul diferitelor operații, a fost considerabil degradată și chiar părțile rezistente au suferit de pe urma acestor degradări.

Pentru mătasa artificială este necesar să se întrebuițeze o celuloză de o calitate foarte omogenă, pe cât posibil pentru a obține un produs filabil, care să prezinte aceleași caractere și să dea după filatură o mătăsă cu proprietăți fizice și chimice cât mai invariabile posibil.

Se ajunge la aceasta, într-o oarecare măsură, alegând arbori de același vîrstă. După *M. Lufft* (1927), iată compoziția celulozei din lemnul de pin, obținută după procedeul bisulfidului, în comparație cu celuloza de bumbac (linters).

	Celuloza %	
	de pin	linters
Alpha celuloză	89,30	98
Hemi celuloză	10,10	1,80
Materii rășinoase	0,88	0,34
Cenușa	0,28	0,12
Indicele de Cupru	2,00	0,89

Astăzi se livrează în comerț așa numita „Rayon alpha fibre“ obținută după procedeul *Brown*, și care prezintă numeroase avantagii pentru industria mătasei artificiale. Această celuloză are următoarele caracteristici: Alpha celuloză $> 95\%$; Rășină $= 0,2\%$; Cenușă $< 0,06-0,07\%$; Indicele de Cupru $= 2,00\%$.

Procedeiele întrebuițate pentru fabricarea mătasei artificiale. Cu toate că această industrie este de dată recentă, totuși mătasa artificială are un istoric foarte interesant. Încă din 1734 *Réaumur* întrevăzuse posibilitatea de a prepara fire strălucitoare, asemănătoare mătasei, plecînd din substanțele gumoase sau viscoase, iar la 1885 *Audemars*, la Lauzana, încearcă să pună în aplicare ideia lui *Réaumur*, fără a reuși însă.

În 1885, contele *Hilaire de Chardonnet* din Besançon luă un brevet pentru fabricarea mătasei artificiale prin filarea unei soluții de colodiu, iar la 1889 el expune la expoziția internațională din Paris, primele fibre de mătăsă artificială, care formează nucleul marelui industrii, ce avea să se dezvolte mai tîrziu. Procedeul primitiv al lui *Chardonnet* constă în a fila o soluție de colodiu (o soluție de nitroceluloză într'un amestec de alcool și ether). Firele astfel obținute prezentau inconveniente foarte grave, căci se descompuneau spontan și erau foarte inflamabile. Din această cauză nu s'a putut ajunge la un produs comercial decît atunci cînd (1893) s'a procedat la denitrarea produsului format prin 'tratarea fibrelor de mătăsă cu sulfhidrați alcalini, care regenerează celuloza hidratată, stabilă și nealterabilă. Acest procedeu se mai execută și astăzi în uzinele din *Tubize* (Belgia) și în sucursalele acestei uzine din Polonia, Ungaria, Statele-Unite. În Franța, acest procedeu este părăsit și societatea „Soie artificielle française“ dela *Reims*, creată de *Chardonnet*, a încetat de a mai funcționa încă din anul 1925. *Chardonnet* a avut fericirea să vadă, înainte de a muri industria sa la apogeu.

În 1890, *Despeissis* ia un brevet pentru fabricarea mătasei după un alt procedeu cupro-amoniacal devenit „*Glantzstoff*“ sau mătasa *Pauly* sau încă *Fremery-Urban*. După acest procedeu, hidroceluloza (bumbac mercerizat) dizolvată în oxid de cupru amoniacal este filată prin tuburi de sticlă capilare foarte fine. Vechiul procedeu a lui *Despeissis* a suferit numeroase modificări aduse de *Pauly*, *Bronnet*, *Fremery*

și *Urban*, iar fabricarea, în diversele stabilimente, a fost întreprinsă de „*Vereinigte Glantzstoff Fabriken d'Elberfeld*“. Acest fel de mătăsă a făcut timp de mai mulți ani o concurență foarte serioasă mătasei *Chardonnet*, în așa fel că foarte mulți fabricanți au trebuit să aplice noul procedeu cupro-amoniacal, care era mai economic, iar acesta la rîndul lui a trebuit să cedeze locul procedeuului „*Viscoza*“ care-i mai economic și dă produse de calitate superioară.

În 1891, *Cross* și *Bevan* descoperiră că tratînd alcali-celuloza cu sulfură de cupru se obține un produs sodioxantat de celuloză, solubil în soluții alcaline diluate. Această preparare a fost perfecționată în 1903 de *M. Stearn* și de atunci, după învingerea numeroaselor dificultăți pentru obținerea unui produs regulat și coagulabil, acest nou procedeu a intrat triumfător în practica industrială, așa fel că astăzi 88% din totalul mătasei artificiale se prepară după acest procedeu, denumit procedeul *viscoză* și numai 1% reprezintă mătasa cupro-amoniacală, 8% mătăsă *Chardonnet*, iar 3% se fabrică după un procedeu cu totul nou, procedeul aceto-celuloză. Pentru produsele curente și de mare consum, mătasa *viscoză* își va menține locul preponderent, cel ocupă astăzi; pentru specialități, însă mătasa *Glantzstoff* prezintă unele avantagii, deoarece ea permite să se obțină fire strălucitoare și foarte fine. În comerț, această mătăsă este cunoscută sub numele de „*Eagle Brand*“. În ultimul timp s'au creat noi fabrici în Franța, Anglia, Statele Unite, care exploatează procedeul *Thielle-Bember* (*Bembergseide*).

Un alt procedeu de dată foarte recentă este acel al *acetatului de celuloză* preconizat de *Cross* și *Bevan* la 1894.

Am arătat în unul din numerile acestei reviste (vol. 21, Nr. 1, 1935) cum se fabrică acetatul de celuloză, care este întrebuițat foarte mult la fabricarea de lacuri neinflamabile și la fabricarea mătasei artificiale, numită mătasa de acetat.

În timpul războiului acetatul de celuloză nu era întrebuițat decît pentru fabricarea lacurilor neinflamabile, întrebuițate pentru vernisarea aripelor de avion. După război, ne mai cerîndu-se acetatul în cantități în care se fabrica, *Camille* și *Henry Dreyfus* care se specializaseră în fabricarea acetatului de celuloză, s'au gîndit atunci la întrebuițarea acetatului de celuloză pentru fabricarea mătasei artificiale. După încercări lungi și costisitoare au reușit, în 1925, să dea un produs nou numit „*Rhodiaseta*“, care nu era altceva decît o nouă mătăsă artificială.

Această mătasa prezintă unele caractere de superioritate față de celelalte mătăsuri deoarece are o rezistență în stare umedă mai mare, fiind aproape ca aceia în stare uscată. Din această cauză se poate întrebuița la fabricarea stofelor lavabile. Societatea franceză „*Rodiaseta*“ a fost prima care a fabricat sub denumirea de *Albene* firul de mătăsă mat cu care s'a putut face acel satin „peau d'ange“, care este așa de apreciat.

Deasemenea proprietățile izolante, din punct de vedere al căldurii, au permis fabricarea de stoffe foarte plăcute la purtat (cămașa *Lacoste*).

Deasemenea firul de acetat este întrebuițat ca izolant pentru firele electrice.

Procedeul „Viscozei“. În cele ce urmează vom descrie mai pe larg procedeul „*Viscoza*“ ca fiind cel mai important, adoptat peste tot. Țara noastră, care era tributară străinătății pentru firele de mătăsă artificială a început de curînd să fabrice, prin cele două fabrici deja existente — una la București și alta la Lupeni — cantități importante de mătăsă după procedeul „*Viscozei*“.

Am arătat că procedeul viscozei este cel mai important dintre toate procedeele de fabricarea mătasei artificiale. Începînd cu inventatorii acestui procedeu, *Cross* și *Bevan*, care au studiat acest procedeu și pînă astăzi numeroase lucrări au fost făcute, pe deoparte pentru ameliorarea procedeuului, iar pe de altă parte, pentru a explica diferitele fenomene fizico-chimice care au loc în prepararea viscozei. Spre deosebire

de celelalte procedee, procedeul acesta întrebunțează ca materie primă numai o bună celuloză de lemn, fabricată după procedeul bisulfidului de calciu și care conține 86—90% de alpha celuloză sau mai bine încă o celuloză numită „*Rayon alpha fibre*” cu 95% alpha celuloză, echivalentă cu cele mai bune deșeuri de bumbac, despre care am amintit mai înainte. Operațiile necesitate de acest procedeu sînt următoarele: a) Prepararea alcali-celulozei; b) Maturarea alcalicelulozei; c) Tratarea alcali-celulozei cu S_2C pentru obținerea viscozei; d) Filtrarea soluției de viscoză; e) Maturarea viscozei; f) Filarea viscozei. Alcali-celuloza se prepară tratînd celuloza cu o soluție de NaOH de 18% (concentrația sodei depinde de gradul de umiditate a celulozei). Se formează astfel alcali-celuloza; excesul de sodă este îndepărtat cu ajutorul preseii hidraulice, așa fel că, greutatea alcali-celulozei să fie de 3—3,2 ori din greutatea celulozei luate. Alcali-celuloza formată este lăsată apoi 78 ore în rezervoare anumite la temperatura de 26°—28° C.

În acest timp, celuloza suferă modificări fizice și chimice, care nu sînt încă elucidate, însă asupra cărora s'au dat diferite interpretări. Se știe că acțiunea sodei asupra celulozei a fost semnalată mai întâi de *J. Mercer*, la 1784, căruia i se datorește mercerizarea bumbacului de o mare importanță industrială. Mercerizarea bumbacului provoacă o strîngere a fibrelor de circa 25%, în așa fel, că dacă se aplică mercerizarea la stoffe mixte de bumbac cu lînă sau bumbac cu mătăsă, după uscare singure fibrele de bumbac se strîng, dînd astfel efectul crêpe (ondulat). Pe de altă parte, prin mercerizare, firul de bumbac devine mai umflat și cilindric, iar proprietățile fizico-chimice și tinctoriale sînt sensibil modificate. S'au emis diferite păreri pentru a explica acțiunea sodei asupra celulozei; unii cred că este absorbție fizică, cum se observă de obicei la coloide (celuloza fiind un coloid), alții înclină să creadă într-o acțiune chimică, care se manifestă prin proporții definite între celuloză și alcali absorbit, fiecă este vorba de un complex molecular $C_6H_{10}O_5 \cdot NaOH$, fie de alcoolat $C_6H_9O_4Na$. *Gladstone* a stabilit cel dintâi, prin încercările sale, formula $(C_6H_{10}O_5)_2NaOH$, care fusese admisă, însă mai tîrziu a fost criticată de *Hubner* și *Teltscher*, apoi din nou confirmată de lucrările lui *M. Karrer*. *M. Rassov* și *Wadewitz* au găsit că alcali-celuloza ar corespunde formulei $C_6H_{10}O_5NaOH$.

E. Wiewieg, determinînd concentrarea sodei înainte și după acțiunea sa asupra celulozei, din diferența dintre cele două determinări, stabilește cantitatea de sodă absorbită. În felul acesta confirmă compoziția alcali-celulozei dată de *Gladstone* și regăsită de *Karrer*. *M. Rassov* și *Wadewitz* au mai constatat că proporția de sodă absorbită de celuloză depinde de temperatura de impregnare și de concentrarea soluției de sodă; deasemeni starea fizică a celulozei are un rol important. După acești autori, acțiunea NaOH asupra celulozei este de natură fizică și anume: absorbție, datorită stării coloidale a fibrei celulozice, cu toate că ei nu neagă, că poate să aibă loc simultan și o acțiune chimică. *M. E. Heuser* conchide hotărît pentru o acțiune chimică, deoarece el prepară alcali celuloza întrebunțînd, în loc de NaOH cu 11,75%, KOH de o concentrație de 16,75%; tot așa prepară alcali celuloza cu LiOH (conținînd 7,92% LiOH) și cu CsOH, obținînd respectiv $2C_6H_{10}O_5LiOH$ și $3C_6H_{10}O_5CsOH$. Influența stării fizice și mecanice a celulozei cu privire la formarea alcali-celulozei, a fost pusă în evidență de *M. T. Lieser* (*Cellulose Chemie* 10, 1929, p. 21).


Maturarea alcali-celulozei. După ce alcali-celuloza a fost făcută este supusă la presa hidraulică pentru a îndepărta excesul de sodă și lăsată apoi în recipiente în afară de contactul aerului la 26°—28° timp de 72 ore, în care timp celuloza suferă modificări fizice și chimice, așa fel că solubilitatea celulozei transformate este mai mare ca a celulozei primitive. În practică fenomenele, care se întîmplă în timp cît alcali-celuloza așteaptă pînă la tratarea cu S_2C , constituiesc *maturarea alcali-celulozei*.

Transformarea celulozei în alcali-celuloză. Produsul obținut în urma matu-


rării prezintă o viscozitate cu atît mai mică cu cît gradul de maturare este mai mare, și cu cît temperatura este mai ridicată. După *Heuser* și *Schuster*, maturarea alcali-celulozei ar fi mai ales o degradare pur fizică cu formare de beta și gama celuloză solubile în alcali, implicit deci o scădere a proporției de alpha celuloză; se înțelege deci că fenomenul maturării trebuie condus cu precauțiune pentru a obține un produs, care să corespundă practicei.

Prepararea viscozei. Alcali-celuloza maturată se tratează în vase de fer nichelate interior, bine închise cu capac și răcite exterior cu un curent de apă rece, cu S_2C și se obține o soluție viscoasă, galbenă-portocalie de Sodio-xantogenat de celuloză.

După *Cross* și *Bevan*, 47 kg. S_2C pentru 100 kg. alcali-celuloză sînt suficiente. Compoziția chimică a xantogentului de celuloză este asemănătoare cu aceea a xantogenatului de Na, care se formează cînd se tratează alcoolatul de Na cu S_2C :



Celuloza formează cu alcalii, alcali-celuloza, care cu S_2C dă xantogenatul de celuloză:




Excesul de sulfură se elimină cu ajutorul vidului și apoi xantogenatul de celuloză este dizolvit într-o soluție de NaOH diluat 4—15%.

Se obține astfel o soluție numită viscoză, care se prezintă ca un lichid limpede, galben-portocaliu viscos, care conține 7—8% alcali. Soluția aceasta se filtrează prin filtre-prese pentru a îndepărta impuritățile mecanice, care ar astupa filierele. Înainte însă de a trece la filatură, viscoza este lăsată 3—4 zile la temperatură de 12—16° C; în acest timp ea se ameliorează, căpătînd proprietăți bune pentru a fi filată.

Această ameliorare ia numele de *maturarea viscozei*.

Gradul de maturare se determină prin metode analitice. După *H. Stearn*, viscoza primitiv obținută se modifică, în timpul maturării, polimerizîndu-se așa fel că dacă viscoza primitivă derivă dintr-o celuloză în C_6 se formează prin polimerizare produși din ce în ce mai condensati în C_{12} , C_{18} și C_{24} , care ar fi faza cea mai favorabilă pentru filarea viscozei; o polimerizare mai departe conduce la produși în C_{30} și C_{36} insolubili și deci neutilizabili pentru filatură. Schematic, maturarea viscozei se face după următoarele reacțiuni:



Controlul analitic al soluției de viscoză comportă dozarea alcaliilor totali, a procentului în celuloză și o determinare a viscozității în comparație cu glicerina. O bună viscoză filantă trebuie să fie de 2,5—3 ori mai viscoasă ca glicerina de 30° Beaumé, densitatea sa e 1,2.

Desaerarea. Cînd gradul de maturare a fost atins se trece viscoza la operația numită desaerare, care are drept scop de a îndepărta bulele de aer, care ar putea provoca o rupere a firului în timpul filării. Desaerarea se face cu ajutorul vidului.

Filarea viscozei se face făcînd să iasă soluția, sub presiune prin filiere foarte fine de platină sau de metal inoxidabil, într-o baie coagulantă de compoziție apropiată unde firul se solidifică, apoi se rulează pe bobine sau la centrifuge.

După brevetul *D-rului M. Müller* și acela al lui *Vereinigte Glanzstoffabriken*,

care servește aproape în toate uzinele de viscoză, se filează într-o baie de acid sulfuric, care conține sulfat de sodiu, adică bisulfat de sodiu sau mai bine bisulfat și sulfat, la care se poate adăuga alte săruri: sulfat de magneziu, sulfat de zinc, sulfat de aluminiu și operind la 40° — 50° în condițiuni anumite. Așa după brevetul *Vereinigste Glantzstoffabriken* baia e formată din 110 gr. SO_4H_2 , 200 gr. SO_4Na_2 și 15 gr. SO_4Zn la litru.

După unele brevete se adaugă băilor de coagulare cca 10% glucoză, care ar avea rolul de a păstra o oarecare higroscopicitate a filamentului, împiedicând cristalizarea sulfatului de sodiu, care poate da loc la inconveniente.

Compoziția și concentrarea băilor de filatură au variat în vederea ameliorării firului obținut. Așa, adăugarea de sulfat de sodiu preconizată de Müller, a atenuat acțiunea prea brutală a acidului sulfuric asupra viscozei, deoarece sulfatul de sodiu încetenează hidroliza acidului sulfuric. Deaceia pare avantajos să nu se întrebuițeze decit băi de bisulfat la care se adaugă și sulfat de sodiu și care provoacă descompunerea completă a xantatului într-o baie acidă diluată, în care se învîrte bobina pe care se rulează firul.

Filind viscoza nematurată sau mai puțin maturată se reduce considerabil timpul de lucru pe deoparte, iar pe de altă parte se obțin fire elementare pe cît posibil foarte fine, ceiace constituie un avantaj pentru calitatea și proprietățile firului de mătăsă. Așa a luat naștere mătasa „Rotesa” preparată dintr-o viscoză nematurată plecînd din alpha celuloză americană, preparată după procedeul Brown.

Această viscoză trebuie să conțină numai 2,8% celuloză și 5% NaOH și se filează cu o filieră de 0,08—0,1 mm. într-o baie conținînd 10% acid sulfuric așa fel ca firul să aibă un titlu de un denier.

După alt brevet francez (din 1931), se lucrează cu o viscoză slab maturată (adică mai puțin de 4 zile la o temperatură de 18°) evitînd orice degradare a celulozei în cursul operațiilor de preparare a viscozei, întrebuițîndu-se un xantogenat foarte sulfurat. Ca băi de coagulare se întrebuițează băi foarte acide care conțin 10—30% acid sulfuric monohidratat plus 30% de bisulfat. Cele mai bune rezultate se obțin cu bisulfatul de amoniu deoarece acesta se dizolvă bine în băile acide, dar se poate întrebuița bisulfatul de sodiu sau amestecuri din aceste două săruri. La băile de filaturi, se mai adaugă glucoză, glicerină, SO_4Zn etc.

Fibre mate. S'a căutat a se da firelor de mătăsă un aspect mat, care să le apropie mai mult de mătasa naturală, care este mai puțin strălucitoare.

Aspectul mătasei artificiale poate fi modificat prin adăugiri apropiate soluțiilor de viscoză. Precipitînd în fibre produși în stare fin divizată, se ajunge, să se producă opacitatea fibrelor.

După procedeul lui „Comptoir des textiles artificiels” (1931), se filează într-o baie cu compoziția: 128 gr. acid sulfuric, 270 gr. sulfat de sodiu, 30 gr. SO_4Zn , procentul în SO_4Na_2 fiind dublu aceluia de SO_4H_2 și la o temperatură de 48° — 50° .

Tot astfel se pot obține fire mate, adăugînd viscozei înainte de filare diferite produse ca ulei de parafină, benzen, fosfat tricresilic, soluție în esență de terebentină sau ulei de antracen rectificat, tetracolorură de carbon și toluen, uleiuri vegetale ca ulei de măsline sau ulei de ricin, etc.

Mai bine este să se întrebuițeze uleiuri nesaponificabile în contact cu soda din viscoză și nici hidrocarburi care au tendința de a se separa. Deaceia s'au propus întrebuițarea de produse ca ciclohexanul combinat special cu un acid mono sau polibazic (etherul acidului metiladipic) ce se adaugă în proporție de 0,3—1% în viscoză înainte de filare. După un brevet din 1932 se adaugă lanolină 0,2% divolvată în benzen cu sau fără ulei de pin.

S'au întrebuițat deasemenea, pentru a scădea strălucirea firelor, produși bazici: anilina, Chinoleina, etilanilina. Deasemenea fibra poate rămîne mată dacă nu se

mai aplică desulfurarea, care de obicei se face tratând fibrele cu sulfură de sodiu. Prezența sulfului liber însă dă loc la câteva inconveniente, deoarece se degajă un miros de sulf și, mai grav, bijuteriile de argint se înegresc. Și lina conține sulf, însă nu în stare de libertate, ci combinat.

Adăugînd viscozei unele substanțe de natură minerală ca TiO_2 , aluminat de sodiu, sulfat de calciu, fosfați insolubili, etc., se pot deasemenea obține fire mate.

Asupra firului gata făcut se poate obține un efect mat, supunînd firul unui tratament apropiat, care-i dă în același timp și o șarjă. Așa, de exemplu, se trec fibrele printr-o baie de SO_4H_2 de 2—3%, apoi în altă baie de 3—5% Cl_2Ba , timp de 20—30 minute. Se depune SO_4Ba care face firul mat, mărindu-i în același timp greutatea cu trei pînă la cinci la sută.

Desulfurarea se face tratînd firul 15 minute la 50°—60°, într-o baie de 1,1—1,5% sulfură de sodiu, se spală apoi în soluție de sulfură mai diluată (0,5%) apoi se clătește. Se trece la înălbire cu o soluție de hipoclorit de 0,15 gr. clor la litru, timp de 5 minute. Se acidulează cu HCl diluat de 0,5%, se clătește și se repetă clorarea dacă se dorește un alb mai perfect.

Cîteodată se trece într-o baie de hiposulfit (anticlor), apoi într-o baie de săpun și în urmă se usucă. Firul acum e gata ca să meargă la țesut.

Mătăsurile artificiale sînt tot așa de frumoase și de strălucitoare, ba chiar mai strălucitoare ca mătasa naturală, fiind mult mai ieftine, însă ele sînt mai puțin solide și mai puțin rezistente la acțiunea apei și mai ales la cald. Din aceste cauze mătăsurile artificiale se tratează pentru a le face impermeabile apei. Procedul cel mai întrebuițat este cunoscut sub numele de *Sthénosage*. Aceasta constă în a impermeabiliza fibra de mătăsă artificială cu formol în prezență de agenți deshidrațanți și a unei sări neutre sau acide, sau a unui oxidant. Se întrebuițează de exemplu un amestec de 1—10 părți de formol de 40% cu 89—90 părți $\text{CH}_3\text{—COOH}$ diluat. Se îmbibă fibrele care apoi se usucă în prezența unui deshidratant, Cl_2Ca sau SO_4H_2 , se spală și se usucă.

Proprietățile și întrebuițările mătăsurilor artificiale. Mătăsurile artificiale sînt mai puțin rezistente ca cele naturale, mai ales în stare umedă, din care cauză trebuie să fie minuite cu multă precauție, căci altfel firele se rup.

Mătăsurile cupro-amoniacale și cele Chardonnet au o culoare, în general, albăstrue, firele de viscoză sînt mai galbene, iar cele de acetat sînt albe-argintii, puțin cenușii. Densitatea mătasei de acetat este de 1,251, celelalte categorii au densitatea de 1,50, față de mătasa naturală care are densitatea 1,36.

Nu sînt apretate, nici îngreuiate. În aer, mătăsurile artificiale iau același grad de umiditate ca și mătasa naturală, adică cam 11%, afară de mătasa de acetat care ia numai 3,5%. Mătasa artificială înlocuiește astăzi mătasa naturală în industria textilă, în toate întrebuițările sale. Se poate amesteca cu lînă și mătăsă naturală, în fabricarea diferitelor țesături, obținîndu-se efecte noi atît în țesătorii cît și în vopsitorii. Broderia întrebuițează mari cantități de mătăsă artificială. Se fac tot felul de imitații de blănuri. În acest caz fibrele sînt răsucite într-un mod special. Se mai întrebuițează pentru fabricarea părului de păpuși. O aplicație interesantă găsește mătasa artificială în fabricarea manșoanelor la becurile *Auer*. Se adaugă pămînturile rare, care trebuie să formeze scheletul manșonului, în soluția celulozică; însă cum firul în aceste condiții se filează mai greu, se face întîi pînza și se moaie în soluție de săruri. În ambele cazuri se obțin rezultate mai bune ca cu bumbacul; un kgr. de mătăsă artificială absoarbe 1200 grame săruri, în timp ce un kgr. de bumbac absoarbe numai 400 gr. Tot din mătasa artificială se fabrică păr de cal artificial. În acest caz filierele sînt mult mai groase și filarea se face mai încet. Părul de cal artificial, care se poate colora variat, servește la facerea de perii, pălării de damă și diferite ornamente. Mătasa artificială mai găsește întrebuițare și la fabricarea paiului

artificial, care fiind mai moale ca paiul natural, poate fi întrebuințat la împletituri mai complicate. Este însă mai scump ca paiul natural. Finețea mătasei artificiale se exprimă prin greutatea în grame a unei lungimi aleasă ca unitate. În Franța titlul legal este greutatea de 0,05 gr. a unei lungimi de 500 m. și se numește *denier*.

Sînt balanțe adaptate special pentru cîntărirea fibrelor, care dau titlul printr'o simplă citire. O mătasă de 120 denieri are circa 70.000 m. la kgr. În general se fabrică matasa artificială de 120—160 denieri de 80 denieri și chiar de 40 denieri (225000 la kgr.). Mătasa naturală are 10—20 denieri (900.000—450.000 m. la kgr.) și chiar mai puțin.

Deosebirea mătăsurilor artificiale de cele naturale. Mătasa naturală arde greu, dînd un reziduu carbonos cu miros de corn ars, în timp ce mătăsurile artificiale, afară de cea de acetat, arde ușor fără reziduu și fără miros. Mătasa de acetat arde mai greu. Cu mătasa vopsită, diferențierea este mai grea. Tratînd cu sodă sau potasă caustică concentrată, mătasa naturală se dizolvă chiar la rece, fără colorație, în timp ce mătăsurile artificiale, întăi se umflă și la cald se dizolvă, dînd o soluție galbenă. Încălzită în vas închis, la 200° C., mătasa naturală nu se alterează, iar matasa artificială se carbonizează. O soluție de 10 gr. de sulfat de cupru și 5 gr. glicerină în 100 cmc. apă alcalinizată cu potasă pînă ce soluția devine limpede, dizolvă mătasa artificială și lasă mătasa naturală nealterată. Acest procedeu poate fi întrebuințat în determinarea cantitativă. Dozarea N prezintă o caracteristică foarte importantă: mătasa naturală are 17% N, pe cînd mătasa artificială n'are deloc, afară de mătasa *Chardonnet*, care are 0,15—0,05% N.

Mătasa artificială, afară de cea de acetat, se dizolvă complet în reactivul *Schweitzer*, în timp ce mătasa naturală este atacată, gelatinizată, dar nu se dizolvă. Mătasa naturală se dizolvă în soluție amoniacală de Nichel și licoarea lui *Fehling*, în timp ce mătăsurile artificiale nu se dizolvă în acești reactivi. Tratînd o probă cu acid sulfuric concentrat, mătasa cupro-amoniacală devine galbenă, apoi după cîteva secunde se face galben roșietică și după circa 1/2 oră se dizolvă devenind galben-brun deschis; mătasa de viscoză se face roșie-brun și se dizolvă repede dînd o soluție brună; mătasa *Chardonnet* se dizolvă destul de repede în SO_4H_2 conc. și soluția cu difenilamină se colorează în albastru intens, iar cu bruccina dă colorație roșie, datorită grupelor nitrice rămase în mătasă. Mătasa de acetat se dizolvă în SO_4H_2 conc. dînd un lichid de culoare caracteristică, iar dacă încălzim soluția cu puțin alcool, se formează acetat de etil, ce se cunoaște după mirosul său eterat. Fierbind mătasa un minut cu un reactiv format din 1% NO_3Ag , 4% hiposulfid de sodiu și 4% NaOH , mătasa viscoasă devine brună formîndu-se sulfura, iar cea de cupru se colorează în cenușiu deschis prin formare de Ag redus. Numai mătasa de acetat se dizolvă în acid acetic, ca și în toți solvenții acetaților de celuloză; celelalte mătăsuri artificiale și mătasa naturală nu se dizolvă. Țara noastră importă cantități destul de mari de mătasă artificială. În 1932 s'a importat 1.344.732 kgr. în valoare de 257.806.000 lei. În 1933 s'au importat 1.317.147 kgr. pentru 235.216.000 lei.

Iată producția mondială de mătasă dela 1896—1936:

1896	.	.	.	600 tone	1926	.	.	.	100.000 tone
1913	.	.	.	12.000 "	1936	.	.	.	460.000 "
1922	.	.	.	30.000 "					

Avîntul care l'a luat fabricarea mătasei artificiale a făcut ca să se înființeze în mai toate țările fabrici pentru astfel de produse.

România nu putea rămîne în urmă și deaceia, funcționează astăzi două fabrici de mătase, după procedeul viscozei, una la București, numită „Apretura“, și alta la Lupeni, întrebuințînd celuloză de fag dela Zărnești.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

- ULMANN. — Kunstseide, pag. 20 Enzyklopädie der technischen chemie. Bd. 7.
 R. GABILLON. — Soie artificielle et matières plastiques,
 L. MENNIER. — Chimie des colloïdes et Applications Industrielles.
 L. CLÉMENT et C. RIVIERE. — La cellulose et ses dérivés. 1936.
 CLÉMENT et C. RIVIERE. — Les matières plastiques et soies artificielles.
 In revista *Chimie Industrielle*. — Tome XXXVII, 1928, p. 83, 186, 251; Tome XXXVIII, 1929, p. 102, 233, 328; Tome XXXIX, 1930, p. 69; Tome XL, 1931, p. 197, 269; Tome XLI, 1932, p. 194.

Observații și fapte experimentale asupra unei epizotii de cancer de cușcă la șoarecii albi

de

Dr. I. GHEORGHIU

Facultatea de Medicină din Iași

Cancerul așa zis de cușcă a fost observat încă de multă vreme, dar din cauza concepțiilor multor cercetători în ce privește necontagiozitatea cancerului în general, chestiunea contagiozității cancerului de cușcă a fost ocolită cu multă prudență de cea mai mare parte a cercetătorilor în această materie.

Dar cu toată această repudiare, totuși, în sprijinul contagiozității cancerului de cușcă, vin o serie de observații care pun pe un alt plan și în adevărata ei valoare, problema contagiozității cancerului de cușcă.

Așa, sînt foarte bine cunoscute observațiile lui Loeb care, în 1904, descrie în *Centralblatt für Bacteriologie*, un sarcom chistic al glandei tiroide ce a apărut în trei luni, în trei cuști de guzganii care erau vecine una de alta. Guzganii în chestiune, proveneau din aceeași sursă. Endemicitatea este probabilă, dar nu se putea exclude nici ereditatea. Între timp Loeb pleacă la Buffalo și a luat cu el acest sarcom, făcînd transplantatii pe diferiți guzgani care au ocupat mai multe cuște din primăvară, pînă în toamna anului 1902. După plecarea lui Loeb, cuștile au rămas neocupate pînă în vara anului 1903. Între timp cuștile mici au fost sterilizate, iar cele mari numai măturate.

În una din cuștile care au fost numai măturate, s'au pus 4 guzgani care au stat din toamna lui 1903 pînă în Iulie 1904 și în acest timp, unul dintre ei, a prezentat un fibro sarcom.

Observația nu rămîne aici, și 8 guzgani, de altă proveniență, au fost puși în aceeași cușcă, în August 1904, însă cușca a fost așezată, de data aceasta, într'un coridor puțin încălzit și umed. După zece luni, n'au mai rămas decît trei guzgani în viață și din aceștia, doi prezentau cîte o tumoare, un sarcom fusiform, iar al treilea prezenta un fibro-sarcom abdominal, cu metastaze în ficat, splină și mezenter. De notat e că toate tumorile își fac apariția înspre toamnă.

O altă observație este dată de un crescător de șoareci, inteligent și bun observator, care avea o sută de șoareci într'o cușcă, ceiace îi aducea cam 2000 de animale pe an. Într'un timp se ivesc două tumori printre șoareci, ceiace îl determină să mute animalele cu cușcă cu tot în altă parte. Din Aprilie pînă în Noembrie 1904, se ivesc 40 de tumori. De data aceasta schimbă cușca, desface șoarecii și cumpără alții dela Washington, zece femei și doi bărbați, toți sănătoși, și îi pune în aceeași cușcă.

larna următoare apar 34 tumori. Din 1905 pînă în 1906, a pus cușca pe o masă în dreptul unei ferestre, în bune condiții de aerație și de căldură, din nouă apărură 60 de tumori.

Borrel, încă din 1906, descrie cancerul de cușcă la șoareci și, în același timp, arată rolul pe care îl joacă unii paraziți în etiologia cancerului de cușcă.

Cu toată evidența faptelor descrise și observațiilor făcute asupra epizotilor cancerului printre șoarecii din cuști, totuși mulți dintre cercetătorii cancerului nu admit că ar exista un cancer așa zis de cușcă, prin urmare resping orice ideie ce ar duce la noțiunea de contagiune în cancer.

Cu toate acestea noi sîntem în măsură, avînd toate datele, de a demonstra existența contagiunii cancerului cel puțin la șoarecii crescuți și întreținuți în cuști și în această ordine de idei vom expune observațiile și cercetările noastre făcute asupra șoarecilor din crescătoria laboratorului.

Ținem să arătăm că la începutul cercetărilor noastre posedam un număr cu totul redus de șoareci, cincisprezece bucăți repartizați în trei cuști. Un fapt interesant de al menționa e că pînă în 1929 întreținusem pe șoarecii din aceste cuști sursa de carcinom și de sarcom pentru studiile grefelor ce le continuam în acea vreme. Intre timp ne mai posedînd decît cinci șoareci am fost nevoiți să întrerupem cercetările noastre pînă la 1933, cînd ne-am procurat un număr de 50 de șoareci pe care i-am repartizat în cuștile ce altădată ne-au servit pentru șoarecii de experiență. La finele anului posedam deja 263 de bucăți, repartizați în 6 cuști.

Spre marea noastră surprindere, în luna Mai 1934, printre șoarecii dintr'o cușcă găsim unul care prezenta o tumoare pe una din mamelele toracice cam de mărimea unei alune. Această tumoare are un mers rapid și într'un scurt timp ajunge de mărimea unei prune, dar înainte de a se ulcera sacrificăm animalul și cu porțiuni din tumoare facem grefe la 10 șoareci.

Examenul anatomo-patologic arată că este un adeno-carcinom al mamelei. Tumora grefată nu s'a dezvoltat pe niciunul dintre cei zece șoareci grefați.

Prin luna lui August al aceluiaș an, noi tumori își fac apariția printre șoarecii din aceeași cușcă și doi dintre ei prezintă tumori pe mamele cu metastaze în ganglionii toracici. Aceste tumori evoluiază foarte repede și una dintre ele ajunge la mărimea unei prune mari.

Am sacrificat unul dintre acești șoareci și ridicînd tumoarea, am grefat-o la 12 șoareci aduși dintr'o altă crescătorie unde nu apăruse niciodată tumori. Din acești șoareci grefați, 8 dintre ei prezintă tumori cam de mărimea unui grăunte de porumb care evoluiază cam zece zile, dar după care timp se resorb foarte repede.

Examenul histo-patologic arată că tumoarea excisată este un adeno-carcinom.

În luna lui Octombrie, în altă cușcă vecină se găsesc doi șoareci cu tumori, dintre care unul prezintă o tumoare în regiunea cefei, iar celălalt o tumoare în regiunea inguinală stîngă, cam de mărimea unei cireșe.

Tumoarea din regiunea cefei a fost excisată, după sacrificarea animalului și din ea s'au făcut grefe la 14 șoareci, însă și de data aceasta grefele s'au resorbit în foarte scurt timp și șoarecii la care au fost grefate aceste porțiuni de tumoare, prezintă numai o mică reacție locală, probabil de resorbție și fără formație propriu zisă tumorală.

Examenul histo-patologic al acestor tumori ne arată că este vorba de un carcinom.

Către sfîrșitul lunii Decembrie și în aceleași cuști, în care apăruseră pînă acum tumori, se găsesc cinci șoareci cu tumori care sînt distribuite pe mamelele toracice și abdominale, pe părțile laterale ale gîtului și pe ganglionii inguinali.

Examenul anatomo patologic ne arată că aceste tumori sînt maligne și de structură limfomatoasă.

S'au grefat 30 de șoareci. În locurile grefate își fac apariția tumori, care evoluează între 10—14 zile, dar care după acest timp se resorb. Numai la un singur șoarece se dezvoltă o tumoare care evoluează cam 30 de zile și pe care am excizat o după sacrificarea animalului, obținând cu ea patru treceri în serie la șoareci.

Pe la începutul lui Ianuarie 1935 am obținut dintr-o crescătorie străină de a noastră, un lot de 100 de șoareci, pe care i am repartizat în cuște noi, în fiecare punând douăzeci de bucăți. Este de notat că printre acești șoareci în ascendența lor nu se arătase niciodată tumori.

În Aprilie se găsesc printre acești șoareci, doi care prezentau tumori: unul avea o tumoare în regiunea inghinală stângă și altul o tumoare pe una din mamelele toracice.

Printre șoarecii pe care îi avem în crescătorie din primul lot, găsim trei din ei cu tumori.

În luna Mai alte tumori sînt semnalate, două la șoarecii noi și patru printre șoarecii vechi.

În luna Iunie se găsesc alți cinci șoareci purtători de tumori.

Cu venirea lunii Iulie încep marile călduri, în același timp și tumorile încep a deveni tot mai rare, șoarecii se înmulțesc în așa fel că ajungem la un număr de 387 de bucăți.

Către sfîrșitul lunii Octombrie găsim din nou patru șoareci cu tumori și cu cît trece timpul numărul șoarecilor cu tumori crește așa că își fac apariția 6 tumori în luna Noiembrie, 8 tumori în luna Decembrie, 7 tumori în Ianuarie 1936, 10 tumori în Februarie, 6 tumori în Martie, 9 în Aprilie, 5 în Mai, 3 în Iunie, 7 în Noiembrie, 11 în Decembrie, 10 în Ianuarie 1937, 6 în Februarie, 9 în Aprilie, 7 în Mai, 4 în Iunie, 2 în Septembrie, 6 în Octombrie, 9 în Noiembrie, 13 în Decembrie, 4 în Ianuarie 1938, 0 în Februarie, 0 în Martie, 0 în Mai, 0 în Iunie, 0 Iulie, 0 August.

Chestiunea cancerului așa zis de cușcă a fost studiată într'un chip pe cît de magistral, pe atît de complet de Borrel, care în 1906 prezintă un raport la Academia de Medicină semnalînd că a găsit în centrul tumorilor dela șoarece, în mod constant, prezența unui cisticerc de *tenia crasscolis*.

Însă chestiunea nu rămîne aci și în 1927 Borrel revine cu noi observațiuni și cu mai multe precizii. Pe un număr de 4000 șoareci observați zilnic în crescătoria laboratorului de Bacteriologie și Igienă din Strassbourg, găsește în tumorile a cinci șoareci examinați în primele zile ale apariției tumorilor, niște paraziți care nu sînt altceva decît embrioni de filarii, și Borrel are ferma convingere că acești viermi joacă un rol important în apariția tumorilor la șoarece.

Cazuri de tumori printre animalele de laborator au fost semnalate și de alți cercetători, dar nimeni n'a semnalat prezența de paraziți în aceste tumori sau în vecinătatea lor, așa după cum a făcut Borrel, pentru că nimeni nu le-a cercetat din acest punct de vedere și mai ales în primele momente ale formării tumorilor.

Borrel a găsit acești paraziți fie în tumoare, fie în vecinătatea lor, făcînd cercetări încă dela începutul formației tumorii, pentru că făcîndu-le mai tîrziu așa după cum se obișnuiește în general, nu mai este posibil de a găsi parazitul incriminat și mai ales din cauza marelui ușurințe cu care acesta se deplasează, orice urmă de trecere dispăre.

Bashford și marea majoritate a experimentatorilor în această materie, tratează chestiunea cancerului de cușcă, și deci ideia unei transmisiuni prin intermediul acestor paraziți, drept un mit, o afirmație care nu este bazată pe nici un fapt experimental, ci fiind de domeniul teoriilor pur subiective și lipsite de orice documentație.

Cancerul de cușcă există cu toată opinia contrară a lui Bashford și a altor cercetători, observațiile și experiențele lui Borrel demonstrează rolul pe care îl au unii paraziți cum sînt filariile în geneza acestui fel de cancer la șoarece. Rolul heredității

în transmisiunea tumorilor la șoarece este puțin probabilă și din acest punct de vedere, cheștiunea heredității cancerului la om și la animale trebuie privită ca un fenomen pur hipotetic.

Mai mult din observațiile noastre se poate constata în mod clar, că rolul heredității în cancer, trebuie să fie privit sub acelaș raport ca și hereditatea în tuberculoză sau alte maladii microbiene. Din observațiile noastre se poate constata, că de unde mai înainte cazurile de cancer apăreau într'un ritm crescând, ajunge la un moment dat, ca tocmai în lunile în care mai înainte dădeau un mare număr de cazuri de cancer printre animalele de cușcă, ca tocmai în aceste luni tumorile canceroase să nu mai apară. Ar fi logic ca, după observația lui Maude Sley, cancerul să urmeze teoria lui Mendel în liniile descendente ceia ce nu se întâmplă în liniile descendente cu cancerul din cuștile noastre. Deci o probă mai mult că, cancerul nu trebuie să fie atribuit unei transmisiuni hereditare a celulelor maligne, ci unui alt factor care intervine mai direct și care ține sub direcția sa, producerea acestei afecțiuni.

Din aceste considerațiuni, doi factori se pare că intervin în cancerizarea țesutului: terenul favorabil, adică o susceptibilitate particulară a organismului pentru maladie, și iritația efectuată de diverși agenți ziși cancerigeni. Prezența paraziților în cancerul mamelei și a pielii la șoareci, astfel cum le a semnalat Borrel în unele cancere dela om, ne demonstrează și mai mult rolul pe care îl au unii paraziți în formațiunea tumorilor dela om și animal, și marea importanță pe care îl prezintă aceștia în geneza cancerului.

Paraziții trebuie să fie considerați ca jucând rolul agenților iritanți sau traumatizanți, care ușurează fixarea agentului canceros într'un teren preparat. Șoarecii din crescătoria noastră sînt infestați de o serie întreagă de diverși ectoparaziți și endoparaziți. Cea mai mare parte din acești paraziți își depun ouăle în regiunea pielii unde nu este atinsă de gratajii animalului, de unde apoi embrionii emigrează la distanțe apreciabile.

În starea actuală crescătoria noastră cuprinde un număr suficient de șoareci pentru ca să ne permită a urma mai departe cercetările noastre asupra cauzei acestei epizotii la șoarecii din cuște. Pentru aceasta am început cu examenul pielii pentru a stabili gradul de infestație și reacția pielii față de acești paraziți.




Fig. 1
Secțiune în piele din vecinătatea unei tumori,
în care se văd filarii și reacțiunea
țesutului trofo-pigmentar.

Pentru examinarea pielii șoarecilor canceroși, am avut în vedere pielea regiunii cefei și a mamelelor mai ales, loc de predilecție a apariției tumorilor, dar în acelaș timp nu am neglijat și restul pielii corpului.

Pentru aceasta am întrebuițat tehnica lui Borrel care consistă: în ridicarea pielii pentru cercetat, și care după ce se întinde bine pe un plan se clivează straturile. Prin acest mijloc se poate obține o membrană destul de rezistentă care nu este altăceva decît planul trofic. Pielea fixată în întregime și în extensiune prin ace pe un carton tare este pusă într'o soluție de formol 10% timp de 12 ore, apoi trecută în alcool absolut 12—24 ore și apoi colorată într'o soluție de albastru de toluidină 10% timp de 6—12 ore.

Se face apoi o ușoară diferențiere în acid acetic de 1%, apoi deshidratare prin alcool absolut, se trece în urmă în xilol și după clarificare se acopere cu oleu de cedru și între lamă și lamelă flexibilă de mică, se observă la microscop. La examenul microscopic se observă că tocmai planul trofic este locul

unde se găsesc filarii în mare număr. Aceste filarii se prezintă ca elemente intens colorate, fine, avînd o lungime de 3—6 mm. pretutindeni se poate observa o reacție de celule limfatice și adesea se observă o îngrămădire de celule, care demonstrează o reacție de țesut față de prezența viermelui.

Citeodată însă se poate găsi parazitul chiar în centrul reacției limfatice, și după Borrel acest centru este punctul de plecare al unei formațiuni tumorale.

Incontestabil că filariile după regiunea unde se fixează, în ganglion, mamelă, testicul sau pe traiectul unui vas limfatic, sînt în stare să determine o tumoră, carcinom sau sarcom, probabil după natura virusului pe care îl duc cu ele.

Este un fapt bine cunoscut astăzi, că filariile adulte au particularitatea de a circula și de a se deplasa cu o mare ușurință printre celulele cornoase ale dermului și printre celulele glandelor mamare, unde își depun ouăle.

Prin urmare este logic ca acești paraziți să aducă cu ei un virus, pe care îl fixează în locul ales, sau mai bine traumatizînd țesutul ușurează fixarea unui virus, pe care probabil orice organism îl are pe el. În acest sens Patologia umană, animală sau vegetală ne dă atîtea exemple, încît ne dispensează de a le mai menționa.

În acelaș scop se pot cita atîtea specii microbiene patogene sau care rămîn în simbioză cu celulele animale și care nu devin patogene decît atunci cînd intervine un traumatism cauzat printr'un agent fizic sau chimic.

În cancerul de cușcă se observă totdeauna un mare număr de paraziți, mai ales în pielea șoarecilor, și care au întotdeauna un rol determinant în apariția cancerului. Acești paraziți lucrează ca agenți traumatizanți sau iritanți.

Din acest punct de vedere este foarte bine cunoscut rolul pe care îl au unii agenți iritanți sau traumatizanți așa cum este de exemplu rolul gudronului, a arsenicului, a funinginei, razele X, anilina și diverse produse de ordin chimic în apariția cancerului la om sau animal. Acești agenți fizici sau chimici iritînd sau traumatizînd celulele țesuturilor pe care le ating, le pun într-o slabă stare de apărare și din această cauză se lasă ușor invadate de virusul hipotetic al cancerului.

Un exemplu foarte concludent în această privință, ni-l dă virusul sarcomatos dela găină, unde noi putem determina o tumoră sarcomatoasă printr'un agent chimic, cum ar fi acidul arsenios sau gudronul, și unde vom găsi în totdeauna virusul sarcomatos, care se poate transmite în serie la găini, fără a mai fi obligați apoi de intervenția unui agent iritant sau traumatizant.

La om se găsesc adesea familii întregi infestate de *Demodex folliculorum* un parazit care trăiește și se multiplică în țesuturile cutanate, în special în țesutul cutanat al pielei feței, a aripilor nasului și a mamelor. Acești paraziți trec dela mamelă la pielea obrazului copilului în timpul suptului și în felul acesta se produce un fel de circuit de infestație dela mamă la copil infectînd în modul acesta mai multe generații.

În felul acesta se găsesc de multe ori cazuri de cancer al feței, a aripilor nasului sau a mamelor, care n'au alte cauze decît prezența acestor paraziți în pielea lor și chiar constituie punctul de plecare al cancerizației țesutului.

Nimeni nu poate susține că infestația în astfel de cazuri cu *Demodex folliculorum* este ereditară, dar nici nu se poate nega rolul acestor paraziți în determinarea cancerului mamelei, a aripilor nasului sau a feței.

Prin urmare, acțiunea unui traumatism sau a unei iritațiuni este necesară pentru ca un cancer să apară în țesuturile traumatizate sau iritate. Virusul care este extrem de fragil trebuie să existe în organismul animal, care se fixează pe țesutul traumatizat și produce cancerizația.

Din faptele expuse, și bineînțeles fără a atinge unele susceptibilități de ordin teoretic, se poate admite natura infecțioasă a unor cancere, fără pretenția de a im-

pune aceasta ca o regulă generală, cel puțin pentru moment, cînd preceptele hipocratice în chestie de cancer, încă influențează pe unii doctrinari.

În acelaș senz sîntem obligați a admite și ipoteza unui cancer de casă unde se pare că aceleași cauze concură la apariția și diseminația cancerului la om.



Fig. 2

Șoarece cu o tumoră.

Este, cred, foarte interesant a expune în această lucrare și chestiunea cancerilor multiple în acelaș țesut, sau în țesuturi diferite. Este un fapt admis de aproape unanimitatea cercetătorilor în această materie, că multiplicitatea cancerilor de aceeași structură în organe diferite sînt

excepționale și că ar fi datorite la simple coincidențe. Mulți admit că n'ar fi altăceva decît simple metastaze. Însă din observațiile noastre se vede cît se poate de clar, că sînt tumori de aceeași structură, de aceeași vîrstă, apărute în diferite țesuturi și organe, pe același animal. Nu rareori am găsit șoareci purtători de 2, 3 și chiar 4 tumori de aceeași structură, de aceeași vîrstă și pe diferite părți ale corpului.

Explicația multiplicității acestor tumori ar fi în faptul, că în pielea șoarecilor se găsesc în mare număr embrioni de filarii și filarii adulte.

Dacă filariile joacă un rol în determinaarea cancerului la șoarece este cît se poate de logic că acești paraziți prin multiplicitatea lor, să poată determina dezvoltări simultane de tumori în aceleași organe sau diferite.

Multiplicitatea tumorilor pe același animal și-ar avea explicația prin multiplicitate



Fig. 3

Șoarece cu trei tumori primare




Fig. 4

Secțiune într'o tumoră, se văd celulele carcinomatoase și mitose



Fig. 5

Secțiune dintr'o metastază canceroasă se observă mitosele.

tatea traumatismelor efectuate de paraziți asupra țesuturilor și prin fixarea ca atare a virusului hipotetic al cancerului în locurile traumatizate în acelaș timp de mai mulți paraziți.

Evoluția sau transformismul evolutiv al ființelor, în starea de azi a cercetărilor biologice

de

C. LACRÎTEANU

Profesor, București

Prin compararea tipurilor de organizare, pe care le stabilește studiul sistematic al animalelor și vegetalelor, constatăm că există o gradațiune în serie a acestor tipuri, căpătăm impresia hotărâtă, că formele au rezultat unele din altele, fiindcă se înlanțuesc prin însușiri treptate,—ar exista adică o *filiațiune*.

Prin urmare, anatomia comparată ne obligă să conchidem, că există o filiațiune a formelor animale și vegetale, rezultat al unei *filogenii* (naștere prin filiație, una din alta), care pornind dela ființa unicelulară a realizat perfecționându-se progresiv lanțul filogenetic animal: protozoare — om, și cel vegetal: bacterii — phanerogame angiosperme.

Acestui mod de transformare a ființelor dela apariția lor până azi, îi zicem *evoluție* sau *transformism evolutiv*.

Filogenia, ce constatăm prin studiul anatomiei comparate, este elementul principal, care ne îndreptățește, să afirmăm anticipat, că a existat și există o evoluție a ființelor pe glob.

Dar, în natura de astăzi, atât în lumea animală, cât și în cea vegetală, nu observăm producându-se filogenie și nici experimental nu putem provoca filogenia.

Din această cauză *nu putem explica mecanismul evoluției*, adică modul în care s'a produs și executat acest transformism general evolutiv. Cercetări experimentale în această direcțiune se fac în prezent pe scară întinsă, dar până azi ele n'au lămurit decât foarte parțial problema.

Astăzi, nu putem stabili cu siguranță, decât *existența evoluției*. Aceasta o constatăm sigur prin mulțime de inducțiuni trase din studiul vieții celor două regnuri de ființe dela apariția lor până azi, în lumina *paleontologiei*, a *anatomiei comparate*, a *embriogenei* și a *geonemiei* (răspîndirea geografică a ființelor).

Studiul ființelor din aceste puncte de vedere, ne procură numeroase dovezi, care ne dau dreptul, să afirmăm, că ființele animale și vegetale au suferit un transformism general, dela apariția lor pînă azi. Dovada cea mai decisivă a acestui transformism este modul cum au apărut *în timp*, diferitele grupe de ființe: grupele superioare apar, rînd pe rînd, gradat, totdeauna după cele inferioare, din care au derivat.

Constatînd realitatea acestui transformism general evolutiv, nu însemnează că putem să și reconstituim lanțul întreg al filiațiunii tuturor grupelor de ființe. Aceasta n'o putem face, cită vreme n'avem și nu vom avea, date paleontologice asupra vieții ce va fi existat desigur, înainte de era primară.

Putem însă afirma pe temeiul tuturor dovezilor concordante, ce avem în disciplinele: paleontologie, anatomie comparată, ontogenie și geonemie, — că *evoluția*, adică *descendența ființelor unele din altele*, *filogenia*, este azi un *fapt bine stabilit*, iar *nicidecum o ipoteză*.

Mecanismul evoluției. Modul în care s'a săvîrșit evoluția, adică factorii care au provocat-o în diferitele timpuri până azi, nu se cunosc încă.

S'au emis cîteva teorii, care nu lămuresc decît prea puțin problema.

Teoria lui Lamarck = *lamarckismul*. În 1809, Lamarck explică evoluția, în opera sa *Philosophie zoologique*, prin enunțarea celor două legi, care constituiesc lamarckismul :

a) *Legea adaptării la mediu*: nevoia, funcțiunea, crează organul în animalul care n'a atins încă sfîrșitul dezvoltării sale; funcționarea activă împuternicește, dezvoltă, mărește organul, iar neîntrebuințarea duce la atrofia și dispariția organului (organe rudimentare și organe absente).

Nevoia, trebuința, ca să fie satisfăcută, dezvoltă *un efort*, zice Lamarck. Din acest *efort*, naște organul, care se dezvoltă mult, dacă funcționează activ; contrar, se reduce. Specia sub influența directă a mediului exterior se schimbă, adaptîndu-se mediului în condițiile acestei legi.

Mediul exterior, zice Lamarck, obligă ființa să se transforme, *cauza transformismului (evoluției) este deci externă ființei*, adaptarea la mediu nefiind altceva decît *reacțiunea ființei față de mediul care o obligă, să se transforme ortogenetic* (în linie dreaptă, mereu înainte).

b) *Legea eredității caracterelor dobîndite*. Insușirile dobîndite sub influența mediului, ca reacțiune față de mediu, devin *ereditare în timp îndelungat, la descendenți*. Această *ereditate a caracterelor dobîndite* crează deci o nouă specie (transformism).

Intr'un cuvînt lamarckismul explică mecanismul evoluției prin influența directă a mediului exterior asupra ființei, care își modifică organele prin uz sau neuz, după cum dictează mediul; iar noile însușiri dobîndite, devenind ereditare în descendenți, — specia se transformă. Specia transformată rămîne ca atare atîta timp cît mediul, care a produs-o, nu se schimbă.

Argumentarea aceasta a lui Lamarck se întemeiază din nefericire pe numeroase exemple date de dînsul, dovedite azi, că nu pot duce la explicarea mecanismului evoluției prin cele două legi ale lui Lamarck. Iată cîteva din exemplele ce aduce:

1. *Tentaculele (cornițele) de pe capul melcului* ar fi luat naștere din nevoia melcului în mediu de a pipăi corpurile dinaintea lui, atunci a urmat *efortul intern* adică un aflus nervos și de sucuri hrănitoare, care au creat tentaculele pentru pipăit de pe capul melcului.

2. *Coarnele de pe capul rumegătoarelor* au luat naștere prin aflusul de sînge venit la cap, în timpul cînd animalele se bat furios între ele.

3. *Penele păsărilor* s'ar fi format prin pătrunderea în ele a aerului din sacii aerieni ai aparatului respirator.

4. Vecinătatea mării dezvoltă frunze groase la plante; iar seceta produce plante grase.

5. La munte plantele devin pitice și au florile viu colorate.

6. La plante de apă, *Sagittaria*, frunzele sînt dictate de mediu: sub apă sînt firoase sau panglicat, cele aeriene sînt mai lățite.

7. Blănurile mamiferelor în ținuturile reci sînt mai bogate, mai fine; iar culoarea lor e în legătură cu intensitatea luminei.

8. Mediul fizico-chimic produce deasemenea transformări: *Artemia salina* în ape sărate de diferite concentrații, dă tot atîtea subspecii.

9. Aspectul balenelor, focelor, delfinilor, păsărilor palmipede, celor răpitoare, alergătoare, agățătoare, etc., organizarea păsărilor sburătoare, — sînt rezultatul adaptării la mediu, în concepția lui Lamarck.

10. Exemple de neîntrebuințarea organelor: ochii cîrțiței, ai orbetelui, lipsa picioarelor la șerpi, reducerea aripelor la păsările care nu zboară.

Prin aceste exemple Lamarck ne dovedește că avea intuiția transformării ființele sub influența mediului; dar exemplele ce aduce sînt insuficiente și neconvingătoare, fiindcă aceste modificări de adaptare sînt ușoare, nestabile; iar toate însușirile

dobândite sub influența mediului *nu sînt ereditare*, deci întreg lamarckismul este doar o ipoteză, iar nu un adevăr științific. Observația și experiența au arătat, că însușirile dobândite sub influența directă a mediului nu sînt ereditare, decît atunci cînd ele s'au înscris în timpul dezvoltării (ontogenezei) în elementele reproducătoare, în germeii ființei, — modificîndu-se anumite părți din structura acestor elemente reproducătoare.

Lamarckismul nu poate deci explica mecanismul evoluției; el este o serie de ipoteze, iar nu de observări și fapte riguroase științifice. Totuși, prin concepția lui, după care *efortul intern al ființei ar fi cauză de transformări specifice, de evoluție*, — lamarckismul are meritul de a fi deschis o cale bună de cercetări pentru explicarea evoluției.

Teoria lui Darwin = *darwinismul*, explică mecanismul evoluției prin *lupta pentru existență sau concurența vitală*, din care rezultă o *selecție naturală*.

Darwin argumentează astfel: Ființele trăesc în natură într-o neîncetată *luptă pentru existență*, trăesc în *concurență vitală pentru hrană*. Dacă în această luptă ele capătă în organizarea lor însușiri favorabile și totodată durabile, ereditare, atunci aceste însușiri rămîn cîștigate și se mențin de aici înainta la ființa, care le-a dobîndit. Dar dacă aceste variații de organizare sînt nefavorabile, ele nu rămîn, ci dispar cu ființa respectivă. Prin urmare, zice Darwin, există în natură o selecție naturală depe urma luptei pentru trai: înving și supraviețuiesc numai cei născuți cu *însușiri ereditare favorabile* = *apți*; cei născuți *neapți*, dispar.

E probabil, conchide Darwin, că astfel se vor fi produs speciile și grupele de ființe existente, și aceasta în timp foarte îndelungat, *lent*, dovadă datele paleontologice.

Această *selecție naturală a ființelor bine dotate prin naștere* este posibilă la majoritatea viețuitoarelor, fiindcă mai toate au variații în însușirile lor.

Variațiile avantajoase ale indivizilor din diferitele specii, repetîndu-se în timp îndelungat, — urmează că rezultatul general al selecției naturale este o *ameliorare lentă a speciilor, o adaptare mai bună a lor la condițiile locale de mediu*. Nicio formă viețuitoare nu e fixă, toate sînt variabile și totodată în *concurență vitală cu rezultat de transformism avantajos, care le perfecționează lent, progresiv, evolutiv*.

Evoluția, zice Darwin, s'a realizat în natură, în diferite moduri, după împrejurări:

a) Unele specii rămîn *aproape neschimbate*, fiindcă nu sufăr nici variații în însușirile lor și nu sînt nici în concurență vitală.

b) Cele mai multe specii, dimpotrivă, se transformă mult în diferite direcții și înmulțindu-se activ, *domină cu viața lor mediile ce ocupă*, evoluînd puternic prin marea lor variabilitate și concurență vitală.

Acestea sînt *specii noi, născînde, îmbunătățite, perfecționate în lupta pentru trai*, capabile să ocupe locurile neocupate sau să se substituie altor specii.

c) Însfîrșit, sînt specii care se găsesc în concurență vitală, dar au variație slabă în însușiri, sau au însușiri nefavorabile sau insuficiente pentru o bună adaptare.

Acestea sînt *speciile rare, sărace în indivizi, pe care le găsim fixate pe suprafețe reduse și care sînt specii pe cale de dispariție*.

Aceasta este concepția lui Darwin = darvinismul.

Comparație între lamarckism și darvinism. Ce valoare mai au azi aceste teorii.

Cauza evoluției, după Lamarck, este influența mediului exterior, deci *cauză externă ființei*, care obligă ființa, să se transforme: nevoia crează organul: caracterul dobîndit devenit ereditar prin uz, schimbă specia, deci transformism.

Cauza evoluției, după Darwin, este selecția naturală ca efect al concurenței vitale; indivizii se nasc deadreptul modificați, deci *cauză internă*, opusul concepției lui Lamarck. Ființa, după Darwin, se naște direct modificată și dacă se potrivește mediului, s'a născut

direct adaptată și va supraviețui celor născute cu caractere desavantajoase sau indiferente față de mediu.

Deci ambele concepții admit drept *cauză a transformismului, adaptarea la mediu*, dar realizarea adaptării o explică în mod diferit: lamarckismul o explică prin *efort intern al ființei, ca răspuns la influența mediului*, producându-se un transformism ortogenetic; pe cînd darwinismul concepe adaptarea ca o *selecție numai a formelor apte, dintre toate formele născute stabil în toate sensurile*: deci darwinismul înțelege evoluția cu un rol *eliminator* al formelor neapte și indiferente.

Ambele concepții sînt însă de acord, că evoluția s'a făcut *lent și continuu*.

Obiecțiile serioase ce se aduc azi acestor teorii. Dacă evoluția s'a făcut lent și continuu, atunci este evident că selecția naturală, n'a putut și nu poate produce noi specii și cu atît mai puțin tipuri mari deosebite ca organizare evolutivă. Selecția naturală n'a putut și nu poate produce, decît tipuri mijlocii bine înzestrate în cuprinsul diferitelor specii, iar în acelaș timp a eliminat și neapții din cuprinsul aceloraș specii.

Se mai obiectează apoi concepției lui Darwin și faptul, că nu putem ști, nu putem determina, care sînt însușirile folositoare, avantajoase și care vătămătoare sau indiferente. Apoi dispariția indivizilor neapți nu ne-o putem explica, fiindcă sînt neapți în concurența vitală. Moartea acestor neapți nu poate fi explicată prin fenomenul de selecție naturală, decît în foarte mică măsură, deoarece în afară de infirmi sau de bolnavii ereditari, moartea lovește la întîmplare orice fel de indivizi.

Pentru aceste serioase neajunsuri, darwinismul este și el departe de a lămuri mecanismul evoluției. El contribuie chiar mai puțin ca lamarckismul la explicarea transformismului evolutiv al ființelor.

Lamarckism și darwinism sînt azi două teorii nedovedite. Ele n'au fost întemeiate pe cercetări experimentale. Pînă azi, o probă evidentă a eredității caracterelor dobîndite nu s'a făcut; iar exemplele date atît de Lamarck cît și de Darwin sînt criticabile: ei consideră adeseori, ca indivizi ai unei specii, indivizi eterogeni, alteori judecă neexact influențele mediului sau socotesc drept însușiri ereditare, variațiile somatice.

Iată de ce, trebuie să părăsim, atît lamarckismul cît și darwinismul și să căutăm să aflăm cauza evoluției din fapte experimentale.

Cercetarea experimentală a cauzelor evoluției. Pentru aflarea mecanismului evoluției, se cercetează astăzi experimental, metodic, variațiile ereditare ce pot suferi speciile, transformîndu se din una într'alta.

Speciile ne înfățișează în indivizii, care le compun, *două feluri de variații (însușiri noi)*: unele ereditare, care se transmit după apariție, în descendenți, deci interesează organele de reproducere, sînt înscrise în elementele reproducătoare, sînt *genotipice*; altele sînt variații (noi însușiri) curat individuale, interesează numai corpul (soma) individului, iar nu și elementele reproducătoare, deci nu sînt ereditare, sînt *variații somatice, fenotipice*.

S'a constatat că toate variațiile produse de acțiunea directă a mediului exterior = *adaptarea la mediu*, sînt *însușiri neereditare*, sînt însușiri *somatice, fenotipice*. De altă parte, s'a constatat că, printre indivizii care compun o specie, nasc unii cu însușiri schimbate, însușiri noi ereditare, care transformă astfel specia de origină, *brusc și fără cauză cunoscută*. Acest mod de producere bruscă și fără cauză cunoscută, a unei noi specii, De Vries, la numit *mutație*.

Astăzi se caută explicarea evoluției, *studiînd experimental mutațiile*, atît cele ce se pot produce spontan în natură, cît și acele pe care le putem provoca experimental, prin diferite mijloace: influențe fizice, chimice, traumatice, hibridări, etc., asupra speciilor.

În ce măsură se pot produce mutațiile. Se produc multe atât la animale cit și la plante. Iată câteva exemple. La plante: Traista ciobanului (*Capsella b. p.*), Mac, floare a soarelui, *Fragaria monophylla*, *Chelidonium laciniatum*, bumbac, orez, *Datura inermis*, numeroase mutații la porumb, ciuperci, alge, etc. La animale: Șoareci cu bot de rinocer, cei cu coadă scurtă, musculița de oțet = *Drosophila melanogaster*, care a dat peste 400 mutații (Morgan), iar alte 11 specii au dat de asemenea numeroase mutații; se cunosc numeroase mutații la mai toate artropodele, la moluște, la pești, păseri și mamifere.

S'ar părea că mutația este un fapt general de variație ereditară a speciilor.

În natură, mutația este singurul mod cunoscut pînă azi, prin care speciile se transformă din una în alta, — evoluție.

Cum nasc mutațiile? La întîmplare. Cu nimic nu putem prevedea apariția lor.

Noile însușiri ale mutanților sînt *imediat ereditare*. Noul tip naște brusc, adică fără gradațiune, fără tipuri intermediare, discontinuu, — deodată o *specie nouă*.

Noile însușiri ale mutanților nu sînt însușiri mari, ci *însușiri de intensitatea celor care deosebesc între ele rasele și speciile*, cum de pildă: modificări de aripi, pene, solzi, cochilii, dinți, păr, picioare, urechi, degete, coadă; colorația ochilor, a tegumentului; poziția anexelor tegumentare, sensibilitatea la diferiți excitanți, predispoziții noi organice; la plante: însușiri noi de frunze, tulpini, flori; culoarea fructelor și semințelor, etc. Insușirile noi ale mutanților pot fi și de ordin fiziologic: altă vitalitate, fecunditate, secreții interne, rezerve, rezistență la factorii externi nocivi etc. Cum se vede, variațiile ereditare, ce poate suferi specia prin fenomenul de mutație, sînt destul de numeroase.

Mutațiile nu sînt dictate de mediul exterior, fiindcă deși unele sînt în armonie cu mediul, adică arată o adaptare bună la mediu, altele sînt indiferente sau vătămătoare vieții în mediul respectiv, ajungînd cîteodată anomalii sau monstruo-zități ereditare; iar alteori și mai rău, modificări atât de rele ale organelor embrionare încît embrionul moare, mutație *mortală (letală)*.

Toate observațiile făcute asupra mutațiilor au stabilit, că ele nu sînt produse de cauze externe organismului embionului; astfel, din zeci de mii de indivizi crescuți în *aceleași condiții de mediu*, numai o singură musculiță de vin naște direct cu pîn-tece anormal, ori cu ochi albi; toate celelalte se mențin riguros în însușirile speciei.

Mutațiile produse experimental prin influențarea oului sau embrionului de agenți exteriori: traumatisme, iritare cu paraziți, temperatură, raze X, agenți chimici, etc., sînt mai numeroase și mai mari, decît acelea care se produc singure în natură; dar nu e nicio legătură între agentul provocator și natura mutației; efectul e numai cantitativ, niciodată corelativ, calitatea mutației rămîne întîmplătoare.

Cum explicăm azi producerea mutațiilor. Mai toți biologiștii susțin azi, că *origina mutației este în cromozomul nucleului celulelor reproducătoare*. Acești cromozomi sînt în număr fix pentru fiecare specie. Așa, de pildă, omul are 24 în celula sa, limbricul 2, limbricul de cal 1, salamandra 12, musca de oțet (*Drosophila*) are 4, fluturii au 32, broasca roșcată de pădure are 12, iar șoarecele are 20. Acest număr, de fecundare, se dublează în ou, în celula germinală: un cromozom e al tatălui, celălalt al mamei.

Mecanismul eredității se întemeiază pe jocul acestor cromozomi, care pot varia ca număr în anumite împrejurări: în loc de dublu ei pot deveni triplu la număr sau de 4, 5, 6 ori sau mai mult, la număr; în aceste cazuri ei reprezintă nu numai însușirile tatălui și mamei, ci și însușirile mai multor alte tipuri. Alteori, numai parte din cromozomi se multiplică, ori se grupează altfel decît normal.

Orice modificare în structura cromozomilor, în timpul ontogeneziei, produce mo-

dificări ereditare în însușirile speciei, se produc *mutații*, care dau naștere la *mutanți*, adică la *noi specii* ori *subspecii*.

S'a constatat că mutațiile se produc nu numai influențind celulele reproducătoare, ci și fazele embrionare din timpul reproducerii. Ceva mai mult, influențind chiar celulele corpului (soma); acestea din urmă sînt rare la animale, le întîlnim mai des la plante, cum de pildă mutațiile mugurilor.

Mutațiile produse asupra celulelor reproducătoare dau cel mai bun rezultat: dau mutanți aproape toți descendenții; specia nouă care naște astfel, este puternică, are putere de supraviețuire.

* * *

Totalizînd cercetările de pînă acum asupra mutațiilor spontane și experimentale, putem exprima astfel rezultatele obținute:

Orice specie, animală sau vegetală, produce mutații cromozomice, independent de mediu, fără cauză cunoscută, întîmplător.

Aceste mutații produc tipuri noi de organizare: subspecii sau specii noi.

Urmărite, generație după generație, aceste tipuri noi se dovedesc statornice cu noile lor însușiri, dacă le izolăm de specia de origină, cu care să nu se mai fecundeze.

Mulțime de rase de animale domestice și de plante cultivate au născut și nasc, prin mutație; dacă aceste mutații sînt supravegiate și izolate, ele se mențin, altfel nu se mențin, se întorc de unde au provenit.

În natură, mutațiile, cele mai multe, nu se mențin, ci se reîntorc la origină, fiindcă nu li-se asigură existența în natură din cauză a două neajunsuri: a) mutanții rău înzestrați mor; b) mutanții care supraviețuiesc, o parte din ei se reîntorc la specia din care au născut, fiindcă se pot fecunda ușor cu ea (amfimixie).

Rămîne deci numai o mică parte din *mutanți* = *noile specii*, care vor supraviețui ca atare, dacă se vor găsi în condiții de a nu se mai încrucișa cu specia mamă.

În ce măsură ne pot explica mutațiile, mecanismul evoluției. Mutațiile, deși apar în număr mare în natură, totuși marea majoritate nu durează, se reîntorc la specia de origină cu care se fecundează foarte lesne. Deaceia, rareori întîlnim în natură, specii noi sălbatice născute prin mutație; nu le întîlnim decît acolo unde mutantul (specia nouă) a fost izolat de specia mamă.

Aceste specii noi vor evolua în diferite moduri, după împrejurări: unele rămîn pe arii mici de repartiție geografică; altele vor dispărea; în sfîrșit altele surprinse de condiții noi de viață (climat, relief, etc.) favorabile, se vor dezvoltă mult, își vor întinde aria geografică și vor înlocui specia mamă.

Atît ne pot lămuri mutațiile despre evoluția (transformismul) viețuitoarelor.

Căci, cu toată marea dezvoltare a cercetărilor executate pînă azi asupra mutațiilor spontane și experimentale, rezultatele căpătate în vederea explicării mecanismului evoluției sînt puțin satisfăcătoare.

S'a aflat mai degrabă, că speciile tind să-și mențină neschimbate în linii mari, însușirile specifice; iar mutațiile sînt în genere tipuri cu însușiri mici ereditare, care apar ca subspecii în cuprinsul unei specii, reprezentînd însușiri preexistente în cuprinsul speciei, însușiri care schimbă prea puțin specia și deci *nu ne pot explica evoluția (transformarea)* marilor grupe de organizare din lanțul filogenetic al formelor animale și vegetale.

Nenumăratele mutații obținute de către De Vries și de curînd de către Th. Morgan, sînt mai degrabă elemente ale speciei, din care au derivat, decît specii noi, fiindcă se fecundează perfect, atît între ele cît și cu specia de origină; iar pe de altă parte majoritatea acestor mutanți au însușirile noi, care îi caracterizează, *defectuoase, regrestive sau nefolositoare*, adică însușiri, care după Darwin, se vor elimina,

indivizii care le au vor dispărea prin selecție. Vor supraviețui numai puținii mutați, care nu mai vin în contact cu specia mamă.

Mutațiile sînt deci factori prea slabi pentru desăvîrșirea evoluției în măsura în care constatăm că ea s'a realizat.

Studiul mutațiilor a luminat multe din variațiile ereditare ce încearcă speciile, dovedind că specia e plastică, se transformă, nu e fixă; dar totodată el a arătat, că nu prin mutații ne putem explica mecanismul evoluției întregi.

Studiul mutațiilor ne-a lămurit biologiceste, doar atît: odată marile grupe de organizare săvîrșite prin evoluția al cărui mecanism nu-l cunoaștem, mutațiile realizate de speciile fiecărui grup de organizare, au creat și crează și azi numeroase specii mult diferențiate între ele, specii pe care le constatăm azi numeroase în studiul sistematic al marilor grupe de organizare: moluște, artropode, echinoderme, pești, reptile, păsări, mamifere; talofite, alge, criptogame vasculare, fanerogame, etc.

Aceste specii au suferit și sufăr și azi, sub ochii noștri, numeroase mutații.

* * *

Cum studiul mutațiilor n'a putut lămuri mecanismul total al evoluției, s'au mai formulat și alte explicări ale cauzelor evoluției?

Lotsy vede în fenomenul de hibridare între specii, cauza producerii de specii noi.

Rosa, *Przibram* și alții atribuesc exclusiv factorilor interni ai ființei, modificările ereditare, care fac noi specii.

Toate interpretările acestea dovedesc neștiința, în care ne găsim azi în ce privește cunoașterea condițiilor și modului, în care s'a săvîrșit evoluția ființelor pe glob.

Se crede azi, că apariția tipurilor de organizare: celenterate, viermi, artropode, moluște, pești, reptile, păsări, etc., talofite, alge, criptogame, fanerogame, etc., trebuie să se fi făcut printr'o transformare profundă a structurii și funcției *protoplasmei* oului, transformări despre care pînă acum nu știm nimic, adică nu știm azi nimic despre modul cum au evoluat marile grupe de organizare a ființelor.

Factorii climatici în cercetările de geografie și etiologie medicală

de


ANDREI INCZE

Licențiat în științe, Cluj

Între anii 1920—1924, Dr. Neveu Lemaire publicase în revista „Géographie” o serie de studii sub titlul „Notes de Géographie Médicale” (1), însoțite de hărți foarte sugestive, reprezentînd răspîndirea geografică a principalelor epidemii și endemii intertropicale. Punctele de interferență ale cercetărilor de etiologie medicală și de epidemiologie cu științele geografice preocupau mulți specialiști, medici și geografi, ca *Boudin* (1817) (3), *A. Mühry* (1856) (2), *Hirsch* (4), *Minier* (5), *M. Sorre* (6), *K. Meuse* (22), *Scheube* (23), *I. Brunhes* (7). Reprezentările cartografice au avut multe puncte inițiale slabe, manifestate în încercările premature ale lui *Gerland* (hărți publicate în atlasul lui *Berghaus* (8). Ele au fost în parte înălțurate de *I. Wütschke* (9), *T. Fischer* (10) și mai recent de *L. R. Grote* (11). Multe din aceste greutăți sînt pe cale de dispariție datorită pozitivării cunoștințelor epidemiografice; multe însă continuă să persiste, mai ales cele provenite din imposibili-

tatea unei distincții precise între caracterul epidemic și endemic. Deaceia Grote (11) combate procedarea simplistă a lui Gerland, respingînd-o în întregime, deoarece s'a constatat, că multe endemii pot lua subit caracterul *pandemic*, parcurgînd întreg pămîntul. De ex. s'îfilisul a izbucnit deodată în Europa, pustiind-o cu furie timp de 3 decenii, pe urmă și-a pierdut caracterul epidemic (4, pg. 60)¹⁾. Pandemia de gripă din 1918—1919 a cauzat moartea a 20 milioane de oameni (19, pg. 225). Și din cauza *intermitenței* (gripa²⁾, tifosul exantematic), a enclavelor și lacunelor frecvente, ce le prezintă contururile ariilor de răspîndire, se ivesc tot mai multe imprecizii. Deaceia direcția cercetărilor mai noi (10) a abandonat calea interpretărilor cartografice. Progresul e însă evident în ce privește teoriile ce privesc rolul etiologic al fenomenelor de diferite categorii geografice (4).

Rolul atmosferei în propagarea maladiilor infecțioase nu scapă nimănui³⁾. Cu privire la gradul de infecție al aerului trebuie să mai adăugăm și influența altor elemente (antropogeografice, etc.). *Influența temperaturii* este cît se poate de evidentă.



Răspîndirea geografică a paludismului endemic. (d. Wütschke).

In negru : regiunile cu forma gravă (pernicioasă) a endemiei.

Punctat : forma ușoară. Izoterma de 15° arată limita superioară a boalei. (A. Incze).

Cîteodată se pot trage contururi foarte precise cu ajutorul izotermelor. Mai ales paludismul se pretează la demonstrarea conexiunii faptelor *etiologice* cu raporturile *climatiche* (4). Pentru *marcarea limitei sale superioare*, Hirsch s'a servit de *izoterma de 16 C°*, iar sub formă violentă de epidemie, el nu se arată decît în zona inter-tropicală (v. harta)⁴⁾. Am putea înșira o serie întreagă de urmări fiziologice, cu tulburări circulatorii, împiedecarea fagocitozei, secreției și a acțiunilor antitoxice⁵⁾, apoi îmbolnăvirile așa numite „a frigori” (pneumonie, angina, reumatismul, hemoglobinuria, etc. (12) p. 487, cauzate de *oscilațiile brusce de temperatură* (în clima extrem continentală). În fine trebuie semnalată influența temperaturii asupra *prevalenței* epidemiilor. Există boli sezonale, ca gripa, variola⁶⁾ etc.

1) Mühry (3, p. 749) afirmă, că pronosticul bolii în arhip, antilelor este mult mai favorabil, ca în Europa, De aici concide, că s'ar putea admite proveniența ei americană.

2) Pandemia din 1918—19 a avut faze verno-estivale și faze estimo-autumnale (19, pg. 125).

3) Aerul atmosferic e de o puritate ideală în largul mării (112, 855 litri conțin numai 202 microbi, d. Miquel și Moreau) și în deșert (în d. Libiei, 28 microbi pe 100 m³, d. Engel (19).

4) Pe harta alăturată noi ne-am servit de izoterma de 15°, ca o limită precisă a răspîndirii acestei boli.

5) Prin diminuarea mișcărilor cililor vibrațili și în mod indirect, ușurarea pătrunderii microbilor în sine (12).

6) Febra dengue, epidemie tropicală, încetează odată cu scoborîrea temperaturii în anotimpul ploios. (4, pag. 23).

Presiunea. Coborîndu-se presiunea, scade conținutul de CO_2 al sîngelui (cură de altitudine). Limitele presiunii suportate de organismul omenesc sînt destul de largi. Așezăminte se găsesc chiar la 4390 m. în munții Himalaia ¹⁾. Creșterea bruscă a presiunii poate da naștere la dipnee, palpitații, amețeli, „mal de montagnes, etc.

Insemnătatea etiologică a vînturilor constă în diseminarea microbilor, chistelor și altor impurități (praf) găsite în suspensiune. Țînțarii anopheles nu pot zbura la distanța sau la înălțimi mari ²⁾. Se observă însă foarte des, că *țînțarii infectați au fost aduși de vînturile dominante din regiunile învecinate, umede, contaminate cu paludism endemic.* (Țînțarii din Dombes la Lyon). E fapt constatat în Algeria, că epidemia izbucnește deodată după uragane (Vallin Collin, 12, p. 298).

Adăogînd, ca un ultim element climatic, *umiditatea*, aceasta poate provoca afecțiuni broncho-pulmonare și reumatice, febră miliară („suette miliaire“), iar, în colaborare cu temperatura ridicată: unele dermatoze, paralizarea respirației cutane („coup de chaleur) etc. Precipitațiile joacă rolul unui purificator; în urma ploilor prea abundente, se crează condiții favorabile *contaminării solului și a pînzelor freatice* (febra tifoidă).

În fine, oricine poate să se convingă de *influența umidității confruntînd harta distribuirii cantității anuale de ploi cu aria de răspîndire a malariei. Forma gravă a acestei boli (paludismul) se localizează în regiunile însemnate cu pete închise, arătîndu-ne pe cele mai bogate în precipitațiuni.* Nu e o constatare fără interes, că boala pătrunde și în celelalte ținuturi, cu ploi mai puțin abundente, dealungul văilor fluviilor mari. Aici, precum și în regiunile de coastă (coasta Guineei, coasta Est-africană de la g. Delagoa pînă la Zanzibar) se observă *permanența ei sub formă de endemie.* Prevalența ei este favorizată de umiditatea substratului (solului). În zona caldă, *regiunile inundabile* ale fluviilor mai mari (Nilul, Indul, Eufratul, Gangele, Senegal, Niger) nu suferă de *epidemie* pronunțată decît în epoca retragerii apelor. Locurile ocupate în mod permanent de apă, nu contribuie la epidemie (lanurile de orez). Deci cea mai bună profilaxie antimalarică este *inundarea solului*, alături de *drenarea mlăștinilor* (cultură extensivă), pe cîtă vreme defrișările și abandonarea agriculturii favorizează izbucnirea ei. ³⁾

Împletind acum acești trei factori climatici, tabloul general al influențelor atmosferice (12) ne arată că majoritatea bolilor infecțioase își au focarele lor în regiunile calde. Acestea sînt *centrele de dispersiune* ale unui mare număr de *pandemii*. Ținuturi, relativ mai ferite, se găsesc în zona, rece și polară (alpină) și în clima temperată continentală de tip siberian (Wütschlee).

Climate calde (ecvator, subecv. și trop.). Din pricina temperaturii ridicate, alături de apatia și atonia (budismul), se constată supra activitatea tegumentului și a ficatului, o stare de „iminență morbidă“ (Courmont), ce ușurează acțiunea factorilor patogeni. Așa numita „anemie tropicală“ este de obicei de origină parazitară (paludism, v. harta) ⁴⁾, ankilostomiază ⁵⁾, framboesia (16), disenteria ambiană cu abcesul ficatului (în disenteria bacilară se observă des și în zona temperată); febra recurentă, febra galbenă (15), febra dengue, tripanozomiază, boli pestilențiale cu caracter endemic pronunțat (holeră, ciumă), apoi lepră (13), elefantiaza, filariaza, mal del pinto (America), boli prin excelență climatice (adică provocate în mod direct de fac-

1) O acomodare explicată de Fourdanet prin *anoxemie*.

2) În regiunile bînuite de malarie, *populația se refugiază în munți dinaintea țînțarilor*.

3) În antichitate Campagna Romana, fiind bine cultivată, nu era atît de întinsă, cum este astăzi (12), p. 297).

4) Pe țărmurile înalte ale Somaliei (4) și pe podișul Etiopiei apare *varietatea mai ușoară a paludismului*. Această varietate are două maxime: primăvara și toamna. Forma *violentă* bîntue în schimb cu același intensitate în tot cursul anului.

5) Aceasta în zona temperată se ivește numai printre muncitori, care lucrează în tuneluri, mine, adică la *temperatură ridicată*.

torii climatici), cum este insolația (coup de chaleur), foarte frecventă în India. Mortalitatea în rîndurile raselor neacclimatizate este extrem de mare. În această zonă se impune Europeanilor o igienă specială.

În clima temperată fără sezon rece (clima subtropicală : mediterană și chineză) cu media anuală inferioară de 20°C și cu media a 4 luni inferioară de 10°C , se observă insolația (coup de lumière), eritema pelagrosă, dermatoze, mai ales în marile aglomerări (clou de Biskra, the Bagdad Bril, bonton d'alep, filaire de Médine etc.), febra mediterană (Maltă fever) (14), tifosul exantematic, malară. ¹⁾

Clima temperată. Umiditatea constantă a climei oceanice are o influență defavorabilă asupra reumatismului, stărilor neuropatice (neurastenii), tuberculoză ²⁾, ra-chitism (4) (Anglia și Olanda).

Climă reci și polare. Verietatea oceanică a acestei clime (cl. norvegiană ³⁾) e în special foarte sănătoasă, totuși tuberculoza este destul de frecventă în Terra-Nova, Groenlanda etc. Bolile infecțioase sînt rari, apare însă meningita cerebro spinală, poliomieli-tă (Norvegia) și în regiunile continentale gripa (Rusia), pneumonia, oftalmia (cauzată de zăpadă), scorbutul (expediții). Traumatismele au caracter grav. Din cauza temperaturii scăzute, mulți agenți patogeni (*Stegomia fasciata*) nu au acces în această zonă.

Cercetările etiologice au demonstrat, că în realitate problemele nosogeografice sînt legate de influența mediului fizic ⁴⁾ asupra agenților patogeni principali sau secundari provocatori (microrganisme, flagelate, bacterii), sau numai transmițători (mijlocitori) de boli. În această ordine de idei, geograful trebuie să cerceteze aspectul acestei formațiuni biogeografice în raport cu mediul, al cărui component cel mai important este clima, pentru a ajunge la formula de convergență (după expresia d-lui prof. S. Mehedinți). Gradul de exactitate și prin urmare de stabilitate a hărților epidemiologice este în cea mai strînsă dependență de ariile de răspîndire ale acestor agenți și mai ales ale celor secundari, pentru că majoritatea celor principali sînt cosmopolite, ele putînd fi cultivate fără nici o greutate în laboratoarele institutelor bacteriologice pentru experiențe și sînt susceptibile la infecții. În realitate factorii rezponzabili sînt mijlocitorii paraziților. De ex.: ciuma este de fapt răspîndită prin intermediul unui ectoparazit al șobolanului. Distribuția geografică a lui *Anopheles maculipennis*, care prin înțepătura lui transmite hematozoarul lui Laveran, are aceeași importanță pentru răspîndirea malariei, ca și *Culex fatigans* pentru febra dengue, *Stegomia fasciata* pentru febra galbenă sau *Glossina palpalis* pentru tripanozomiază (21).

Dar și mai mult decît atîta : în foarte multe cazuri agenții secundari sînt cosmopoliți și ei (ectoparaziții omului, ai șobolanului, etc.) și numai condițiile de contact variază (S. Brunhes) prin intervenția omului : defrișări, grupările omenești, regimul apelor, săparea canalelor ⁵⁾, războaie (disenteria, paludismul, tifosul exantematic, spinochetoza icterohemoragică), direcția și intensitatea mișcărilor omenești, circulația, înaintarea pandemiei de gripă din 1918—1919, s'a făcut paralel cu căile de comunicație (19), pelerinajele ⁶⁾ (Meca, Benares), receptivitatea raselor (24).

Cu alte cuvinte, pornind din principiul extensiunii, cu considerație la influ-

1) Mai ales în Italia (Campagna di Roma, terra din Lavoro, Principato Citeriore, Napoli), pre-
valența ei deservește spre latitudini mai mari.

2) Cu congestie pulmonară.

3) Și în Alaska.

4) E vrednic de relevat că se poate urmări cu precizie răspîndirea boalei somnului (tripano-
zomiază) dealungul malurilor împădurite ale căilor, deoarece musce tse-tse (*Glossina palpalis*) nu
părăsește pădurile la o distanță mai mare de 300 m.

5) După construirea canalului Panama a izbucnit deodată febra galbenă, iar paludismul, cu
ocazia săpării canalului Suez.

6) Vezi măsurile internaționale luate pentru împiedecarea răspîndirii holerei pe această cale
(13, pag. 326).

ența *directă* a factorilor climatici, preocuparea celor ce studiau chestiunile de mai sus se îndreaptă în mod irevocabil spre *problemele antropogeografice* ce a condus, în ultima analiză, la *ideea conexiunii* fenomenelor geografice de această ordine, la așa numitul „*esprit géographique*” a lui I. Brunhes.

LITERATURA

(1) *Neveu Lemaire*, Principes d'hygiène et de médecine coloniale, Paris, 1924. (2) *Mühry*, Die geographischen Verhältnisse der Krankheiten, Leipzig u. Heidelberg 1856. (3) *Boudin*, Géographie et statistiques médicales, Paris, 1817. (4) *Hirsch*, Handbuch der hist. geogr. Pathologie, Stuttgart, 1881—86, vol. I—III. (5) *J. Minier*, Le facteur pathogène en géogr. humaine, Bordeaux, 1929. (6) *M. Sorre*, Complexes pathogènes et géographie médicale, Ann. de Géogr. XLII, 1933, p. 1—18. (7) *I. Brunhes*, La Géographie humaine, Paris, 1934. (8) *Berghaus*, Phys. Atlas. abt. VIII. Völkerkunde, Yotha, 1892. (9) *I. Wütschke*, Die geogr. Verbreitung von Krankheiten in Dr. A. Permann's Mittheilungen, A. 67. Martie 1921, p. 53. (10) *J. Fischer*, Mortalită per *infezione malarica* in ciascun comune del regno d'Italia nei treanni 1890—1892 in Penisola Italiana, p. 356. (11) *Grote*, Über die geogr. Verbreitung d. Krankh. Geogr. Zeitschr. XXV, 1919, p. 185 ss. (12) *Courmont*, Précis d'hygiène, Paris, 1914, p. 297-98. (13) *E. Ehlers*, La distr. géographique de la lèpre, 1893. (14) *I. A. Hislop*, The geogr. distrib. of *Malta fever*, Brit. med. J., 1902. Sept. (15) *L. O. Howard*, Concerning the geogr. distrib. of the *yellow fever* mosquito (Publ. Health. Rep. XVIII. Nr. 46. Washington, 1903. (16) *Vocos Milroy*, Geogr. of the *disease*, Med. Times and gazette, London, 1880, VI. (17) *G. Mayer*, Die geogr. Verbr. der *Schlafkrankheit*, Pet. Mitth. 1910. (18) *Haeser*, Lehrb. d. Gesch. d. Med. u. der epid. Krankheiten, Iena, 1853—65, v. II. (19) *Bernard-Debré*, Cours d'hygiène, Epidémiologie. t. I. p. 487. (20) *K. Andree*, geogr. des Welthandels, Stuttg. 1909, I, p. 256. (21) *A. Laveran-J. Mesnil*, Trypanosomes et trypanosomiases, Paris, 1904. (22) *K. Meuse*, Handbuch d. Tropenkrankheiten, 5 Bde., 2 Aufl. Leipzig, 1913. (23) *Scheube*, Die Krankh. d. warmen Länder, 4 Aufl. Iena, 1910. (24) *Greely*, Race resistance, Medic. Record, New-York, 1912.

Influența atmosferei din punct de vedere *pur medical* (meteoropatologia) a fost studiată de prof. *Brumpt*, prof. *Moriquand*, *Annes Dias* (despre barometrice), prof. *Rochaix*, *Trillat* (umiditatea aerului), *Laignel-Lavastine*, *Pech* (electricitatea atmosferei) și prof. *Moro*, dela Heidelberg (importanța anotimpurilor în endocrinologie).

Se mai pot consulta: *A. Aimes*, Météoropathologie, Paris, 1932; *L. Savignon*, Des phénomènes météorologiques en pathologie humaine, Paris, 1935; *Pasteur Vallery-Radot*, Météorologie et Médecine, Revue des deux Mondes, 708, 1938, 1 Avril, p. 659—673; *E. Guyot*, L'utilité des observ. météorologiques, Scientia, t. IV, 1938, p. 236.




Profesorul Gheorghe Țițeica

de

ILIE I. POPA

Conferențiar la Universitatea din Iași

În locuința-i liniștită din agitatul București, s'a stîns din viață profesorul Gheorghe Țițeica după o suferință de aproape două luni. Viața lui a fost o viață de neconținută năzuire, fără hodină și fără vane iluzii. Puțini sînt oamenii care să-și fi închinat întreaga lor ființă pentru împlinirea menirii lor, cum și-a închinat-o Țițeica. Pentru a reuși în această tentativă, și-a calculat



† GHEORGHE ȚIȚEICA (1873–1939)

în așa chip acțiunile încît nici o împrejurare să nu-l poată găsi nepregătit de a o înfrunța și învinge. Imi amintesc de minunatele-i conferințe ce-a făcut, acum doi ani, la Universitatea din Roma : și-le pregătea cu emoția unui școlar ! Plimbîndu-ne prin mărițe sau pitorești străzi ale Romei, mi-a povestit un episod din viața sa : Copil fiind, și-a rupt mîna. I s'a spus că de n'o va purta, va rămîne fără mînă. În ciuda durerii, copilul a făcut tot ce-a putut pentru a fi întreg pentru lupta vieții. Întîmplarea mi se pare semnificativă !

Prin viața lui rectilinie ca și prin opera sa, Țițica a fost și va rămîne un model.

Gheorghe Țițica s'a născut la 4 Octombrie 1873 la Turnul Severin, unde a făcut și școala primară. Liceul l-a făcut la Craiova, iar universitatea la București unde a luat licența în matematici la 1896. De aici pleacă la Paris unde intră în Școala Normală Superioară. Din timpul petrecut la Școala Normală, Țițica păstra cele mai plăcute amintiri. În 1899 a trecut doctoratul în matematici cu o lucrare remarcabilă de geometrie diferențială. Vorbea totdeauna cu emoție de „incomparabilul profesor“ Gaston Darboux, sub direcția căruia și-a lucrat teza.

Intors în țară, a fost numit profesor la Universitatea din București, mai apoi și la Școala Politehnică, la care a funcționat pînă în ultima clipă a vieții.

În 1913 este ales membru al Academiei Romîne în locul lui Spiru Haret; iar dela 1929 a fost secretarul ei general.

Iată descrisă în puține rînduri, viața unuia ce-a fost unul din cei mai buni fii ai neamului.

Pe lîngă activitatea științifică, Țițica a desfășurat o altă de educare. Prin „Gazeta Matematică“, „Natura“, „Adamachi“... el a dus lupta împotriva întunericului. Multe din aceste articole de popularizare pot fi socotite pagini de antologie ale genului.

Opera matematică a lui Țițica este mai mult de adîncime decît de întindere. Cu mici excepții, s'ar putea spune că el a cercetat o singură problemă. Dar ce bogăție de rezultate, și ce variație de metode! Deaceia, cînd i s'a cerut să scrie un apendice la tratatul voluminos „Geometria proiectivă diferențială“ a lui Fubini și Čech despre o bună parte din opera sa, Țițica a putut să și-o rezume în 5-6 pagini.

O problemă de deformare a unor suprafețe l-a condus la clasa de suprafețe pentru care

$$\frac{K}{p^4} = \text{constant},$$

unde K reprezintă curbura totală într'un punct oarecare M al suprafeței iar p distanța dela un punct fix O — numit centru — la planul tangent suprafeței în punctul considerat. Fără a cunoaște o mică notă a lui Mehmke, Țițica arată că aceste suprafețe își păstrează proprietatea considerată dacă se supun la afinități ce conservă centrul O . Trebuie să observăm aici că această parte a operei lui Țițica a fost adîncită și sistematizată de cîțiva ieșeni. Mai tîrziu, Țițica a aratat că liniile asimptotice ale suprafețelor de mai sus se bucură de proprietatea

$$\frac{T}{p^2} = \text{constant},$$

unde T e torsiunea într'un punct oarecare al curbei iar p distanța dela centrul O la planul osculator curbei în punctul considerat.

A mai considerat suprafețele și curbele pentru care

$$\frac{K}{\cos^4 \theta} \text{ respectiv } \frac{T}{\cos^2 \theta} \text{ sînt constante,}$$

unde K și T au semnificații ca mai sus, iar θ este unghiul normalei, respectiv, al normalei principale, cu o direcție fixă. Aceste suprafețe și curbe au fost numite suprafețele și curbele „lui Țițica“.

Pentru suprafețele sale, a dat o serie de proprietăți caracteristice cu ajutorul riglatelor asimptotice sau anume complexe liniare. Suprafețele lui Țițica

riglate se bucură de proprietăți simple în legătură cu desfășurabilele asimptotice sau cu liniile lor flecnodale.

Pe de altă parte, Țițeica a observat că găsirea suprafețelor de mai sus se reduce la rezolvarea unui anume sistem de ecuații lineare cu derivate parțiale.

Fie cercetarea directă a suprafețelor de mai sus, fie studiul sistemului pomenit, formează o bună parte din opera sa.

Cel de-al doilea punct de vedere l-a condus la cercetarea mai amănunțită a unor anumite rețele și congruențe de drepte. În special, s'a ocupat de rețelele cu șirul lui Laplace periodic (cu diferite perioade), rețelele înscrise sau circumscrise, auto-proiective...

Interesantă mi se pare problema „Să se studieze limita transformatelor lui Laplace ale unei rețele” pe care Țițeica a pus-o la congresul internațional de matematici dela Toronto din 1924, precum și cazul pe care l-a cercetat complet.

În volumul „Géométrie différentielle projective des réseaux” apărut în 1923, Țițeica a strâns o bună parte din rezultatele de geometrie proiectivă diferențială și nu-s puțini geometrii care recurg încă la acest tratat.

Ași dori să pomenesc încă cercetările sale de geometrie proiectivă diferențială a curbilor dintr'un spațiu cu un număr oarecare de dimensiuni. Introducerea curbilor derivate și antiderivate unei curbe i-a permis să rezolve, prin metode noi și elegante, diverse probleme. Găsirea antiderivatelor unei curbe, care ar părea să comporte integrări, se reduce — datorită dualității — la derivări. Eleganța acestui rezultat cred că nu scapă nimănui. Un caz particular îl formează problema lui Koenigs (a transformatelor asimptotice).

Pornind dela proprietățile interesante ale curbilor trase pe cuadrice, Țițeica s'a ocupat de așa zisele curbe patratică. O anume clasificare a curbilor patratică din spațiul cu 5 dimensiuni poate fi considerată, totodată, ca o clasificare a riglatelor din spațiul cu trei dimensiuni, precum și a unor anume mișcări.

În ultima vreme se ocupa de unele probleme de transformări conforme. Și desigur că în caetul său, cu tartajul școlăresc de care nu se despărțea niciodată, se vor fi aflând multe probleme deabia schițate!

Am dori ca, atunci când timpurile o vor îngădui, să se ridice întru veșnică aducere aminte cel mai frumos monument ce se poate închina unui savant: tipărirea operei complete.

Note și informațiuni

Pericolul aeroc-himic și protecția populației civile. — Într'o comunicare recentă la *Société Scientifique du Dauphiné* d. dr. *Ét. Berthet*¹⁾ s'a ocupat de această problemă atât de interesantă în vremurile actuale. Am crezut util să redau cât mai fidel această importantă comunicare.

S'a creat în populația civilă o atmosferă misterioasă de teamă justificată în jurul gazurilor de luptă. În general presa și operele de vulgarizare rău informate au contribuit mult la răspîndirea unor idei false sau neclare despre aceste gaze. Armata chimică este înfățișată cînd ca un flagel contra căruia orice protecție este zadarnică, cînd ca un pericol neexistent.

1) *Procès-Verbaux Mensuels de la Soc. Scient. du Dauphiné*, 18-e année, No. 141, 1938.

S'a exagerat mult și 'ntr'un sens și'n altul, din cauza necunoașterii datelor problemei, a ignorării progreselor artei militare și a posibilităților agresive ale armatei aero-chimice.

Războiul de astăzi se deosebește mult de cel de odinioară. Lupta corp la corp s'a transformat într'un război industrial perfecționat și fără milă bazat pe armele științifice cele mai moderne și pe moblizarea națiunii întregi. Este așa numitul „război total“.

Acestui „război total“, întreaga populație civilă trebuie să-i opue o „apărare totală“. Numai astfel populația orașelor poate contribui la opera păcii prin dejucarea mijloacelor de acțiune ale adversarului.

Gazele toxice au fost întrebuințate pentru prima dată ca armă de război în marele război dela 1914—1918. Omenirea întreagă a fost atunci cuprinsă de indignare. Diverse conferențe internaționale și protocolul dela Geneva din Iunie 1925 au condamnat sever și au interzis războiul chimic și bacteriologic.

Cu toate aceste pericolul aero-chimic subsistă și motivele pentru care el este de temut sînt de două feluri:

1) *De ordin militar* și 2) *de ordin economic și politic*.

Iată motivele de ordin militar: armata chimică este foarte eficace, ușor de întrebuințat și cu efect moral considerabil; ea crează și sporește panica, riscînd să paralizaze apărarea.

Cele de ordin economic și politic sînt: armele chimice sînt ușor de fabricat, materiile prime din care se prepară fiind curenți întrebuințate în industriile chimice de pace; e foarte ușor de transformat o fabrică de produse colorante, produse chimice, ori farmaceutice în uzină de război; nu este nevoie de o mîină de lucru specială pentru fabricarea armelor chimice. Aceste transformări nu desorganizează nici economia generală, nici activitatea industrială a unui stat. Prepararea armelor chimice scapă oricărui control internațional, căci materiile chimice utilizate au o întrebuințare curentă în timp de pace.

Însă pericolul aero-chimic nu trebuie să fie exagerat — cum fac unii — prin articole de presă și broșuri de vulganzare rău informate.

Căci aceste exagerări au un efect moral desastroș asupra marelui public, care își pierde total încrederea în mijloacele de protecție ce i se recomandă.

Trei cauze limitează pericolul aero-chimic:

1) Faptul că nici o țară nu stăpînește absolut aerul; 2) pentru că nu s'a descoperit încă un „supragaz“ cu efecte fulgerătoare; 3) pentru că războiul cu gaze are doi dușmani, condițiile atmosferice adesea defavorabile emisiunii unei pinze de gaze toxice și greutatea de a obține pe o suprafață întinsă o concentrare masivă de gaze nocive cu adevărat eficace.

Principalele mijloace de protecție contra gazelor sînt:

1) măștile, 2) adăposturile și 3) dispersiunea populației civile.

Problema măștilor este departe de a fi pusă la punct pentru populația civilă. Se poate spune că în starea actuală de organizare, acest mijloc de protecție este iluzoriu. Mai întîi măștile sînt foarte scumpe și e greu de obligat toate familiile să aibă măști în număr suficient. Statul nu poate pune la dispoziția populației nici gratuit și nici măcar cu plată—dar cu preț modest—o mască a cărei funcționare să nu lase de dorit în momentul oportun. O mască de care nu te servești nu se poate păstra bine și nu poate da decît iluzia că asigură protecția individului în momentul atacului. În al doilea loc cum putem asigura cu măști protecția copiilor mici, în special a sugarilor?

Măștile pot servi cel mult la protecția populației active, adică a indivizilor care au de îndeplinit o funcție în timpul atacului.

Pentru restul populației, adică a părții pasive, copii, femei și bătrîni, soluția problemei stă în crearea de adăposturi și'n dispersiunea populației.

Problema adăposturilor. Prepararea adăposturilor subterane este de resortul arhitecților competenți, care singuri pot construi adăposturi sigure, impermeabile pentru gaze și rezistente. Un bun adăpost trebuie să întrunească pe lîngă aceste condiții și aceia de a avea asigurate accesele, reînoirea aerului interior, alimentarea și igiena elementară acelor refugiați. Este necesară apoi rezistența la năruire. Căci dacă imobilul se poate prăbuși în urma unui bombardament, atunci conductele de gaz și de apă se pot sparge și infiltrațiile de gaz toxic, apa, pot provoca moartea în mod stupid a celor așa zîși protejați.

În starea actuală a organizației noastre, amenajarea în fiecare imobil a „pivnițe-

lor-adăpost" este soluția cea mai simplă și mai puțin costisitoare a protecției colective. Proprietarii de imobile sau locatarii s'ar putea asocia pentru a organiza fără mari cheltuieli astfel de adăposturi.

Problema dispersiunii. Soluția cea mai bună și mai sigură a protecției populației civile contra primejdiei aero-chimice este împrăștierea populației civile în cuprinsul județului sau ținutului pe o rază mai mică sau mai mare.

Numai populația pasivă, care cuprinde persoanele ce nu joacă nici un rol în serviciile publice sau în serviciile de apărare în timpul atacului, poate fi răspândită temporar sau permanent în punctele cele mai puțin expuse.

Populația activă, bărbați și femei care lucrează în instituții și stabilimente publice—a căror activitate nu poate suferi nici o întrerupere pentru motive de ordin național (poliție, pompieri, servicii medicale, administrative, fabrici de muniții și armament, etc.) rămâne să se retragă în timpul agresiunii în adăposturi special amenajate.

Pentru dispersarea populației pasive, trebuie elaborat un plan detaliat, bine conceput și studiat din timp de pace, astfel încât execuția lui, în timp de surpriză, să fie ușoară. Trebuie organizate dinainte mijloacele de transport pe căile ferate, șosele, căile fluviale, la locurile destinate pentru dispersiune.

Aceste locuri, puțin importante, nu vor risca să fie luate drept obiective de inamic.

Fiecare cetățean trebuie să știe ce are de făcut în timp de atac aero-chimic, unde să se ducă și cum să se ducă. El trebuie să-și noteze totul cu grijă într'un carnet, din timp de pace.

Numai astfel vor putea fi cruțate și salvate un mare număr de vieți omenești.

D-rul *Etienne Berthet*¹⁾ — arată că chiar în Franța, eforturile de pînă acum ale statului privitoare la protecția populației civile sînt cu totul insuficiente. Și aceasta din cauza lipsei a două elemente: *centralizarea problemei* apărării pasive supt o singură autoritate competentă și totodată convinsă de importanța scopului urmărit, și apoi *creditele necesare*.

Însă o lege recentă „legea pentru organizarea generală a națiunii în timp de război” a fost votată în Franța în 1938. Această lege încredințează Ministerului Apărării Naționale această sarcină.

Și la noi ar putea statul să elaboreze un plan amănunțit care să permită dispersiunea rapidă temporară sau permanentă a populației pasive, cit și împrăștierea în diferite puncte ale țării a instituțiilor vitale și a resurselor absolut necesare în caz de război.

În împrejurările actuale se întrevide de ce importanță ar fi un astfel de plan Ministerului Apărării Naționale i-ar revine această sarcină, Ministerul de Finanțe urmînd să puie la dispoziție creditele necesare.

La această efortare trebuie să conlucreze și particularii fiind în joc propria lor salvare. Numai astfel, adică prin această colaborare a statului cu particularii se va putea realiza apărarea pasivă totală.

C. MOTAȘ

Date epidemiologice asupra unui focar de ankylostomiya canina din Stepa Bălților. — *Ankylostomiya canina* produsă de *Ankylostoma caninum* Ercolani 1859, studiată pentru prima oară în Franța de *Trasbot* și *Railliet* în 1879 se găsește și la noi pe cîine, lup, pisică, vulpe și epure (vezi Dr. Gr. Gr. Iamandi și Dr. D. Lăzărescu, *Ankylostoma Caninum*, 1934) sub forma de endemie de slabă intensitate. În afară de Franța, unde boala a fost studiată întâi, se mai găsește în Europa în Anglia, Germania, Italia, Rusia, România; în Asia (India), Africa occidentală și America.

În cursul verii anului 1936 și 1937 însă în regiunea stepei Bălților (bogată în

stîne de oi și cîini de stîină, lupi, vulpi, epuri, etc) endemia de *Ankylostomiya* a luat *caracterele unei epidemii acute*, îmbrăcînd o alură cu totul neobișnuită — poate avantajată de vreme sau alte cauze ce rămîn a fi stabilite — îmbolnăvind cu o mortalitate mare la unele stîne toți cîinii. Numai noi am văzut prin locurile ce le-am colindat peste 128 de cîini morți prin această boală și cîteva hoituri de lup.

Din spusele țăranilor băștinași, Țihlele și luncile de prin regiune ar fi fost pline, mai ales spre toamnă, în acei ani, de hoituri de lupi și vulpi, mai multe ca de obicei.

Considerînd evoluția și simptomatolo-

1) *Procès-Verbaux Mensuels de la Société Scientifique du Dauphiné*, 18-e année, No. 141, Grenoble 1938.

gia bolii precum și starea cadavrelor nu putea fi vorba de cît de *Ankylostomiază*, diagnostice ce de altfel au fost confirmate și prin necropsiile făcute de noi pe unele din aceste animale.

Clinic animalele bolnave au un habitus trist, par absente la toate chemările din jur, abătute, capul parcă îngreuiat privește numai spre pămînt. Conturul corpului deformat, țesutul adipos și muscular redus, aspect care se evidențiază și mai bine prin căderea părului care lasă pielea nudă, uscată și acoperită de scame fără a fi sîngerîndă, starea remarcată și denumită de țărani „*Rapăn*”. Tabloul clinic este completat prin diaree și dezinterie, scurgeri de sînge din nas, membrele oedemațiate, etc.

La *necropsie* — din cele șase intestine cercetate, toate conțineau *A. caninum* în cantitate enormă — ganglionii mezenterici hipertrofiați; pereții intestinului îngroșați și mucoasa intestinală semănată cu mici puncte hemoragice roșii vii de parcă ar fi ciuruită, cam 20—30 pe centimetru patrat.

Mortalitatea prin ankylostomiază în cursul acestei epidemii a atins un procentaj destul de ridicat, peste 40% din cîinii de stînă murind spre toamnă după o vară de boală. În plus, din cele peste 40 de examene coprologice făcute pe cîinii de stînă luați la întîmplare din regiune, 19 dintre ele erau intens pozitive.

Enunțăm această epidemie de ankylostomiază canină bazați pe faptul că boala fiind produsă de un mic nematod „*Ankylostoma caninum Ercolani*” foarte asemănător morfologic și care cere aceleași condițiuni de dezvoltare și trai ca și specia dela om „*Ankylostoma caninum*”, considerent pentru care, credem noi, n’ar fi exclus ca și specia umană s’o găsim în regiunea noastră. Bazați pe considerente clinice se pare că *Ankylostomiază umană* ar exista la noi; de altfel ea a și fost confirmată și prin examen coprologico-parazitar pe un autohton de către D-nul Profesor Dr. Gh. Zotta.

La noi în țară morfologia și biologia parazitului precum și boala produsă de el au fost studiate de unul din noi în 1934 împreună cu D-nul Dr. D. Lăzărescu.

Boala ar fi adusă în regiunea noastră, dacă nu ar fi chiar autohtonă, de lupi, care se știe că au obiceiuri călătorești legate de anotimpuri și la care am găsit o dată. Lupii trec din Rusia, unde se știe că este *Ankylostomiază*, în ținutul Prutului cînd Nistrul este înghețat sau

pot fi aduse și din sud, de prin Macedonia sau Dobrogea odată cu oile dobrogene și cîinii lor.

Dacă pagubele economice produse azi de acești nematozi pot fi socotite ca nu așa de însemnate, cu totul alta va fi situația însă cînd molima se va întinde la celelalte animale.

DR. GR. GR. IAMANDI și Dr. vêt. M. TECLU

Limita de nord a „Masivului Bîcului”. — Pentru a determina cu precizie limita geografică a unei regiuni este destul de greu, mai ales cînd, nu ai la îndemînă toate elementele fizice. „Regiunile naturale” în geografie, se delimitează prin adevărate „zone de tranziție”, variabile ca spațiu. Uneori, — cînd relieful variază brusc — peisagiul geografic urmează același ritm.

„*Masivul Bîcului*”, luat în ansamblu ca unitate geografică naturală, este destul de variat în amănunt. În ce privește limitele cu regiunile învecinate, variază în parte cu fiecare element geografic, dar se armonizează în largi zone de tranziție, în care se *conexează* toate aceste fapte geografice.

Masivul Bîcului, fiind legat în evoluția lui de „*Podișul-Sarmatic moldovenesc*”¹⁾ și situat în axul „*depresiunii moldovenesti*” din marginea platformei vechi rusești, a suferit mișcări destul de accentuate. Vechiul relief însă, a fost mascat prin depozitele pliocene noi și quaternare.

Nu se disting prin urmare clar, *linii tectonice* care ar putea să-i facă limita, decît doar spre apa Prutului și depresiunea Bălților.

Este deajuns totuși pentru geograf, să surprindă variații de peisaj geografic, pentru a încerca o astfel de limitare.

Pe o hartă morfologică, observăm că nivelul de peste 200 m. trece și la nord de valea *Culei* în așa numitul „*sistem al Ciulucurilor*”.

După unele fapte fizice, *Porucic*²⁾ ajunge la concluzia că pentru „*Codril Mari*” limita poate fi apa *Ciulucului-Mic* (pag. 182).

Peisajul geografic însă, manifestă schimbări chiar din valea *Culei*. La N. de această apă, relieful este erodat puternic, prezentînd creste și coaste repezi. Apele din „*sistemul Ciulucurilor*”, străbat spre

1) M. David, — Reg. „*Codrilor Bîcului*” față de „*Podișul Sarmatic moldovenesc*” — B. S. R. G. 1922.

2) Porucic, — „*Relieful teritoriului dintre Prut și Nistru*” — B. S. R. G. 1928.

răsărit culmi din ce în ce mai săltate invers ca la Sud de Cula.

Alături de aceste date, se pot adăuga fapte de ordin climateric prezența *antestepei* la N. de Cula, limita *așezărilor resfrate* din „Codru“, ocupația locuitorilor, aspectul etnic omogen la Sud de apa Culei, limita sudică a *așezărilor izolate* de Ruteni, ce se termină aproximativ tot pe această apă, cit și alte fapte trebuie să fie ținute în socoteală la trasarea unei limite spre Nord a „Mășivului“.

La cele de mai sus, se pot adăuga și alte dovezi, ce vor fi tratate pe larg într-o lucrare mai cuprinzătoare. Deocamdată punem problema dacă valea Culei poate forma o limită nordică în „Mășivul Bicului!“¹⁾...

ALEXANDRU OBREJA

Donația Profesorului Universitar Dr. Inginer Otin Cristea. — În epoca de criză, egoism și materialism feroce, în care trăim, e lucru rar să vedem, că mai sunt oameni—foarte puțin e drept—care să se sustragă influențelor inerente ale mediului și să dea dovadă de înalte sentimente de recunoștință și generozitate.

E cazul pilduitor al profesorului universitar Dr. Inginer Otin Cristea, Rectorul Politehnicii „Gh. Asachi“ din Iași.

Profesorul Otin Cristea n'a uitat că pe timpul, când era student, a fost lipsit de mijloace și cu toată sîrguința și munca sa dîră n'ar fi putut să-și creeze o situație, dacă n'ar fi intervenit împrejurarea favorabilă de a găsi o bursă din fondul Adamachi, pe care să o ocupe prin concurs.

Ca recunoștință pentru aceasta, acum cînd a ajuns la o situație materială mulțumitoare și la o demnitate de mare prestigiu în învățămînt, ca aceia de profesor universitar, printr'un legat adresat Președintelui Academiei Romîne, crează acestei Instituții, din economiile strînse cu trudă—căci nu e om bogat—un fond în valoare de 1.000.000 lei, din a cărui rentă să se acorde două burse studenților săraci, dar merituosi dela Politehnica din Iași: una fiind destinată secțiunii de Chimie, cealaltă la Electrotehnică.

Iată cum începe profesorul Otin actul său de donație.

„Domnule Președinte,

„Subsemnatul Doctor Inginer Otin

Cristea, fiind bursier Adamachi am putut să fac studii în străinătate—la Politehnica din Charlottenburg—ajungînd astfel profesor universitar și apoi Rector al Școalei Politehnice „Gh. Asachi“. Dorința mea fierbinte este de a fi și eu la rîndul meu de folos tinerelor elemente lipsite de mijloace, pentru care scop am decis a da contribuția mea în măsura puterilor mele“.

„Ca urmare, vă rog, să binevoiți a primi renta 5% în valoare nominală de lei 1.000.000 (un milion) mai jos specificată“... etc.

Mai departe, se recomandă în legatul său ca cele două burse să fie acordate prin examen studenților săraci, creștini ortodocși, etnic romîni. Nu se putea o mai bună măsură ca aceasta astăzi, cînd protecțiunea elementului românesc este recunoscută ca o necesitate națională.

Din restul venitului, profesorul Otin hotărăște să se dea din 4 în 4 ani, un premiu de călătorie, în străinătate, celui mai bun titrat al Politehnicii, după recomandarea consiliului Școalei.

Premiatul este dator să viziteze, în străinătate, instalațiuni industriale sau școlare de specialitate în scopul de a se instrui și perfecționa și nu de a căpăta vre'un nou titlu școlar, deoarece școlile noastre sunt destul de înzestrate pentru o asemenea pregătire.

O inovație interesantă a actului de donație este rambursarea burselor, de cei care le-au obținut, cu intenția din partea donatorului de a desvolta sentimentul de onoare și demnitate la cei cari s'au bucurat de avantajul de a fi putut să-și formeze prin acest ajutor, în mod mai lesnicios, o carieră în viață.

Reproducem acest pasagiu după actul în chestiune.

„În acelaș timp pentru a stimula pe de o parte sentimentul de ajutorare în viitorii cetățeni, care și au creat situații datorită faptului de a fi avut posibilitatea unei burse, iar pe de altă parte pentru a întări simțul demnității personale, fiecare bursier considerîndu-se numai ca deținătorul unui împrumut de onoare, iar nici decum al unui ajutor de gratitudine, înțeleg ca bursele înstitute de mine, să fie rambursabile în timp de 10 ani, în rate egale, începînd la un an, după ce fostul bursier își va fi făcut un rost prin exercitarea cunoștințelor căpătate, sau ocuparea unui post indicat de studiile făcute“.

„Deasemeni vor rambursa sumele primite și bursierii, cărora li s'a ridicat

3) Asupra acestei regiuni, ce-mi este încredințată ca subiect de „doctorat“ vom reveni la timpul cuvenit.

bursa neîndeplinind condițiile impuse“.

Și mai departe adaugă.

„Am găsit de cuviință, să impun rambursarea burselor, fiindcă am constatat, că cei mai mulți din foștii bursieri nu se mai gîndesc la cei, care se găsesc în suferință și cu toate că unii din ei au situații foarte înalte și chiar strălucite, datorită studiilor făcute cu ajutorul burselor, nu cred, din nenorocire, că sunt datori și ei la rîndul lor, să dea posibilitatea altora, să facă aceleași studii cu aceleași înlesniri. Și cîți din tinerii noștri nu rămîn astfel în obscuritate din lipsă de mijloace!“.

Prin urmare, donatorul dintr'un frumos sentiment al ajutorării celor buni, sîrguitori și merituosi, dar lipsiți de mijloace, face atenți pe cei care s'au bucurat cel puțin de avantajul unei burse, care le-a înlesnit promovarea studiilor și i-a condus la creșterea unei situații multumitoare în viață, că au obligația, și morală și materială să nu uite pe cei necăjiți și nevoiași. Nu le este îngăduit numai să privească la nevoile și necazurile celor, care se trudesă să ajungă prin muncă cinstită, dar sunt datori chiar să-i sprijine spre a le învinge. Ce frumos îndemn de iubire a aproapelui și de solidaritate a semenilor!

Profesorul Cristea Otin, prin donația de mai sus, a dat dovadă de o mare înțelegere a rostului timpurilor de azi. El vrea să stabilească prin aceasta, o tradiție bazată nu pe vorbe, ci pe fapte căutînd prin această pildă înălțătoare să împrăștie negura unei atmosfere înăbușitoare, în care se sbate o societate desorientată și copleșită de un materialism neînfrinat și de un egoism, care îi scoboară și-i degradează spiritul.

Deci, condiția esențială de continuitate și creație, care să stea la temelia sănătoasă a unei societăți, nu trebuie să fie satisfacerea nevoilor unui individ, ci posibilitatea de dezvoltare a cit mai mulți.

Fapta acestui profesor strălucit, conștiințios și mai presus de toate generos, dela Universitatea din Iași, arată că atît cultura cît și știința nu trebuie să devie un scop în sine, ci un mijloc de perfecțiune morală, spirituală, individuală și socială, și că singura condiție esențială a oricărui progres de perfecțiune omenească e în funcție de sine și de ceilalți. Din dania, de care vorbim, e logic să se tragă învățămîntul că adevărata cultură nu duce numai la adevăr, ci și la o delicateță de sentimente alese, la cunoașterea și la nevoia nu numai a unui

singur om, ci la tot ce fac și cred și ceilalți oameni, ea întreținînd în individ sentimentul perpetuu al relativului, care e chiar legea echilibrului.

Nimeni ca profesorul Otin nu ne oferă atîtea motive să-i admirăm generozitatea și gestul așa de înțelegătoare a nevoilor epocilor noastre, așa de legate de însănătoșirea societății noastre, așa de deschise la tot ce e frumos în natură și în suflet! Cîți, din cei cărora le stă în putință, îl vor imita!

Profesorul Otin, prin gestul făcut s'a achitat de o îndoită datorie, față de sine însuși și față de Instituția și semenii lui. E un gest, care înalță omul și cinstește Instituția, căreia îi aparține!

Prof. STAN IONESCU

Aspectele principale ale evoluției chimiei în veacul al XX-lea. — Profesorul Harold C. Urey (laureat al premiului Nobel) dela Universitatea Columbia (U. S. A.) descoperitorul apei grele, a descris recent evoluția Chimiei.

În cele ce urmează, dăm schematic după revista Nouvelles de la Chimie principalele cuceriri.

Dela începuturile Chimiei considerată ca știință sunt cam 150—200 de ani, în timpul cărora descoperirile s'au succedat într'un ritm accelerat. La începutul secolului al XIX-lea, Dalton a expus teoria atomică. În decursul acestui secol au fost descoperite 34 elemente, totalul ridicîndu-se în felul acesta la 81; a fost descoperit sistemul clasificării periodice; s'a făcut studiul sistematic al compușilor carbonului și sinteza compușilor existenți în produsele naturale. S'au enunțat legile fundamentale ale mecanicii statice.

Aruncînd însă o privire asupra progreselor realizate de Chimie dela sfîrșitul secolului trecut și pînă astăzi, am putea distinge următoarele etape:

1899, descoperirea teoriei cuantelor de către Planck; 1901, sinteza polipeptidelor de E. Fischer; 1902, hidrogenarea grăsimilor de către Normann; 1905—1913, elaborarea procedurii Haber (prepararea sintetică a amoniacului); 1906, legea a treia a termodinamicii de Nernst; 1908, bakelitul; 1911, atomul nuclear a lui Rutherford; 1911, descoperirea izotopilor (Fayans și Soddy); 1912, prepararea antocyaninelor pure (Willstaetter); 1913, teoria cuantică a atomului lui Bohr; 1816—1938, structura păturilor mononucleare (Langmuir); 1919, prima transmutare a elementelor (Rutherford); 1920—1930, dezvoltarea fabricării mătăsii artificiale; 1920-1938, chimia sterolelor, a aci-

zilor biliari și a hormonilor sexuali (Windaus, Ruzicka, Harter etc...); 1921, descoperirea insulinei (Baating, Paulescu); 1923, teoria electrolitelor (Debye-Hückel); 1923, ultra-centrifugarea și ponderile moleculare ale substanțelor biochimice (Svedberg); 1926, realizarea temperaturilor joase cu ajutorul metodelor magnetice (Giauque și Debye); 1926, teoria cuantică exactă (de Broglie); 1926, izolarea vitaminei B₁ în formă cristalină (Jensen și Donath); 1926, prepararea vitaminei D prin iradierea ergosterinei (Windaus și Pohb, Roseheim și Hess); 1927—1938, teoria valenței (Heitler, London, Hater, Pauling, Milliken); 1927, izolarea vitaminei C (Szent-Györgyi); 1927, aplicarea teoriei cuantice la cinetica reacțiilor (Polanyi, Eyring); 1922, sinteza porfirinelor (Hans Fischer); 1930—1938, cristalizarea enzimelor de Sommer, Northrup; 1931, descoperirea hidrogenului greu (deuteriu) (Urey); 1931, descoperirea cauciucului sintetic; 1931, constituția caratinoidelor și a vitaminei A (Harter); 1932, descoperirea enzimelor din flavine (Warburg); 1933, constituția co-fermenților; 1934, radioactivitatea artificială (F. și J. Joliot); 1935, izolarea de către Stanley a proteinei virusului care provoacă boala numită mozaic la tutun.

Iată pe scurt faptele care caracterizează progresele Chimiei în ultimii 38 de ani:

1. Creșterea cunoștințelor noastre în ceea ce privește structura moleculelor și a atomilor și aplicarea lor la interpretarea reacțiilor chimice.

2. Lărgirea domeniului biochimiei care a interpretat izolarea și sinteza compușilor existenți în organismele vii, precum și studiul întrebuințării în igienă și medicină.

3. Avântul luat de industria chimică.

În acest domeniu se poate cita importanța crescândă a hidrogenării materiilor grase, fapt care permite obținerea în cantități mari a grăsimilor consistente, plecând din materii prime ca uleiul din semințele de bumbac, sinteza compușilor azotați; materiile plastice; cauciucul sintetic; sinteza petrolului și hidrogenarea uleiului; oțelurile neoxidabile; coloranții, etc.

ELENA COZUBSCHI

licențiată în Chimie

Centenarul nașterii lui Ernest Solvay.— La 16 Aprilie 1938 s'a împlinit 100 de ani de la nașterea lui Ernest Solvay, acel care a dat numele său procedeului modern de fabricare a sodei,

Solvay s'a născut în satul Rebecq (Bel-

gia), unde tatăl său exploata o ocnă și fabrica sarea pe bucătărie din sarea gemă brută. Trimis împreună cu un frate mai mic la pensionul din Malonne de lângă Namur se simți îndată atras de Științele Naturale și de Chimie.

Îmbolnăvindu-se însă greu, micul Ernest a fost nevoit să-și întrerupă studiile, iar după însănătoșire părinții îl trimiseră la Anvers să studieze comerțul. Neîmpăcându-se cu acest fel de învățătură, pleacă la unchiul său, care conducea uzina de gaz din Schaerbeck, unul din cartierele orașului Bruxelles. Aici tânărul Solvay se ocupă mai ales cu utilizarea apelor de la spălarea gazului obținut din amoniac și bicarbonat de amoniu. În același timp își puse marea problemă — care-i va aduce faima — să cerceteze dacă dintr'un amestec de apă amoniacală, clorură de sodiu și acid carbonic nu s'ar putea obține carbonat de sodiu. Pulverizând carbonatul de amoniu și vărsându-l deasupra clorurei de amoniu, constată formarea sodei. Spiritul său practic îl îndeamnă să ridice această operație, în aparență simplă, la un procedeu industrial. Grație abilității sale în ceea ce privește construirea aparatelor, el reuși să reducă la minimum degajarea amoniacului și să înlăture inconvenientul cauzat de pierderea prea repede a căldurii rezultate din reacție.

Primul brevet, Solvay îl obține în 1861, iar cu doi ani mai târziu fondă, în colaborare cu fratele său și câțiva prieteni, societatea „Solvay et Cie” având un capital de 136000 fr. Abia în 1865 începu fabricarea sodei, ajungând ca în anul următor să obțină cam 1500 kg. carbonat pe zi, așa că în douăzeci de ani, noul procedeu a înlocuit în practică metoda Leblanc, nu numai în Belgia, dar și în Franța, Anglia, Austro-Ungaria, Rusia, Spania, Statele Unite și actualmente cantitatea de aproximativ 4 milioane tone, ce se obține anual, este aproape în întregime realizată după procedeul Solvay.

Activitatea industrială a lui Ernest Solvay nu s'a limitat numai la fabricarea sodei. El s'a interesat de producerea prin electroliză a hidraților alcalini și a clorului. Cumpărând brevetele lui Castner și Kellner, el modifică procedeele întrebuințând catoda de mercur. S'a mai ocupat cu fabricarea amoniacului sintetic. Activitatea aceasta prodigioasă pe tărîmul industriei a fost curmată în ziua de 26 Maiu 1922 când Ernest Solvay a murit la Bruxelles. Solvay a rămas posterității și ca un mare filantrop.

ELENA COZUBSCHI

Conferințe. — Se știe că, nu există echivalență perfectă între ideile și cuvînt, căci cuvintele pot avea diferite interpretări, iar ideile pot fi denaturate, atunci cînd sînt exteriorizate. În exprimarea gîndurilor se deosebesc două mijloace de comunicație: vorba scrisă — cu o difuziune lentă, dar durabilă — și vorba rostită, care are unicul avantaj față de cea dintîi, de a avea un efect mai rapid și de a fi însoțită de așa numitele echivalențe expresive, care fac o mai strînsă legătură între ideile și limbaj. Nuanțele gîndurilor sau a stărilor sufletești, găsesc o expresie mai fericită prin cuvîntul vorbit.

Este inutil să mai arăt, așa dar, importanța conferințelor. În special, cînd ele tratează subiecte din domeniul științei, ele pot stîrni un interes general, tocmai pentru că — indeobște — știința este rezervată ca preocupare, chiar auxiliară, unui cerc restrîns de indivizi. O conferință științifică le-ar prileji astfel cîștigarea de noi cunoștințe cît și o schematică orientare în evoluția acestei minunate discipline, și aceasta cu un minim de efort. Și să nu uităm că, exceptînd problemele mai înalte, știința este pe cît de interesantă, pe atît de necesară oricui.

În iarna 1938-1939, în Aula Universității, cîți-va profesori ai Facultăților de Științe și de Medicină din Iași, au ținut să expună publicului ieșan cîte o fărîmă din domeniul preocupărilor lor imediate. Faptul că, ieșenii au arătat suficient interes, ne face să ne gîndim că, oricare ar fi misiunea socială, mirajele vieții actuale nu i-a separat complet de ritmul vieții normale.

Dăm mai jos lista conferințelor, și nu putem să nu adăugăm regretul, de a nu fi ascultat și cuvîntul altor reprezentanți atît de demni ai Științei romînești.

11 Decembrie 1938. D. Prof. univ. *Const. Moțaș* despre „Viața în apele de munte” (organizată de Soc. studențească „Prietenii Naturii”).

25 Februarie 1939. D. Prof. univ. *Const. Moțaș* despre „Viața în apele stătătoare” (organizată de „Asociația Creștină a Femeilor Romîne”).

26 Februarie 1939. D. Prof. univ. *Horia Hulubei* despre „Cercetarea științifică” (organizată de Asoc. Creștină a Femeilor Romine).

5 Martie 1939. Dl. Prof. *Dr. I. Nicolaie*, despre „Tuberculoza în lumina ultimelor cercetări”, (organizată de Asoc. pentru Profilaxia Tuberculozei Iași).

11 Martie 1939. Dl. Prof. univ. *Stan Ionescu*, despre „Parazitismul vegetal în

comparație cu parazitismul social”. (organizată de societatea studențească „Prietenii Naturii”).

19 Martie 1939. Dl. Prof. *Dr. Eug. A-burel*, despre „Problema căsătoriei” (organizată de Gimnaziul Industrial Tereza General Milicescu Iași).

25 Martie 1939. Dl. Prof. *Dr. Gr. T. Popa*, despre „Adolescența și pericolele ei” (organizată de „Asociația Amicale Tinerilor Fete”).

N. A. F.

Al II-lea congres internațional al Federațiunii Societăților Latine de Eugenică. — Societățile de Eugenică din țările latine sunt constituite într-o Federație, care cu începere din 1937, a luat inițiativa organizării unor congrese internaționale periodice.

Primul Congres Internațional Latin de Eugenică s'a reunit la Paris dela 1—3 August 1937, și cu acel prilej s'a decis ca Congresul următor să se țină în România.

În consecință, Societatea Regală Română de Eugenică, împreună cu Secțiunea de Eugenie și Biopolitică a Soc. „Astra” din Sibiu și cu Secțiunea de Eugenică, Antropologie și Demografie a Institutului Social Român, s'au constituit în „Uniunea Societăților de Eugenică din România”, pentru organizarea celui de-al II-lea Congres Internațional Latin de Eugenică, sub președinția d-lui Prof. Dr. C. I. Parhon.

Congresul va avea loc în București dela 25—30 Septembrie 1939.

Data Congresului a fost fixată în legătură cu celelalte Congrese internaționale care se țin în cursul verii, în scopul de a da o cît mai frumoasă utilizare a vacanțelor. Astfel, în August se ține Congresul Internațional de Neurologie la Copenhaga; dela 23—30 August Congresul Internațional de Ereditate la Edinburg; apoi dela 29 August la 14 Septembrie Congresul Internațional de Sociologie dela București și dela 18—25 Septembrie Congresul Internațional de Antropologie dela Istambul. Apoi urmează Congresul de Eugenică dela București.

Prin urmare, participanții la Congresul Latin de Eugenică își vor putea aranja timpul în condițiunile cele mai convenabile, avînd în vedere că acest Congres interesează deopotrivă și pe genetisti, și pe neurologi, și pe sociologi, și pe antropologi, ba chiar tocmai acești specialiști sunt în acelaș timp și participanții cei mai calificați ai Congreselor de Eugenică.

Subiectele ce se vor discuta sunt următoarele:

1. *Mijloacele de profilaxie a boalelor ereditare.*

2. *Valoarea comparată a diferitelor mobile de creștere a populației.*

3. *Ereditatea și sensibilitatea la infecțiuni și la intoxicațiuni.*

4. *Ereditatea aptitudinilor intelectuale.*

5. *Rolul mutațiunilor în Eugenică.*

6. *Ereditatea și endocrinologia.*

Congresul se va termina prin una sau mai multe excursii în regiunile pitorești ale țării. În timpul Congresului se va organiza vizitarea diferitelor instituții științifice, artistice și sociale din București.

Taxa de participare este de 500 lei de persoană și se achită Secretariatului Congresului. În schimbul taxei, participanții vor primi lucrările Congresului, imprimate într'un volum îngrijit.

Un prospect definitiv va face cunoscut la timp toate detaliile de organizare a Congresului.

În timpul Congresului se vor aranja excursii și plimbări speciale pentru soțiile congresiștilor, sub supravegherea unui Comitet de doamne și domnișoare.

Comitetul de organizare se va îngriji de ușurări de transport și de găzduire.

Persoanele care doresc să participe la acest Congres se pot adresa la Secretariatul general: Profesor Dr. G. K. Constantinescu, Institutul Național Zootehnic, Str. Doctor Staicovici 63, București 6.

Avem astfel prilejul de a primi oaspeți distinși și de a le arăta colțurile pitorești ale țării noastre.

R.

PERSONALIA

D-l Ing. chimist *Anatolie Barbos*, a fost numit asistent la Laboratorul de Chimie Organică pe data de 1 Febr. 1939.

D-l *Constantin Martiniuc* a fost numit asistent-desenator la Laboratorul de Studii Geografice pe ziua de 1 Ianuarie 1939.

D-na *Natalia Șenchea* a fost numită asistentă la Laboratorul de Studii Geografice pe ziua de 1 Ianuarie 1939.

D-na *Natalia Melnic* a trecut examenul de doctorat în Științe Naturale în ziua de 1 Martie 1939, lucrarea prezentată fiind intitulată: „Cercetări asupra Metabolismului potențial la Rana esculenta. Geneza glycogenului hepatic și a glycogenului muscular, în regim exclusiv glucidic“.

D-l Ing. *G. D'Albon*, și-a susținut teza de doctorat în Electrotehnică la Școala Politehnică „G. Asachi“ din Iași, Simbătă 18 Martie 1939, lucrarea prezentată fiind intitulată: „Permeabilitatea păturilor subțiri de fer în înaltă frecvență și în măști statice“.

Dări de samă

Lucie Manolescu-Pavelescu: *Les phénomènes de coloration des dérivés de la thio 2 aryl-3-hidroxy-4-tetrahydro-1.2.3.4-quinazoline.* (Annales Scientifiques de l'Université de Jassy, Tome XXV Année 1939, Fasc. I.) Teză de doctorat.

Lucrarea de doctorat în chimie al D-nei Pavelescu aduce lămuriri în ce privește fenomenele de colorare observate de către D-l Prof. C. V. Gheorghiu la compușii de tiotetrahidrochinazolină. Acești compuși au proprietatea, fiind solviți în benzen, toluen, xilen, piridină, etc. să se coloreze la încălzire, fenomen ce se observă și în apropierea punctelor de fuziune ale substanțelor respective.

Acelaș fenomen, numit de „halocromie“, a mai fost observat și la alte clase

de compuși organici și în special la spiropirane și a format obiectul de studiu al mai multor chimiști, care au încercat să lămurească și cauza lui. În ultimul timp lucrările lui W. Dilthey și a colaboratorilor săi au adus argumente puternice în favoarea unei disocieri sau ionizări intramoleculare, încât fenomenele de colorare nu mai apar acum ca fiind datorite unor anumite grupări cromofore: $=C=O$; $-N=N-$ etc., ci apariției unui dipol (o legătură heteropolară între un atom de C, coordinativ nesaturat și o grupare acidă). Compușii de acest fel au fost numiți de către Dilthey: „sări carbenium“, pentru a arăta starea de nesaturare a atomului de carbon, care joacă rol de cromofor; vechile grupuri cro-

mofore fiind considerate ca cromofori dubli.

În cazul derivaților de tio-2-aryl-3-tetrahidrochinazolină s'a admis drept cauză a fenomenului de halocromie, o deciclizare a nucleului de tetrahidrochinazolină și anume între atomul de N3 și atomul de C4. Deoarece însă în molecula acestor compuși mai există și o grupă tionică: $=C=S$, care ar putea da naștere de asemenea la un dipol intern, cu alte cuvinte la un cromofor. D-na L. M. Pavelescu prepară o serie de compuși halogenomercurați, prin care blochează tocmai această grupă și constată că și în acest caz halocromia persistă.

De aici concluzia că numai deciclizarea mai sus amintită, cu formarea unui dipol respectiv este cauza fenomenului. În lucrarea aceasta se constată că efectul batocrom este mai puternic la S decât la O; iar la derivații halogenomercurați, acest efect crește cu greutatea atomică de la Cl la Br și la I, fie la seria tionică, fie la cea carbonilică.

Derivatul de Ag se obține mai greu și nu prezintă fenomenele acestea.

Se constată de asemenea că legătura tionică, respectiv carbonilică, precum și legătura tiolică, ce rezultă la compușii halogenomercurați, are o acțiune auxocromă pozitivă, adică favorizează formarea de cationi colorați.

În ce privește parte experimentală, D-na L. M. Pavelescu a preparat 43 compuși noi, făcând asupra lor cercetările și observațiile de mai sus.

Lucrarea a fost executată în laboratorul de Chimie organică a Universității din Iași, sub conducerea D-lui Prof. C. V. Gheorghiu.

A. BARBOS
Ing. chimist

G. Macovei: *Les gisements de pétrole*. 502 pag. cu 222 fig. în text. Edit. Masson et Cie. Paris, 1938.

D-l G. Macovei, directorul Institutului Geologic al României și profesor de Geologie la Școala Politehnică din București, publică în editura Masson din Paris un tratat asupra zăcămintelor de petrol, tratat pe care Domnul prof. Jacob, membru al Institutului și profesor la Sorbona, îl prezintă publicului cu următoarele cuvinte:

„C'est avec un véritable plaisir que je présente au public l'ouvrage de M. Georges Macovei, et je souhaite qu'à le lire on trouve le puissant intérêt que j'ai pris moi-même, lorsque m'en a été communiqué le manuscrit... „A tous égards,

le livre de notre ami de Bucarest est non seulement très instructif, mais il fait longuement réfléchir, et la Librairie Masson doit être félicité d'en avoir assuré l'édition“.

Pentru noi evenimentul acesta este din mai multe puncte de vedere interesant. În primul rând un tratat scris de un român și a apărut într-o editură străină este un lucru relativ rar și tocmai de aceea vrednic de relevat. În al doilea rând cartea D-lui profesor Macovei este primul tratat mai dezvoltat despre zăcămintele de petrol, care apare într-o limbă romanică. În fine pe noi ne interesează în deosebi faptul că experiența, de jumătate de veac, a științei geologice românești în materie de zăcămintele de petrol, este acum pentru prima dată pusă în mod amplu și sistematic la contribuție pentru lămurirea problemelor variate pe care le pune căutarea și exploatarea petrolului. Sub conducerea D-lui profesor L. Mrazec s'a format la Institutul Geologic o bine reputată școală românească, școală care, întemeiată pe observații făcute în țară, a putut susține puncte de vedere originale în ceea ce privește originea petrolului, deplasarea petrolului (migrarea) din roca de origine în roca de înmagazinare, raporturile petrolului cu gazele și cu apele de zăcămint etc.

Foarte interesantă a fost contribuția școlii românești și în ceea ce privește tectonica regiunilor purtătoare de petrol: un tip de cută, cuta cu simburile de străpungere poartă astăzi, universal cunoscut numele de „cută diapiră“ dat de D-l profesor Mrazec.

Dar, cu toate că mulți geologi și chimiști români au lucrat intens și susținut în petrol, s'a publicat foarte puțin în această direcție. Așa de ex. nu avem pînă acum nici o monografie geologică mai amplă a vreunui din cîmpurile noastre petrolifere, deși dosarele Institutului Geologic, ale Direcției Minelor și ale societăților petrolifere conțin nenumărate rapoarte cu informații bogate și judicioase în această privință. Lipsesc deasemeni aproape complet lucrări de sinteză care să folosească materialul autohton pentru deslegarea vreunei din problemele mari pe care le pune „petrolul“.

Judecată așa dar după publicații, contribuția românească în geologia și chimia petrolului apare ca foarte modestă, și, numai cei ce cunosc de aproape activitatea desfășurată la noi în această direcție, știau pînă acum că o astfel de apreciere ar fi cu totul nedreaptă, Citind cartea D-lui Macovei, în care contribuția

românească este pusă în evidență, vor ști acum și alții lucrul acesta. Deaceia se poate afirma, cred, că această carte este și o reabilitare și meritul acesta revine în întregime D-lui profesor Macovei.

Tratatul cuprinde două părți. Partea I-a intitulată geneza și caracterele zăcămintelor de petrol, este tocmai aceia care mi-a sugerat reflecțiile de mai sus. În partea a doua, „petrolul în lume”, se dau, după datele cele mai noi și cât se poate de concis, informații asupra zăcămintelor de petrol astăzi cunoscute.

Și modul cum a fost prezentată cartea de către profesorul Jacob și numele ajutorului mă dispensează de elogii.

ION ATANASIU

Profesor de geologie la Universitatea din Iași

Ion Simionescu: *Fauna României*. Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”, București 1938. 478 pag. 459 figuri în text și 6 planșe, din care 2 colorate.

Consecvent cu sine însuși, savantul profesor Ion Simionescu ne dăruiește o nouă lucrare de popularizare a științei, continuare — precum însuși o spune — a celeilalte opere „Țara Noastră”.

Cu talentul său neîntrecut de povestitor îndrăgostit de tot ce se leagă de pământul acestei țări, după ce ne-a purtat de la munte la șes și de la șes la mare, tălmăcind pe înțelesul tuturor tot ceia ce sufletul său sensibil a socotit bun și frumos, tot ce ochiul său de cercetător neobosit a văzut de la un capăt la altul a țării, ne înfățișează de data aceasta o altă latură demnă de cunoaștere: fauna țării noastre.

Luind în cercetare fiecare din ființele ce viețuiesc în aerul, în apele, pe pământul, sau în sub-pământul țării — peste 1200 de specii de viețuitoare — ne face cunoscute caracteristicile fiecărei specii, felul lor de viață, obiceiurile lor. Totul, într'un mod atît de omenesc, încît ni-i apropie pe acești conlocuitori ai noștri, făcîndu-ni-i simpatici și trezindu ne interesul de a-i cunoaște cît mai în-deaproape.

În paginile acestui volum, știința se îmbină atît de plăcut cu pitorescul, încît lectura lor te fură asemeni unor pagini de literatură aleasă.

Accesibil tuturor — datorită prețului modest — volumul „Fauna României” ar trebui să nu lipsească nimănui, profesori, studenți, elevi, cum și tuturor iubitorilor de natură.

Este un dar prețios, pe care ni-l oferă profesorul Ion Simionescu și nu ne în-

doim că împrejurările îi vor fi prielnice, pentru a ni-l complecta cu cea de a treia lucrare anunțată „Flora României.

I. ȘOAREC

Aurelian A. Popescu: *Noui contribuțiuni la fauna lepidopterelor din București și împrejurimi*. (24. pp. Acad. Rom. Mem. Sect. Științifice seria III. Tomul XIV. Man. 3. București 1938).

În această lucrare tînărul elev al D-lui Aristide Caradja comunică rezultatele cercetărilor sale asupra faunei Macrolepidoterelor din București și împrejurimi, trecînd în revistă circa 285 sp. și 23 var. ct. ab.

Printre formele studiate unele merită atenția noastră fiind rare sau puțin cunoscute în România ca de exemplu: *Epicnaptera ilicifolia* Z. (nouă pentru vechiul Regat); *Telesila virgo* Tr (găsită în jud. Arad-Inău. D-l Dioszeghy, apoi în Dobrogea, A. Popescu și la Tecuci, Alexinschi). *Plusia circumflesa* L. (element Ponto vest-Asiatic nou pentru România.

Specia *Catocula nymphagoga* Esp. (cunoscută la Balcic, și eu am un exemplar aflat de d. Dioszeghy în comuna Inău (Arad). Alte 2 specii *Lobophora polycomata* M. și *Ennomos fuscontoria* M. noi pentru V. Regat, citate numai pentru Transilvania.

D-l A. Popescu confirmă din nou existența gen. I-a Vernală pentru speciile: *Gonopterix rhamni* L și *Vanessa polychloros* L. lucru stabilit de subsemnatul în lucrarea ¹⁾ publicată în anul 1930.

Deasemenea studiul cuprinde unele observații interesante referitoare la efectul luminii asupra Lepidopterelor.

În general credem că lucrarea d-lui A. Popescu merită atenția specialiștilor.

A. ALEXINSCHI

Teodoresco, E. C.: *Sur les mouvements d'agglomération et de dispersion des zoospores d'algues*. (Ann. de Sc. Naturelles. Sér. Bot., 10-e série. Tome XX, 1938, pg. 261—420).

În lucrarea de față, d l prof. E. Teodorescu studiază modul de grupare al zoosporilor de *Dunaliella salina*, o algă verde Polyblefaridee. Aceste grupări sau aglomerațiuni, petrecîndu-se în general la lumină, d-sa studiază variația acestui fenomen, în primul rînd în raport cu radiațiunile luminoase de diferite lungimi de undă, transmise prin sticle colorate

1) Vidi: An. Acad. Rom. Mem. Sect. H. Tomul VII seria III Mem. 6. pag. 138 și 139.

Schott: roșii ($\lambda = 0,600 - 0,720$); verzi ($\lambda = 0,480 - 0,600$); albastre ($\lambda = 0,400 - 0,460$) și cenușii ($\lambda = 0,400 - 0,720$), precum și lumina albă (naturală sau artificială).

În acelaș timp variază, în diferite moduri și combinațiuni, multiplele condițiuni de cultură și experiență: apă salină naturală din lac (mediul natural al zoosporilor în Lacul-Sărat) amestecată sau nu cu soluție Knop în diferite proporții, diluată sau nu cu apă, sau concentrată cu sare de bucătărie; vasele de cultură mai mari sau mai mici, mai joase sau mai înalte, rotunde sau dreptunghiulare; condițiuni de temperatură variabile, alternanță de lumină de diferite culori, etc.

Ca rezultat general al acestor cercetări, vom arăta că zoosporii de *Dunaliella salina* au proprietatea de a se distribui și aranja, în mediul de cultură, în anumite moduri care nu sunt totdeauna aceleași ci variate în raport atît cu constituția mediului lichid în care se găsesc cît și cu temperatura, vîrsta zoosporilor, forma vasului, etc., dar mai ales în legătură cu felul radiațiunilor luminoase ce cad asupra lor.

Cele mai intense și mai variate aglomerări se petrec la radiațiunile vizibile cu unde lungi (roșii) și din ce în ce mai slabe spre cele cu lungimi de undă mici. Regretăm că nu putem da aici o imagine cît de slabă a aspectelor acestor aglomerări, întrucît ele sunt așa de variate încît în cele 345 figuri în care ele sînt reprezentate în lucrare, nu se găsesc două la fel.

Căutînd cauzele acestor aglomerări, autorul ajunge la convingerea că ele sunt de două feluri: cauze interne (endonome) care sunt factorii primari ai mișcărilor de aglomerare, dîndu-le un caracter de autonomie și cauze externe, a căror intervenție face ca aglomerările să se modifice deosebit în raport cu calitatea și cantitatea factorilor externi.

Autonomia mișcărilor de aglomerare a zoosporilor este în mod evident exprimată prin ritmicitatea lor, ele fiind periodice și monofazice, adică un ciclu de mișcări se petrece în 24 de ore, ritm care se continuă și în lipsa factorului lumină timp de 10—15 zile. Această continuare a mișcărilor nu ar fi datorită unei energii remanente, ci unei adaptațiuni a protoplasmei.

Fenomenul nu este datorit fototropismului căci cele mai intense și mai variate mișcări se petrec sub lumina roșie care nu este fototropică. Ele se petrec, mai slab, chiar și la întuneric.

Zoosporii sunt activi în aceste mișcări, căci ei luptă chiar și cu gravitatea. Ei sunt negativ geotropici; totuși în mișcările lor ei se înfundă adesea adînc în masa lichidului, activînd deci contra geotropismului lor.

Deasemeni, experiențele arată ușor că fenomenul nu este datorit, în esența sa, curenților de convecție.

Autorul nu caută să dea, pentru moment, explicație acestor mișcări. Factorii de care trebuie să se țină seamă sunt prea mulți și ipotezele lipsite de verificări. Promite că va reveni asupra acestor fenomene.

Este posibil că, aglomerîndu-se, zoosporii caută să și realizeze condițiuni de viață mai favorabile decît acele pe care le-ar avea în stare izolată.

D-sa aseamănă periodicitatea mișcărilor de aglomerare ale zoosporilor cu mișcările periodice de veghe și de somn a frunzelor prevăzute cu umflături motoare.

Prin lucrarea de față, D-l prof. Teodorescu aduce o prețioasă contribuție științei universale și un deosebit prestigiu mișcării științifice romînești.

VARVARA V. RADU

Constantin Papp: Caracterul florei împrejurimilor orașului Iași. (Lucrările Societății Geografice „D. Cantemir”, Univ. Iași I. 1937).

Faptul că în regiunea Iașului se întîlnesc 3 zone de vegetație și anume stepa, antestepa și pădurile de stejar și fag, face ca aici să se găsească o floră f. abundentă. Dacă se consideră o suprafață circulară, în centru fiind orașul Iași, iar raza fiind cca 15 km. în felul acesta se delimitează împrejurimile orașului Iași cu o supr. cam de 700 km².

Pe această suprafață relieful începe dela alt de 40 m. în valea Bahluiului și ajunge peste 400 m. la Repedeș și Birnova.

Dacă se face un raport între suprafața acestei regiuni și numărul de specii ce cresc pe ea, se ajunge la următoarele concluzii.

Pe suprafața Romîniei (294.000 km.²) cresc cam 3300 specii față de vre-o 9500 specii pentru flora Europei. Deci țara noastră posedă 35% din plantele vasculare din Europa. În ceiace privește numărul de genuri, Romînia posedă cam 50% din numărul genurilor europene.

Cît despre împrejurimile Iașului acestea posedă cam $\frac{1}{2}$ din numărul genurilor din Romînia și deci $\frac{1}{4}$ din totalul genurilor europene, deși această supra-

față reprezintă doar 0.002% din suprafața României și 0.000007% din a Europei. Cît privește flora bryologică, în jurul Iașului se găsesc $\frac{1}{4}$ din numărul genurilor din Europa. Aceste rezultate dovedesc că în jurul Iașului, există un mediu f. variat, datorit întretăerii a două districte floristice. Pe acest teritoriu în afară de elementele central europene se mai întîlnesc și elemente: montane, sud-estice, estice, pontice, circumpolare, sudice, sud-mediteranene, mediteranene, arctico-boreale, panonice, caucazice, sub-alpine, alpine, atlantice și endemice.

Caracterul florei este deci atît montan cît și sud răsăritean.

M. R.

Constantin Papp: *Contribution à la Bryogéographie des environs de Iași (II-ème Note)*. (Annales Scientifique de L'Univ. de Iassy. Seconde Partie Tome XXV Fasc. 2. (337-350).

Această lucrare este o continuare a unei contribuții anterioare (Contribution à la bryogéographie des environs de Jassy. Ann. Sc. Univ. Jasy XVI (1930) 555—561) în care se studiază briogeografia împrejurimilor orașului Iași pe o suprafață circulară cu raza cam de 15 km., avînd ca centru orașul Iași.

După ce se dau limitele extreme ale acestei suprafețe, autorul face cîteva considerații generale asupra caracterelor celor 3 zone vegetative, care se întîlnesc pe suprafața studiată și anume asupra stepei, antestepei și zonei pădurilor de stejar și fag.

Totodată se arată unde se găsesc aceste 3 zone de vegetație în împrejurimile Iașului. În partea sistematică a acestei lucrări sunt citate 105 specii noi pentru această regiune. Pentru fiecare specie în parte se dă suportul pe care crește precum și locul unde se găsește. Aceste 105 specii se adaugă la cele 117 deja cunoscute, ridicîndu-se astfel numărul briofitelor din jurul Iașului la 222 specii, aparținînd la 60 genuri.

Prin prezenta contribuție se adaugă un număr de 8 forme noi pentru literatura briologică.

În partea ecologică a lucrării se insistă asupra suporturilor pe care cresc diferitele briofite. Aceste suporturi sînt împărțite în următoarele 4 grupe mari: locuri deschise, păduri, scoarța arborilor și ape. În celelalte privește considerațiile geobotanice autorul face foarte interesante constatări asupra briofitelor ce cresc în cele 3 zone de vegetație amintite mai sus. Tot în acest capitol sunt

descrise și o serie de asociații ce cresc pe diferite suporturi ca: locuri deschise, trunchiuri de arbori, blocuri, calcare, etc.

În concluzii se arată că din cele 220 de specii de mușchi cunoscute în jurul Iașului, 17 sunt elemente geografice locale, repartizate în elemente montane, pontice, circumpolare, arctico-boreale, atlantice, sudestice, alpine și mediteranene. Variațiile condițiilor de trai, explică numeroasele forme noi:

Pe teritoriul studiat, așa de restrîns ca suprafață, se găsesc 59 genuri de mușchi, ceiace înseamnă cam $\frac{1}{4}$ din numărul genurilor din Europa.

Lucrarea este însoțită de 15 figuri și 6 scheme.

MIHAI RĂVĂRUȚ

Marie Celan: *Sur les chondriosomes. les plastes et les noyaux, au cours de l'évolution du cystocarpe chez Halopithys pinastroides*. (Gmel) Kütz. C. R. Ac. Sc. t. 206, p. 1982, 1938.

Studiînd chondriomul la Rhodomela-
cee, d-ra Celan găsește o regresie precoce a plastelor care se decolorează și se confundă cu ceilalți chondriosomi. Distinge la Halopithys pinastroides, un chondriom granulos sau fin baciliform, fără plaste deferențiate, și o citoplasmă densă nu numai în elementele esențiale ale cystocarpului dar și în peretele, format din celule vegetative, care le înconjoară. Ni se relevă astfel, între aceste părți diferite, o strînsă unitate fiziologică. Stadiile de reconstituiri ale plastelor din cystocarpul în creștere, seamănă cu cele dinmeristemul caulinar dela Fanerogame în timpul formării cloroplastelor.

Nucleul, pe care-l studiază prin metoda Feulgen, conține: mici grăunțe de cromatină, un nucleol, avînd în centru o granulă cromatică mai mare ca cele extra-nucleolare. Acest tip fundamental prezintă variații în diversele elemente ale cystocarpului: nucleii liniei germinale (cargogon, cel. anexe, carpospori) sînt mai săraci în cromatină (dau mai slab reacția Feulgen), pe cînd nucleii trofici, destinați să degenereze (din cel. axei cargogoniale, cel. procarpulul, etc), sînt voluminoși și bogați în cromatină (reacție Feulgen, intensă).

C. BURDUJA

Const. Papp și Gh. Petcu: *Catalog de semințe oferite în schimb de Grădina Botanică a Univ. Mihăilene din Iași, în anul 1938*. Tip. „Lucrătorii Asociați”, Lăpușneanu 8 Iași:

Ca în fiecare an dela înființarea gră-

dinii botanice pe lângă Universitatea din Iași și în anul 1938, direcțiunea acestei grădini a scos un catalog de semințe oferite în schimb celorlalte grădini botanice. Această grădină face schimb de semințe cu aproape 150 grădini botanice de pe tot globul. În catalogul de pe anul 1938 se găsesc 1100 specii de diferite plante din care cea mai mare parte sunt cultivate în grădina botanică. O parte din aceste semințe însă, sunt colectate de personalul laboratorului și grădinii botanice, din diferite regiuni ale țării, în special din împrejurimile orașului Iași, unde există o floră f. bogată și variată. Pentru a fi ușor de căutat în acest catalog, plantele au fost aranjate în ordinea alfabetică și nu după familii. După numărul speciilor din cataloagele ultimilor ani, se observă progresul pe care îl face această grădină botanică, așa de utilă pentru studiul Botanicii.

Catalogul din anul 1938 este al 16 catalog al acestei grădini.

M. R.

Marie Celan: *Nouvelles recherches préliminaires sur les synapses des Algues rouges.* C. R. Ac. Sc. t. 208, p. 116, 119.

Prin această nouă contribuție, d-ra Celan confirmă și completează rezultatele expuse anterior C. R. Ac. Sc. t. 206, p. 865, 1936; Adamachi, XXIV, 50, 1938). În comunicarea anterioară se arată că membrana synaptică prezintă reacțiuni de colorare specifice lipidelor. În prezenta, se descriu noi rezultate obținute prin metode diferite de colorare. Albasstrul de indophenol născînd colorează synapsele celulelor centrale și ale celorlalte celule vegetative, precum și cytoplasma celulelor centrale, mai pronunțat în partea distală și mai slab în cea proximală (aceste celule prezintă deci disimetria caracteristică celulelor conducătoare și în ele ar exista lipide cytoplasmice). Metoda Ciaccio ar arata că lipidele synaptice sunt alcătuite dintr'un amestec de lipide solubile în acetonă și de lipide insolubile în aceasta (lecitine). Fapt confirmat de reacția Romieu, pentru lecitine și de metoda Smith-Dietrich, pentru lipidele nesaturate (în synapse și'n cytoplasmă). Din aceste rezultate se trage încheierea că membrana synaptică ar fi o exagerare a peliculei lipidice fine ce înconjoară cytoplasma celulelor centrale (peliculă presupusă de diferiți fiziologi). Grație bogăției în lipide a cytoplasmei synapselor se explică de ce filamentele

fine, semnalate la nivelul acestora, fac impresia unor figuri myelinice.

C. BURDUJA

Ion T. Tarnavski: *Karyologische Untersuchungen an Halophyten aus Rumänien im Lichte Zyto-ökologischer und Zyto-geographischer Forschung.* (Buletinul Fac. de Științe din Cernăuți. Band. XII, 1938).

În ultima vreme literatura botanică s'a îmbogățit cu o sumă de lucrări în care se arată că ar exista o strînsă legătură între cytologia și răspîndirea plantelor. S'a arătat de exemplu că polyploidia ar fi influențată direct de acțiunea factorilor externi neprielnici, în special factorii climatici.

Astfel cytologul G. Tischler a ajuns la concluzia că plantele polyploide au o vitalitate mai mare față de factorii climatici extremi cum ar fi frigul sau căldura. J. Straub produce plante polyploide întrebuițînd scăderi brusce de temperatură sau tratări cu temperaturi joase și constante căpătînd astfel până la 35,6% polyploizi.

În felul acesta s'a ajuns la o nouă ramură de cercetări și anume cercetări cyto-oecologice. Plecînd dela cercetările lui Tischler, D-I I. Tarnavski a studiat din punct de vedere caryologic un număr de plante halophyte din țara noastră. Astfel d-sa a stabilit numărul de cromosomi la 38 specii halophyte; 31 din aceste cifre sunt noi pentru literatură.

Din aceste 38 halophyte 10 sunt polyploide iar 28 diploide.

Halophytele studiate de D-I Tarnavski prezintă o diferență de 25,38% cu privire la polyploizi, față de halophytele studiate de G. Tischler.

Astfel se deduce că polyploidia ar sta în legătură cu răspîndirea nordică a plantelor. S'a constatat apoi că *Triglochin maritimum* și *Salicornia herbacea* cari la nord sunt polyploide, la noi sunt diploide.

Muntzing a stabilit o legătură între polyploidie și vivacitatea plantelor. Constatările autorului lucrării de față nu sunt în concordanță cu teza lui Muntzing. Astfel *Plantago tenuiflora* care e anuală este polyploidă iar *P. sibirica*, Cornuti și maritima sunt diploide, deși sunt perene.

Numărul mare de diploizi la halophytele noastre s'ar explica prin aceea că, aceste halophyte n'au fost atinse de ghețari în timpul glaciațiunilor și deci ele și-au păstrat proprietățile cytologice primordiale.

Lucrarea este însoțită de 38 figuri.

MIHAI RĂVĂRUȚ

Dr. C. N. Cernescu: *Facteurs de climat et zones de sol en Roumanie*. Studii tehnice ale Institutului Geologic al României. București, anul 1934. Conține 70 pag. 3 hărți colorate, diverse tabele și diagrame.

Autorul în această lucrare pornește de la faptul că, pentru caracterizarea completă a tipurilor zonale de sol, este absolut necesară cunoașterea rațională a condițiilor climatice în care s'au format. Diferitele tipuri de sol suferă, în evoluția lor genetică, influența unui complex de procese fizico-chimice și biotice. Climatul cu diversele sale componente este unul din cei mai principali factori, care aduce transformări însemnate în formarea solurilor. Dar un rol foarte important îl joacă, în special, variația elementelor climatului în cursul unui an (ex: precipitațiunile, temperatura,). Apoi chiar procesele biotice, care au o așa mare influență asupra evoluției genetice a solului, sunt condiționate la rândul lor de elementele climatului și de variația acestora în timpul anului.

Acest adevăr a condus pe pedologii Școalei ruse la formula clară a două principii în formarea solurilor:

1. Pe aceeași rocă, în condițiuni climatice diferite, se pot forma tipuri de sol diferite.

2. Pe roci diferite, găsindu-se sub același climat, poate lua naștere același tip zonal de sol.

De remarcat, că atunci când e vorba de o comparație între zonele climatice și zonele solului, trebuie să facem abstracție de condițiunile locale și să nu considerăm decât solurile care, în condițiuni petrografice comparabile, au atins echilibrul climatic.

Urmează apoi discuțiunea sistemelor climatice propuse de diverși oameni de știință ca: W. Köppen, A. Penck, Zymkiewicz, Emm. De Martonne, R. Lang, A. Meyer, C. W. Thornthwaite, căutând aplicarea lor pentru caracterizarea tipurilor zonale de sol în România, în special.

Deși aceste sisteme climatologice sunt întemeiate pe păreri foarte juste, totuși autorul constată că unele din ele nu sunt îndeajuns de satisfăcătoare pentru a pune în evidență conexiunea care există între climat și sol.

Dr. Cernescu, întrebându-și sistemele de clasificare și de notare a climatelor lui Köppen, cu datele Institutului Meteorologic Central Român și bazat pe datele geobotanice ale teritoriului românesc, dresază o hartă foarte sugestivă a provinciilor climatice românești, atașată la urma textului. Pe această hartă se

bizuire pentru a determina variantele unui același tip de sol.

Pentru a pune mai bine în evidență influența regimului termic în geneza solului, C. W. Thornthwaite, stabilind sistemul său climatic cu ajutorul *eficienței termice și a eficacității precipitațiilor*, spune că: un tip climatic de sol nu poate fi caracterizat, decât prin doi factori, cel puțin; iar E. Ramann este de părere că trei mari valori pedoclimatice sunt: precipitațiunile, evaporațiunea și temperatura.

În același scop, autorul face o paralelă simplă între zonele de sol din România și zonele din Rusia și ajunge la concluzia că: factorii climatului pot să folosească pentru caracterizarea climatică a tipurilor de sol, dacă se găsesc cuprinși în limitele unei singure provincii climatice. Mai mult încă, D sa spune că pentru provinciile climatice vecine, simpla indicare a temperaturii medii anuale, alături de valoarea factorului climatic, care indică temperatura medie anuală și umiditatea, trebuie să figureze deasemeni formula care caracterizează provincia climatică respectivă.

După cit observăm, Dr. Cernescu dă o deosebită atențiune, pentru determinarea tipurilor de sol în România, în raport cu contribuția elementelor climatologice, noțiunii atât de prețioasă a *Indicelui de ariditate*, pusă în evidență de Dr. Prof. Emm. De Martonne.

Se știe că indicele de ariditate reprezintă raportul între precipitațiuni P și temperatură T, la care se mai adaugă coeficientul 10, care rămâne neschimbat oricare ar fi variabilitatea celor două elemente în cursul unui an $\left(\frac{P}{T+10}\right)$.

Autorul alege acest sistem în studiul formării solurilor, găsind că este extrem de ușor calculul și că valoarea aproximativă este mai apropiată în succesiunea de valori a raportului P/E (coeficientul hygrometric).

Foarte interesant de știut este că, în România, Dr. Prof. Mihai D. David a fost primul care a calculat indicele de ariditate chiar imediat după apariția acestei însemnate lucrări din domeniul Climatologiei. D-sa a construit curba indicelui de ariditate de la București ¹⁾.

Iar în anul 1926—1927, la cursul de Geografie fizică (Atmosferă-Hidrografie) Dr. Prof. M. David spune: „...această prețioasă noțiune pusă în evidență de

1) Vezi cursul de Geografie fizică litografiat în 1926—1927.

De Martonne își va găsi în natură aplicațiuni din ce în ce mai numeroase. Mă gândesc mai ales la problema foarte delicată a formării solurilor în care precipitațiunile atmosferice au un rol foarte important și unde cred că noțiunea indicelui de ariditate va putea da valori deosebite fiecărui sol, după cum îl dă pentru dezvoltarea vegetațiunii...”

Aceasta s'a putut îndeplini abia în 1934 prin studiul de față al d-lui Cernescu.

Autorul ține socoteală în această problemă de variația lunară a indicelui de ariditate, calculat de De Martonne după

formula: $\frac{12 P_m}{t_m + 10}$, datorită faptului că

în dinamismul proceselor solului, are un rol foarte important variația elementelor climatice în cursul unui an.

Astfel, pe lângă harta provinciilor climatice, D-sa dă și o hartă care reprezintă zonele de ariditate ale României. Dacă comparăm aceste două hărți, putem vedea cu destulă ușurință, care este regimul hygrometric (umiditate) și care este regimul termic al unei regiuni carec.

Iar pentru a desprinde repartitia diferitelor tipuri zonale de sol pe teritoriul României, ne servim de harta solurilor, în care D-sa folosește și datele Serviciului Agrogeologic, bazându-se totodată și pe harta orografică a României la sc: 1/1.500.000 precum și harta vegetației la aceeaș scară, a lui P. Enculescu.

Principiul după care s'a condus în efectuarea acestei hărți, atât de frumos colorată, a fost acela al grupării solurilor pe zone naturale, după principalele procese genetice.

Exemplu: Toate tipurile de cernoziom au fost grupate într-o singură zonă, fiindcă prezintă stadii diferite a unui acelaș tip de evoluție genetică, caracterizată prin levigarea sărurilor mai mult sau mai puțin solubile, prin stabilitatea complexului adsorptiv și prin acumularea humusului neutralizat.

După acelaș principiu al zonelor genetice autorul a împărțit regiunea solu-

rilor de tip podzolic în 2 zone: solurile de tip podzolic primar și solurile de tip podzolic secundar.

În prima zonă, ca urmare a influenței humusului acid, are loc distrugerea complexului argilos și migrațiunea fracționată a componentilor săi.

În a doua zonă, podzolizarea prezintă caracterul unei degradări a solurilor brune, manifestate prin migrațiunea complexului adsorptiv spre baza profilului, fără distrugerea prealabilă.

Partea interesantă și inovatoare a d-lui Cernescu în această lucrare este că, D-sa biziindu-se pe indicile de ariditate, ne dă diferite tabele și diagrame pentru cîteva localități din fiecare zonă de sol, din care se vede variația anuală și lunară a indicelui de ariditate. Astfel, autorul ne prezintă în harta D-sale „Zonele naturale de soluri din România”, următoarele tipuri zonale de sol, reprezentînd fiecare zonă printr-o culoare deosebită:

Zona solului brun-clar de stepă aridă;

Zona cernoziomului șocolat și castaniu, numită de Tr. Săvulescu și Stepa Siccipratum garminosum și altiherbosum;

Zona Cernoziomului degradat;

Zona de soluri brune (Ramann) sau soluri gris cenușii (tip podzolic secundar);

Zona solurilor regiunilor înalte (tip podzolic primar).

În afară de interesul deosebit pe care lucrarea d-lui Cernescu îl prezintă sub raportul strict agro-geologic, ea este tot atât de interesantă și din punct de vedere geografic prin atîtea aplicațiuni din domeniul Climatologiei, prin discutarea diferitelor sisteme de clasificare climatologică și aplicarea lor în domeniul agrogeologic. Dar mai ales sub acest raport ne arată o nouă științifică prin aplicarea noțiunii indicelui de ariditate în determinarea timpurilor de soluri, care în realitate formează baza mediului fizic al biosferei și al Geografiei umane.

NAT. ȘENCHEA

Laboratorul de Studii geografice Iași

Literatură științifică română

REVISTE:

Mathematica, volumul XIV, 1938; **S. Bergmann**: Über das Verhalten der Funktion von zwei komplexen Veränderlichen in Gebieten mit einer ausgezeichneten Randfläche; **G. Calugăreanu**: Sur les invariants de translation relatifs aux polynômes; **N. Ciorănescu**: Sur les fonctions de deux variables réelles douées d'analyticité hyperbolique et leurs applications; **A. Denjoy**: Sur le prolongement analytique de Weierstrass; **Gino Loria**: Contributi dall'Italia alle matematiche pure, dai tempi più remoti ai giorni nostri; **D. Mangeron**: Sur les noyaux associés à certains problèmes à la frontière pour une classe d'équations aux dérivées partielles d'ordre supérieur; **J. Marcinkiewicz et A. Zygmund**: Sur la série des puissances; **J. Marcinkiewicz**: Un théorème sur l'interpolation; **P. Montel**: Sur certains cas d'univalence ou de multivalence locales; **M. Nicolescu**: Sur les fonctions conjuguées; **Tib. Popoviciu**: Sur les solutions bornées et les solutions mesurables de certaines équations fonctionnelles; **W. Sierpinski**: Sur la décomposition des ensembles en sous-ensembles presque disjoints; **W. Sierpinski**: Sur la puissance de la famille de tous les ensembles fermés d'un espace; **C. Tolotti**: Sull'equilibrio delle piastre elastiche anulari libere; **E. A. Weiss**: Die Mannigfaltigkeit von Perazzo als Projektion der Segreschen Mannigfaltigkeit M^6_4 ; **Kentaro Yano**: La relativité non holonome et la théorie unitaire d'Einstein et Mayer; **A. Zygmund et J. Marcinkiewicz**: Sur les séries de puissances.

Bulletin Scientifique, de L'école Polytechnique de Timișoara, Tome 8, fasc. 3—4, 1939; **V. Alaci**: Solution analytique du problème des oscillations amorties; **V. Thébault**: Sur le théorème de Feuerbach; **Gh. Th. Gheorghiu**: Sur des fonctions Hypergéométriques confluentes; **Michel Ghermanescu**: Sur un problème de Mécanique; **Prof. Teofil T. Vescan**: The cosmological problem of the annihilation of the sun's mass, and the evolution of the planetary orbits; **Jean-Louis Destouches**: Sur l'unité de la physique théorique; **Prof. Dr. Ing. C. Căndeș** und **J. Kühn**: Destruktive Hydrierung eines rumänischen Handelspetroleums; **Prof. Dr. Ing. C. Căndeș** und **N. Cristodolu**: Die Oxydation von Mineralschmierölen; **Prof. Ing. Pompiliu Nicolau** și **Asist. Ing. Victor Gheorghiu**: Determinarea pierderilor de sarcină în conducte circulare drepte de diametru 250 mm și 125 mm; **V. Alacci**: L'intégration des Fonctions quadratiques; **O. N. Tino**: Sur l'extension du théorème de Hilbert-Schmidt dans le cas du noyau symétrisable; **Vincenzo G. Cavallaro**: Notes sur la géométrie du triangle; **Michel Ghermanescu**: Sur la variation du moment d'inertie par rapport aux plans passant par une droite; **Gheorghe Th. Gheorghiu**: Sur les reseaux à invariants égaux; **Dr. Ing. C. Căndeș**: Asupra constitutiei Diphenol-, Dithiophenol-, Di α și β Naphtol-, Dithionaphtol-, Dimetylanilin, Thionaphtenchinonelor, a Naphtolisatinei și a derivaților coloranți ai acestora; **Dr. Victor N. Lațiu**: Contribuțiuni la studiul microfiziografic al granitului dela Șoimoș-Radna (Contributions à l'étude microphysiographique du granitite de Șoi-

moș et Radna (Département Arad). (Résumé); **Prof. Ing. Pompiliu Nicolau** și **Asist. Ing. Victor Gheorghiu**: Studiul unor fenomene speciale la conductele sub presiune de diametru 250 mm; **Ing. A. Bărgăzan**: Influența numărului paleteilor asupra sarcinei de refulare la o pompă centrifugată; **Ing. Ilie Popescu**: Zăcămintele de aur încă neexplorate; **Comptes-rendu des séances de la Société scientifique de l'école polytechnique de Timișoara**.

Gazeta Matematică, București, Calea Griviței 158. Anul 44, Nr. 5, Ianuarie; Nr. 6, Februarie; Nr. 7, Martie 1939.

Revista Matematică din Timișoara, Școala Politehnică. Anul 18, Nr. 11, Ianuarie; Nr. 12, Martie; Anul 19, Nr. 1, Martie 1939.

Pitagora, Revistă de Matematici. Prof. N. N. Mihailescu, Liceul Moise Nicoară, Arad. Anul 4, Nr. 4, Ianuarie și Nr. 5—6, Martie 1939.

Buletinul A. G. I. R. București, Str. Romană 8, Anul XXI, Nr. 2, Februarie 1939.

Știință și Progres. Revista științifică a Liceelor Militare. Liceul Militar din Tîrgul Mureșului. Anul V, Nr. 6, Februarie; Nr. 7—8, Martie—Aprilie 1939.

Revista Științelor Medicale. Institutul de sururi și vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino”, București, Vol. XXVIII, Nr. 1. Ianuarie; Nr. 2, Februarie; Nr. 3, Martie 1939.

Viața Forestieră. București, B-dul Tache Ionescu 31. Anul VII, Nr. 1, Ianuarie; Nr. 2, Februarie; Nr. 3, Martie 1939.

Revista Pădurilor. București, B-dul Tache Ionescu 31. Anul V, Nr. 1, Ianuarie; Nr. 2, Februarie 1939.

Gazeta Farmaciilor. București, Str. Gen. S. Angelescu 145. Anul IV, Nr. 43, Noembrie; Nr. 44, Decembrie 1938.

Arhiva Veterinară. București, Prof. R. Vlădescu. Facultatea de Medicină Veterinară. Anul XXX, Nr. 5 și Nr. 6, 1938.

Transilvania. Buletin de tehnică a culturii, Sibiu. Anul 69, Nr. 5—6, Sept.-Dec. 1938. Anul 60, Nr. 1, Ianuarie—Februarie 1939.

Tinerimea Română. București. Anul 56, Nr. 9—10, Mai, Iunie 1938, număr jubiliar. Anul 57 Nr. 3—4, Nov. Dec. 1938; Nr. 5, Ianuarie; Nr. 6, Februarie; Nr. 7, Martie 1939.

Extemporal. Revista Liceului M. Eminescu, București. Anul IV, Nr. 2—4, Martie 1939.

Cuget Moldovenesc. Bălți, Str. I. Creangă 11. Anul VIII, Nr. 1—2, Ianuarie, Februarie 1939.

Viața Basarabiei. Chișinău, Str. Haralambie 142. Anul VIII, Nr. 1 Ianuarie 1939.

Gazeta Cărilor. Ploiești. Str. Lt. Zagorîț 1. Anul VIII, Nr. 11—12, Ianuarie; Nr. 13—14, Februarie 1939.

CĂRȚI ȘI BROȘURI ¹⁾

Iuliu Morariu, — Contribuțiuni la studiul unor asociații de plante suderale. Extras din „Arhiva Someșană” Nr. 25, 1939 25 pag.

Notițe dela Grădina Botanică din Cluj. Extrase din revista *Grădina mea*:

No. 25. **Prof. Al. Borza**. — Printre flori la San Remo. Anul IV, Nr. 4—5, 1938, 7 pag.

¹⁾ În ordinea primirii.

- No. 26. *Eugeniu V. Ghișă*. — Ginkgo biloba, un capac de modă veche, Idem. 3 pag.
- No. 27. *Prof. Al. Borza*. — Cuvîntare rostită la deschiderea expoziției de flori, 28 Aug. 1938. Anul IV Nr. 8—9, 1938, 2 pag.
- No. 28. *Trif. Augustin*. — Cauna Indice și varietățile ei superbe, Id., 3 pag.
- No. 29. *Mihai Ghiuță*. — Zoocediile mărului și părului în România, Id., 4 pag.
- No. 30. *Prof. Al. Borza*. — Grădina Exotică dela Monaco. Anul IV, Nr. 12, 1938, 4 pag. 8 figuri.
- No. 31. *Nucul*. — (Juglans regia L.) Anul IV, Nr. 12, 1938.
- No. 32. Idem. — Rostul Grădinelor Botanice. Extras din Natura. Anul XXVII, Nr. 3, 1938, 9 pag.
- Time V. *V. Radu*. — Étude cytophysiologiques de la germination. IV. Germination des spores de fougères à diverses températures. Extrait du Ann. Scientifiques de l'Univ. de Jassy. Tome XXV, Année 1939, Fasc. 1. pag. 327—336.

- Din „Biblioteca populară a Asociațiunii *Astra*”. Sibiu.
- Nr. 242. *Ion Agârbiceanu*. — Cărturarii romîni. 68 pag. 1937.
- Nr. 244. *George E. Racofi*. — Din durerile Maramureșului, piesă în 3 acte și 2 tablouri. 32 pag. 1938.
- Nr. 245. *Sabin S. Truția*. — Cămin pustit, piesă în 3 acte. 40 pag. 1938.
- Nr. 246. Idem. — Fire de nalbă, Povestiri. 96 pag. 1938.
- Nr. 247. *Ion Breazu și Ion Ghinezu*. — Poezii patriotice. Culegere 78 pag. 1938.
- Nr. 248. *Din viața sfinților*. — Viața celui dintre sfinți a părintelui nostru Ioan Gură de aur, patriarhul Constantinopolului. 109 pag. 1938.
- Nr. 249. *Ion Creangă*. — Povești, 55 pag. 1938.
- Nr. 250. *Ioan Pop. Reteganul*. — Povestiri. 77 pag. 1938.
- Nr. 251. *Dr. Valer Moldovan și Dr. Salvador Jurca*. — Despre cărțile feuduare și în-tabulări. 154 pag. 1938.

A APĂRUT:

România balneară și turistică

de

E. TEPOSU și VAL. PUȘCARIU

cu o prefață de Prof. I. Iacobovici
cu numeroase fotografii și schițe.

Edit. Cartea Românească.

Prețul 250 lei

A APĂRUT:

Cursul de Mecanică

Partea I-a

Noțiuni elementare asupra vectorilor
Calcul algebric, diferențial și integral.
Teoria potențialelor. Teoria câmpurilor.
Noțiuni asupra tensorilor. Exerciții

DE

Dr. IOAN I. PLĂCINTEANU

Profesor de mecanică la Universitatea din Iași

EDITURA LAB. DE MECANICĂ IAȘI — 1939

140 pag. Prețul 100 lei, pt. studenți 50 lei

A apărut:

Călăuza Ceahlăului

Se poate comanda la Soc. de Gimnastică, Sport și Muzică, str. Șc. de Arte, IAȘI **Lei 30**

A APĂRUT:

INTRODUCERE

IN

ELECTRICITATE ȘI MAGNETISM

Inducția. — Curentul alternativ. — Unde și oscilații electromagnetice. — T. F. S. —
Electroni, raze pozitive, raze X. — Radioactivitatea. — Electricitatea atmosferică.

DE

ȘT. PROCOPIU

Profesor la Universitatea din Iași

EDITURA LABORATORULUI DE ELECTRICITATE

Vol. II, 336 pag., 214 figuri.

Prețul 250 lei

A APĂRUT:

INTRODUCERE ÎN ELECTROCHIMIE

DE

P. BOGDAN

La autor

Profesor la Universitatea din Iași

Lei 80

A APĂRUT:

CĂLĂUZA EXCURSIONISTULUI LA MAREA NEAGRĂ

DE

A. POPOVICI-BÂNZOȘAN U

ȘI

M. R. IONESCU

Ed. Cartea Românească, Buc.

Lei 90

A APĂRUT:

FAUNA ROMÂNIEI

DE

Prof. I. SIMIONESCU

Membru al Academiei Române

Editura Fundației pentru Literatură și
Artă „Regele Carol II”, București

Lei 200

LES ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE JASSY

Organe de la Société Scientifique de Jassy

apare în fascicule, unite câte patru într'un volum.

Prețul volumului 400 lei.

Pentru orice privește redacția și administrația, a se adresa D-lor Profesori
OCTAV MAYER sau C. MOTĂȘ (Universitatea Iași).

A APĂRUT:

ȚARA NOASTRĂ

Oameni—locuri—lucruri

de **I. SIMIONESCU**

Profesor la Universitatea din București

Cu 249 figuri, 4 hărți și 24 planșe

Prețul lei 200.

Se poate comanda prin

CARTEA ROMÂNEASCĂ

A APĂRUT:

PLANTE VASCULARE

cuprinzând și chei dichotomice pentru de-
terminarea pînă la genuri a Briofitelor din
împrejurimile orașului Iași

DE

CONSTANTIN PAPP

Profesor de Botanică la Facultatea de Științe
din Iași

ȘI

MIHAI RĂVĂRUȚ

Asistent al Laboratorului de Botanică
al Facultății de Științe din Iași

1938 — Editura Laborat. de Botanică din Iași

Prețul 20 lei

CEL MAI MODERN

INSTITUT DE ARTE
GRAFICE ȘI EDITURA

BRAWO


CONST. BRAHĂ & EM. WOLOTZKY

IAȘI, STRADA ARCU N^o. 9

execută ori-ce lucrări tipografice cu prețurile cele mai avantajoase

Revista Științifică

« V. ADAMACHI »



S U M A R

Prof. Univ. Petru Bogdan. — Școala Normală Superioară din Iași.

C. V. Gheorghiu. — Profesorul G. G. Longinescu (cu portret).

St. Ionescu. — Fiziologia vegetală și însemnătatea ei.

Constantin Papp. — Considerațiuni asupra vegetației halofite a văiei pîrîului Elan (cu o hartă și 2 figuri).

Eugen A. Pora. — Migrațiile peștilor euryhalini (Anadromi și Catadromi) (cu 6 figuri).

Adriana Antoniu Murgoci. — Filogeneza sistemului urogenital la Vertebratele gnathostomate (cu 6 figuri).

Dr. Ing. Alex. Chelarescu. — Rolul bogățiilor naturale în apărarea națională.

NOTE ȘI INFORMAȚIUNI

V. Gh. Radu: 100 ani dela întemeierea teoriei celulare a structurii organismelor; **H. Chirilei:** Considerații fitosociologice și biologice asupra unei noi turbării din jud. Cîmpulung, Bucovina; **A. Murgoci:** Sistemul inter-renal, suprarenal și corpusculii lui Stannius, în seria vertebratelor; **Ing. Ion Teodoru:** Donații și recunoștință; **Elena Cozubschi:** Vîrsta hîrtiei poate fi determinată în mod precis; **Elena Cozubschi:** Centenarul descoperirii Chinonei de chimistul rus A. A. Voskresensky; **Personalia.**

DĂRI DE SAMĂ

Petru Dumitrașcu: Manual de turnătorie (*T. Farcaș*); **Grigore Antipa:** Hommage a son oeuvre (*A. A. Murgoci*); **Prof. Dr. V. Meruțiu:** Harta etnografică a Romîniei 1 : 1.000.000; **Mihail D. David:** Omagiu profesorului Simion Mehedinți la despărțirea sa de catedră (*C. Martiniuc*); **Gh. I. Nastase:** Itinerarii și popasuri basarabene (*M.*); **I. Rick:** Mișcarea aerului în Cîmpia Romîa (*M.*); **N. Lupu:** Contribuțiuni la studiul fizic și antropogeografic a regiunii subcarpatice din Bucovina, cunoscută în literatura geografică sub denumirea de „Bazinul Rădăușului” (*C. M.*).

LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ ROMÂNĂ

Prețul 50 Lei

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ «V. ADAMACHI»

APARE TRIMESTRIAL SUB ÎNGRIJIREA UNUI COMITET COMPUS DIN D-NII:

I. Simionescu (Profesor Univ. București), **Petru Bogdan**, **Const. Motăș**,
I. G. Botez, **Radu Cernătescu**, **Șt. Procopiu**, **T. Ionescu**, **I. I. Plă-
cințeanu**, **V. Zăhărescu**, **C. V. Gheorghiu** și **Const. Papp**
(Profesori la Universitatea Iași)

Tot ce privește redacția (articole, reviste, publicații) a se adresa D-lui
Prof. Petru Bogdan sau D-lui **Prof. C. Motăș**.

Tot ce privește administrația (mandate, subvențiuni) să se trimeată
D-lui **Prof. P. Bogdan** (Laboratorul de Fizică, Universitatea Iași).

ABONAMENTUL

Un an: 150 lei.

Pentru foștii bursieri ai Academiei din fondul V. Adamachi: 180 lei.

Pentru instituțiuni (laboratoare etc.); 200 lei.

Pentru studenți, preoți, învățători: 60 lei.

Abonamente de încurajare, pentru Instituții și Intreprinderi Indus-
triale mari, **lei 2000.**

Abonamentele se plătesc înainte, după primirea primului număr.

Cei ce nu vor să se aboneze, sunt rugați cu insistență a face cunos-
cut prin o carte poștală sau a refuza primul număr.

Domnii colaboratori sînt rugați a ține în samă cele ce urmează:

a) Nu se pot tipări articole mai lungi de șase pagini de tipar, nici
cu „urmare“; pentru fiecare notă și dare de samă, spațiul rezervat este cel
mult 2 coloane.

b) Articolele să fie scrise de preferință la mașină, pe o singură pa-
gină iar figurile definitiv desemnate, separat de text.

c) Colaboratorilor li se trimete numai înția corectură, dacă doresc.

d) Costul separatelor privește pe autori, care le comandă direct la
tipografie.

Ele nu vor putea fi rîdicate înainte de apariția revistei și vor purta
subtitlul: „Extras din Revista științifică V. Adamachi“. Autorii care do-
resc separate sînt rugați să indice pe manuscris numărul lor.

e) Manuscrisele se publică în ordinea sosirii; cele nepublicate nu se
înapoiază.

Pentru numerele neprimite, ad-ția nu răspunde; cei care doresc, pot
căpăta revista recomandat, adăugînd la prețul abonamentului încă 34 lei.

Pentru orice schimbare sau completare de adresă, rugăm a fi vestiți.

Laboratorul de Geologie al Universității posedă colecția revistei
noastre dela vol. IX — pînă la ultimul volum. Deasemeni există vol. VII,
din care au apărut numai n-rele 1 și 2 din cauza războiului. Vol. I — VI
inclusiv sînt complet epuizate, iar din vol. VIII ne lipsește nr. 1.

Prețul unui număr vechi, începînd dela vol. X înainte, este de 50 lei, iar
acel al unui număr din vol. VII-IX, de 80 lei.

N. R.—Facem cunoscut cetitorilor noștri că subvenția acestei reviste a fost
suprimată. Dacă doresc ea ea să mai apară, rugăm stăruitor să plătească a-
bonamentele.

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ

«V. A D A M A C H I»

Vol. XXV. — Nr. 2.

Aprilie—Iunie 1939.

Școala Normală Superioară din Iași ¹⁾

de

Prof. Univ. PETRU BOGDAN

Directorul Școlii Normale Superioare

În anuarul general al jubileului Universității din Iași pentru timpul 1860—1910, fostul profesor al Universității noastre, marele istoric A. D. Xenopol scrie : „În 1880 se adaugă o nouă îmbogățire a Universității, prin crearea unei Școli Normale Superioare, cu internat, menită a forma profesori secundari“. Din datele care mi-au fost puse, cu multă amabilitate, la îndămină de colegul nostru, d. prof. Ilie Minea, rezultă că, la 10 Iulie 1880, Ministerul Instrucțiunii anunță Rectoratul Universității din Iași că, cu începerea noului an școlar, va lua ființă o Școală Normală Superioară numai pentru Facultatea de Științe. Condițiile de admitere erau : 18 ani împliniți, naționalitate română, concurs, diploma de bacalaureat. Au fost prevăzute 24 locuri de bursieri, interni. Domnișoarele studente puteau urma ca externe cursurile și conferințele prevăzute pentru această școală. Consiliul Facultății de Științe, în ședința dela 18 Septembrie 1880, discută și hotărăște detaliile concursului de admitere ca bursieri la Școala Normală Superioară, care urma să înceapă a funcționa la 1 Octombrie 1880.

La 20 Octombrie 1880, prodecanul *St. Emilian*, convocă o nouă ședință a consiliului Facultății de Științe, pentru redactarea Regulamentului școlii, iar în ședința dela 3 Noembrie 1880 s'a cetit și aprobat acest regulament, potrivit căruia Decanul Facultății de Științe este recomandat ca director al școlii. Se mai recomandă următorii conferențieri : *Miltiade Tzony* și *Gr. Cobălcescu*. Ca subdirector fu recomandat *Leon Cosmovici*, doctor în științele naturale, care era în acel moment la Paris. În cursul lunii Noembrie 1880 era decan profesorul *C. Climescu*, care a fost prin urmare primul director al Școlii Normale Superioare înființată în toamna anului 1880.

În bugetul pe 1880—81 s'a prevăzut și cea de a doua secție a școlii, cea literară-filosofică.

La 3 Mai 1882 fu numit director profesorul *C. Dimitrescu-Iași*, iar cu ordinul ministerial din 7 Decembrie 1885 a fost numit director profesorul de fizică *I. G. Stavroica*, după permutarea lui *C. Dimitrescu* la București.

În ședința Consiliului profesoral al Facultății de Litere dela 19 Septembrie 1890 fu recomandat ca director al școlii d. prof. *I. Găvănescu*.

Domnul profesor Găvănescu fiind numit inspector, ministerul numește, în 1892 ca director al Școlii Normale Superioare pe profesorul de chimie organică *An. Obregia*, care a demisionat după o scurtă funcționare. Către sfârșitul anului 1893 fu numit director prof. *Petru Rîșcanu*. Se vede că numirea de directori ai Școlii Normale Superioare se făcea alternativ, dintre profesorii dela

1) Din cuvîntarea ținută în ziua de 5 Martie 1939, la inaugurarea Școlii Normale Superioare.

Litere și Științi. Când *Petru Rîșcanu* este numit în 1895 inspector școlar, ca director al Școalei Normale Superioare fu numit prof. *Aurel Mănescu*.

În genere, punerea în aplicație a unor măsuri se făcea la noi cu încetineală în urma unei rezistențe de inerție reală, datorită la factori complicați.

Școala Normală Superioară avea menirea să pregătească profesori secundari. Elevii ei, pe lângă cursurile universitare, urmau o serie de conferințe, menite a-i pregăti pentru scopul care fusese creată. Conferințele de matematici, de franceză, de română, etc., fură utilizate mai ales în scopul general de a ajuta studiile respective ale Facultăților. Conferințele de *Pedagogie*, făcute de profesorul *C. Leonardescu*, care trebuiau să fie urmate atât de studenții dela litere și filosofie, cât și de cei dela științi, nu-și ajunseră scopul, căci se reduceau la studii teoretice. Lipsa unei școli de aplicație se simțea din ce în ce mai intens.

De aceia prin 1894, directorul *Petru Rîșcanu*, obținu fonduri pentru o școală de aplicație. Natural s'a început cu clasa I-a de liceu. Studenții școalei normale au făcut lecții cu copiii. Din prima serie a acestor studenți făceam parte și eu. Diriginte era *N. Savin*. Această modestă școală de aplicație a fost simbul, din care s'a dezvoltat mai târziu Seminarul Pedagogic Universitar, prevăzut în legea de organizare a învățămîntului public din 23 Martie 1898. Cu anul 1898 Școala normală superioară încetează de a mai funcționa, iar directorul ei prof. *Aurel Mănescu* face cunoscut Rectoratului în 31 August 1898, că biblioteca Școalei pînă la formarea Seminarului Pedagogic, a fost depusă la Facultatea de Științi.

După această scurtă înșirare istorică, cred că este nevoie să răspundem la o întrebare, care se pune în mod natural: care a fost rolul Școalei Normale Superioare și care au fost roadele pe care ea le-a dat.

Acei care au fost elevi ai acestei școli își amintesc că de fapt, în acel timp, activitatea universitară se confunda în cea mai mare parte cu cea a elevilor Școalei Normale Superioare. Menirea ei dublă, de a da pe deoparte intelectuali, oameni de știință, iar pe de altă parte profesori, ea și-a îndeplinit-o, cred eu, cu prisosință. Din anuarul Universității noastre pe anul 1895/96 se constată că au trecut prin această școală cel puțin 159 elevi. Unii din ei se află încă în viață, alții au trecut la veșnicie ¹⁾.

Mulți sînt cunoscuți oameni de știință, profesori universitari, alții minunați directori de școli secundare,—educatori care au pregătit generația, mulțumită căreia s'a putut face România Mare.

Concursul de bursă făcea o selecție severă de elevi distinși cari se interesau de toate problemele, științifice, literare, politico-sociale, la ordinea zilei.

Devotată în totul structurii politice ce o avea România în cadrul Constituției de la 1866, generația normaliştilor a fost însuflețită de două mari idealuri naționale: 1) acela de a vedea pe toți românii într'un singur stat și 2) ridicarea din toate punctele de vedere a păturii țărănești. Sînt cele două fețe ale problemei naționale.

Mulți din foștii normalişti au avut norocul de a vedea soluțională problema unirii tuturor românilor într'un singur Stat. Problema țărănească este mai complicată și rezolvirea ei a cerut și cere eforturi și sacrificii deosebite.

Încă dela înființarea Academiei Mihăilene se văd preocupări pentru rezolvirea chestiunii țărănești. La o serbare școlară prezidată de domnul *Moldovei, Mihail Sturza*, unul din elevi *N. Ionescu* a recitat, spre surprinderea tuturor celor de față, versuri, care începeau cu cuvintele „ce-aveți voi cu țărani“, versuri cari au stîrnit mare emoție în acea adunare de boeri și cărturari prezidată de domnitor.

1) D-l prof. Bogdan a cetit lista foștilor elevi ai Școalei Normale Superioare, parte din aceștia aflîndu-se în sală.

Tot timpul care a urmat, problema aceasta fu agitată atît în școli, cît și în adunările politice, cari aveau să aducă Unirea Principatelor, independența și regatul. Problema țărănească era problema de fiecare moment a neamului și au-i de mirare, că normaliștii s'au ocupat cu însuflețire de dînsa, agitînd pentru soluționarea ei.

Din acest punct de vedere, noi, foștii normaliști, sîntem precursorii mișcării actuale, care caută să ridice cît mai mult nivelul material și moral al țărănimii, prin Organizația Serviciului Social, Cămine culturale și prin toată organizația de Stat. Suntem fericiți, că în fruntea mișcării actuale se găsește Iubitul nostru Suveran, Majestatea Sa Regele Carol II. Nu ne așteptăm ca problema să fie rezolvată repede, bătînd din palme; îndrumarea mișcării de către Augustul conducător va duce sigur la izbîndă, și această izbîndă ar constitui triumful definitiv al problemei naționale.

Domniilor-Voastre, domnilor normaliști, vă este rezervată onoarea de a contribui la reușita planului măreț și de a fi martori ai acestei noi victorii a românismului.

Profesorul G. G. Longinescu

(1869—1939)

de

C. V. GHEORGHIU

Profesor la Universitatea din Iași.

La 7 Aprilie 1939 s'a stins din viață la București profesorul G. G. Longinescu, după o muncă de 42 ani închinată învățămîntului secundar și universitar.

Născut la 12 Septembrie 1869 în Focșani, după terminarea școalei primare, studiază la liceul Național din Iași și apoi își ia licența în fizico-chimice la Universitatea din București în Octombrie 1892.

După licență pleacă cu fratele său Ștefan la Berlin. Aici, în urma recomandăției Doctorului Istrati, este primit în laboratorul celebrului savant Emil Fischer, unde își începe teza de doctorat, pe care o trece cu succes în Iulie 1896.

Intors în țară, este numit la 1 Septembrie 1896 profesor suplinitor la liceul Sf. Sava, unde profesează pînă în 1900. Prin anul școlar 1901—1902 îl găsim profesor de fizico-chimice la Iași la Școala normală Vasile Lupu, Liceul Internat și Școala de comerț gr. II. Trece iarăși la București, unde funcționează la liceele Sf. Sava, Mihai Viteazul și Lazăr.

În acest timp este chemat de Dr. Istrati ca asistent la cursul de chimie anorganică, fiind însărcinat să facă și cursuri de chimie generală. În 1906 este numit profesor agregat de chimie anorganică la Facultatea de Științe din București.


Numele tînărului profesor era deja cunoscut prin lucrarea sa făcută în colaborare cu W. Traube: „Asupra acizilor aminici din seria alifatică“ și mai ales prin lucrările sale despre polimerizarea substanțelor lichide și solide, lucrări care i-au creat reputația de savant.

Formula lui Longinescu relativă la asociația moleculară este luată în considerare de lumea științifică din apus, rezultatele găsite cu formula sa fiind în concordanță cu cele găsite prin formula lui Eötvös.

Ajuns profesor titular, Longinescu desfășoară o activitate excepțională, care i-a atras respectul și admirația tuturor studenților și foștilor studenți, care

i-au urmărit toate manifestările activității lui de ordin didactic, științific și cultural.

Ca profesor, Longinescu face un curs însuflețit, însoțit de numeroase experiențe, care entuziasmează pe tinerii studenți, care încă din liceu făcuse cunoștință cu cartea sa de chimie și mineralogie alcătuită în colaborare cu Dr. C. Istrati. Acest manual de chimie, care a ajuns la un număr mare de ediții, a avut cinstea de a fi tradus și în limba franceză, avînd o prefață de profe-



PROFESORUL G. G. LONGINESCU
(1869–1939)

sorul Camille Matignon dela „Collège de France“. Cursul său de chimie anorganică profesat la universitate a ajuns la ediția a XIX-a, fiind ținut la curent cu progresele științei.

Deși Longinescu a avut nenorocirea să-și piardă vederea încă din 1909, totuși el a continuat în condiții cu totul anormale bogata sa activitate în domeniul științific cît și acela al popularizării.

Longinescu a lucrat la Berlin în domeniul chimiei organice. Intors în țară, el se ocupă mai ales cu lucrări de chimie analitică și fizicală. Printre ultimele sale lucrări, au avut o primire elogioasă în lumea științifică străină lucrările

sale de analiză gravimetrică. Profesorul A. Boutaric scrie în „Revue Scientifique“ un articol elogios din care spicuim: „Profesorul G. Longinescu dela Universitatea din București a consacrat în cursul ultimilor ani o importantă serie de cercetări pentru perfecționarea metodelor de analiză gravimetrică în chimie. Concluziunile la care a ajuns constituie de sigur unul din cele mai mari progrese realizate în acest domeniu de o sută de ani și par susceptibile de a interesa prin simplitatea ca și prin generalitatea lor un mare număr de cercetători“. — Astfel, grație cercetărilor extrem de precise ale d-lui Longinescu, metodele noi și fecundă a fost deschisă în analiza gravimetrică“. Relativ la această lucrări Ing. Eugène Lemaire într'un articol din revista „Le Genie Civil“ scrie între altele: „De mai mulți ani Prof. G. Longinescu dela București caută și pune la punct noi metode de analiză chimică, mai ușoare, mai rapide și cel puțin tot atât de precise ca cele care sînt acum în uzul laboratoarelor. Metoda pe care Longinescu în colaborare cu I. I. Prundeanu o expun în No. 6-7 din 1936 al Buletinului științific al Academiei Romîne, fiind foarte generală, merită să fie expuse aici pe scurt, deoarece se pare că este chemată să aducă mari servicii în industrie, unde totdeauna este nevoie să se efectueze foarte repede dozările necesare în cursul fabricației“. Profesorul Longinescu a avut și o meritoasă activitate culturală. În 1905 scoate împreună cu profesorul Țițeica revista de popularizare „Natura“, care a ajuns azi la al XXVIII-a volum. În această revistă, Longinescu a scris singur peste 1100 pagini cu articole de popularizare din toate ramurile științei. Pe lângă articolele din Natura, Longinescu a mai publicat și următoarele cărți și broșuri:

1. Cronici științifice, 3 volume (1905—1951).
2. La Radio București (15 Cuvîntări) (1932).
3. Aerul lichid pe înțelesul tuturor (1933).
4. De vorbă cu strop de apă (1935).
5. Vrajitorul din Menlo-Park (1936).
6. Știință și credință (1937).
7. Reforma învățămîntului secundar (1931).
8. Indrumări metodice (1932).
9. Probleme culturale și școlare (1934).

Aceste cărți, scrise într'o limbă curat romînească și un stil plăcut, s'au răspindit așa de repede printre tineretul școlăresc și acei dornici de știință popularizată, încît unele din ele au apărut în mai multe ediții.

Moartea Prof. Longinescu lasă un mare gol în ogorul științei romînești, știință pe care a iubit-o și a glorificat-o ori de cîte ori a avut ocazie.

LISTA PRINCIPALELOR PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE ALE PROF. G. G. LONGINESCU.

1. Hydrazinosäure (mit W. Traube) Ber. dtsch. Chem. Ges. (1896), 29, 670.
2. Observation sur les températures d'ébullition de quelques corps organiques liquides. Ann. Sc. Univ. Iassy, (1901), I, 359-370.
3. Contribution à l'étude de la polymérisation des liquides organiques. Ann. Sc. Univ. Iassy, (1903), II, 126-130.
4. Sur la polymérisation des corps organiques à l'état solide. Ann. Sc. Univ. Iassy, (1903), II, 179-184.
5. Sur la polymérisation des corps anorganiques à l'état liquide et à l'état solide. Ann. Sc. Univ. Iassy, (1903), II, 288-294.
6. Nouvelles données sur la polymérisation des molécules à l'état liquide et à l'état solide. Ann. Sc. Univ. Iassy, (1904), III, 26-34.
7. Recherche de l'acide chlorhydrique en présence des acides bromhydrique et iodhydrique (en commun avec M^{lle} Gabriela Chaborski). Bull. de la sect. Sc. de l'Acad. Roumaine, (1920), No. 5-6.

8. Séparation des métaux du seconde groupe analytique (en commun avec Dr. G. P. Theodorescu). Bull. section Sc. Académie Roum., (1920), No. 7 9.
 9. Méthode simple pour la recherche de l'acide nitrique (en commun avec M-elle Dr. G. Chaborski). Bull. Section Sc. Académie Roum., (1920), No. 10.
 10. Contribution à l'étude des solutions considérées comme des mélanges binaires des liquides (en commun avec I. N. Longinescu). Soc. Roumaine des Sciences. (1923), XXVI, No. 1-3.
 11. Expériences de cours montrant d'une manière simple l'inflammabilité de l'acide iodhydrique et de l'hydrogène sulfuré (en commun avec C. N. Theodosiu). Soc. Roumaine des Sciences, (1923), XXVI, No. 1-3.
 12. Méthode simple pour la recherche du sodium et du potassium par voie humide (en commun avec M-elle Dr. G. Chaborski). Soc. Roum. des Sciences, (1923), XXVI, No. 1-3.
 13. Sur le rapport entre la température de fusion et de la température d'ébullition. Soc. Roum. des Sciences, (1923), XXVI, No. 4-6.
 14. Recherche du calcium en présence du baryum et strontium (en commun avec Dr. M-elle G. Chaborski), Soc. Roum. des Sciences, (1924), XXVII, No. 1-3.
 15. Recherche du fer, du manganèse et du chrome sans emploi d'acide nitrique (en commun avec M-elle E. Petrescu). Soc. Roum. des Sciences, (1924), XXVII, No. 1-2.
 16. Séparation des métaux du III-ème groupe analytique (en commun avec M-elle Dr. G. Chaborski). Soc. Roum. des Sciences, (1926), XXVII, No. 4 6.
 17. Sur la séparation de l'acide chlorhydrique d'avec les acides bromhydrique et iodhydrique (en commun avec M-elle Margareta N. Bădescu). Soc. Roum. des Sciences, (1926), XXIX, No. 1-3.
 18. Sur la séparation qualitative et quantitative de l'acide chlorhydrique d'avec les acides bromhydrique et iodhydrique (en commun avec M-elle M. N. Bădescu). Bull. Section Sc. Académie Roumaine, (1927), X, No. 6.
 19. Sur le dosage de l'acide chlorhydrique en présence des acides bromhydrique et iodhydrique (en commun avec Th. I. Pirtea). Bull. de chimie-pure et appliquée (1928), XXXI, No. 4 6.
 20. Molecular association, Chemical Reviews (1929), VI, No. 3.
 21. Sur le dosage direct de l'acide bromhydrique en présence de l'acide chlorhydrique (en commun avec Th. I. Pirtea). Bull. de chimie pure et appliquée, (1929), XXXII, No. 1-6.
 22. Méthode simple pour la recherche des traces d'acide chlorhydrique en présence d'acide bromhydrique (en commun avec Th. I. Pirtea). Bull. de chimie pure et appliquée, XXXII, No. 1-3.
 23. L'association moléculaire et la pression intérieure (en commun avec I. N. Longinescu). Bull. de chimie pure et appliquée, (1930), XXXIII, No. 1-3.
 24. Ueber einige neuere Methoden in der analytischen Chemie. Bull. de chimie pure et appliquée, (1931), XXXIV, No. 1 6.
 25. Relation entre le système périodique et les classifications chimiques. Bull. de chimie pure et appliquée, (1931), XXXIV, No. 1-6.
 26. Recherche qualitative et quantitative de l'acide chlorhydrique, en présence de l'acide bromhydrique, comme acide perchlorique, oxyde chromique et chromate de baryum (en commun avec I. I. Prundeanu). Bull. de chimie pure et appliquée (1931) XXXIV, No. 1-6.
 27. Recherche de l'acide nitrique comme fuchsine (en commun avec Th. I. Pirtea). Bull. de chimie pure et appliquée, (1931), XXXIV, No. 1-6.
 28. Dosage de l'acide bromhydrique en présence de l'acide chlorhydrique (en commun avec Ecaterina I. Prundeanu). Bull. section Sc. Académie Roum. (1935), Année XYII, No. 3-4.
 29. Analyses gravimétriques complètes par précipitation directe dans des creusets à masse filtrante d'lèna (en commun avec I. I. Prundeanu). Bull. section Sc. Académie Roum., (1935), No. 6-7.
-

Fiziologia vegetală și însemnătatea ei

de

ST. IONESCU

Profesor la Universitatea din Iași

Mulți dintre intelectuali și chiar dintre oamenii de știință nu cunosc și nu sînt familiarizați asupra obiectului și însemnătății unora dintre ramurile relativ nouă de științe biologice. Printre acestea este și *Fiziologia vegetală*. Deaceia voi căuta în articolul de față să stabilesc și să precizez, pe cit posibil, anumite noțiuni referitoare la cuprinsul și rolul acestei discipline în legătură cu celelalte științe bine cunoscute.

Printre vechile științe naturale nu exista o Fiziologie a plantelor, fiindcă majoritatea fenomenelor biochimice au fost descoperite și cercetate prin experiență. E drept că în antichitate, cercetătorii greci aplicau în cercetarea fenomenelor biologice metoda observației riguroase, dar din cauza lipsei de experimentare știința Fiziologiei vegetale n'a putut să se dezvolte în acest timp. E probabil că primele cunoștințe mai importante de botanică și chimie s'a aibă leagănul la Egiptenii vechi, la care necesitățile practice ale vieții au dat un impuls simțitor dezvoltării științelor medicale și agriculturii, care la rîndul lor au influențat, ca factori hotărîtori, în primele începuturi ale științelor naturale și chimiei.

La Arabi, ca și în evul mediu, botaniștii de atunci nu vedeau în studiul plantelor decît un interes curat practic. Ei căutau să descopere proprietățile curative ale plantelor neexaminînd de loc organizația lor din punct de vedere științific. La începutul secolului al XVI-lea, Chimia și Botanica trecură în mina medicilor stabilindu-se o legătură strînsă între medicină și științele naturale. Deabea deatunci înmuguriră primele începuturi de *Fiziologie și biochimie vegetală*. Ceiace este demn de remarcat, e faptul că tot în această perioadă s'au pus în mod științific primele pietre la temelie *Fizicei și Astronomiei*.

* * *

Dintre toți botaniștii secolului al XVI-lea e demn de amintit numai *Andrea Cesalpino*, care pe la 1583 aplică principii fizice la problema fiziologică a absorbției substanțelor și la circulația sevei în plante. N'a făcut însă nicio experiență, iar în lucrările sale nu se vede niciun principiu de chimie. Ca precursor al Biochimiei experimentale din această epocă este de amintit belgianul *Iohann Baptist van Helmont*. El s'a ocupat, cel dintîiu, cu studiul chimic al gazelor. A făcut cercetări asupra acidului carbonic stabilind că producerea lui se datorește arderii cărbunelui, fermentației mustului și acțiunii acizilor asupra pietrei de var (carbonat de calciu); el mai cunoștea că bioxidul de carbon asfixiază animalele și stinge flacăra unei lumînări. De la el avem, în domeniul biochimiei, cunoștințe de prima experiență de Fiziologie vegetală. A încercat să rezolve în mod experimental următoarea problemă: De unde provin în plante elementele constitutive minerale și organice? Pentru a dovedi aceasta a făcut următoarea experiență. A luat o cantitate de pămînt, bine uscat, l-a cîntărit și l-a pus într'un ghiveci, înfingînd în el o ramură de salcie în prealabil cîntărită. la toate măsurile ca să ferească ghiveciul de praf și udă zilnic pămîntul cu ramura plantată. După 5 ani de cercetări întrerupe experiența și constată că ramura de salcie s'a dezvoltat și a crescut puternic în greutate, pe cînd pămîntul din ghi-

veciu și-a păstrat aproape exact greutatea inițială. În urma acestei încercări a ajuns la concluzia că substanțele constitutive necesare dezvoltării plantelor și animalelor provin din apa de ploaie, prin transformarea ei. Aceste concluziuni greșite nu i pot fi reproșate decât insuficienței de experimentare; în orice caz dela experiența lui *van Helmont* fiziologia vegetală poate fi considerată ca angrenată în domeniul și dezvoltarea chimiei.

* * *

Trecând în secolul al XVII-lea, găsim fizicieni talentați, care se interesau de problemele chimice și biochimice. Technica aparatelor și arta de a experimenta în Fizică au adus servicii reale progresului Fiziologiei vegetale și biochimiei. Cităm dintre acești fizicieni pe *Rob. Boyle*, un geniu experimental cu totul extraordinar, care a lucrat în toate domeniile fizicale și chimice, cele mai importante. A inventat manometru, pompa de compresie, a descoperit fosforul și înfine cel mai de samă fapt științific al său este, fără îndoială, stabilirea legii proporționalității inverse a presiunii gazelor și volumelor lor, lege de care ține samă Fiziologia vegetală la pătrunderea și circulația gazelor în plantă.

În domeniul fiziologiei animale și vegetale în legătură cu noile date furnizate de Chimie, acest fizician cercetă influența aerului rarefiat asupra vieții animale, repetă experiențele de fiziologie vegetală ale lui *van Helmont* cu diferite alte plante; studie fosforescența lemnului putred și a peștelui stricat; puse în vidență, prin distilarea lemnului, alcoolul metylic și acidul pirolignos; el recunoscă că plantele putrede dezvoltă CO_2 . În fine cercetă să vadă, pe ce se bazează actul respirației și crezu că o parte din aer e consumată de către corp, în timp ce alta este eliminată ca netrebuitoare; nu știa că bioxidul de carbon este un produs de excrețiune al respirației. În sfârșit, *Boyle* se folosi de modul cum se comportă pigmentii vegetali în recunoașterea reacțiilor acide și alcaline.

Părintele biologiei de pe atunci este socotit, însă, *Marcello Malpighi*. El a descoperit și studiat singur un număr însemnat de fenomene biologice căutând să le explice din punct de vedere fizic și chimic stabilind adevărate principii de fiziologie. A făcut observații foarte exacte cu privire la fiziologia germinației și a rădăcinii. În fine, este interesant de remarcat că *Malpighi* a întrevăzut ca funcțiune a frunzelor, sinteza materiilor organice.

În această epocă, în Franța, era renumitul fizician *Edm. Mariotte*, care este demn de amintit nu numai pentru constatarea legii gazelor, numită mult timp numai după numele lui, ci și pentru unele probleme fiziologice. Printre lucrările sale se află un memoriu „*Sur le sujet des plantes*“, în care emite idei ingenioase despre biochimia plantelor. Așa de ex.: argumentează în mod cu totul original cum plantele sintetizează în corpul lor din puținele elemente, pe care le absorb din pământ, toate substanțele, neluându-le deagata din sol. El avea în privința absorbției substanțelor minerale din pământ o idee mai clară decât contemporanii săi.

Cu toate că la sfârșitul secolului al XVII-lea exista puțin material empiric, dar mult balast teoretic și prejudecăți în biochimia plantelor, totuși trebuie recunoscut că atunci spiritul științific era cu totul altul decât la începutul acestui veac. Se constată o pătrundere mai adâncă și o critică mai minuțioasă a fenomenelor biologice și biochimice.

* * *

La începutul secolului al XVIII-lea avură loc primele și micle progrese în domeniul materiilor minerale din plante. Acum s'a pus în evidență, în plante, prezența unor elemente ca: natriu, potasiu, fosfor, etc. În acest secol știința noastră progresează puțin pînă în epoca descoperirii oxigenului.

Deacum încolo începe o nouă epocă de înflorire și progres prin reușita analizelor de aer, prin descoperirea oxigenului și în special prin extraordinara descoperire a degajării acestui gaz de către plantele verzi, la lumină.

Bonnet, naturalist genovez, observase deja mai de mult că frunze de plante verzi introduse în apă și expuse la lumină se acopereau la suprafață cu bule de gaz, totuși faptul acesta rămase neînțeles și nu fu luat în considerație.

Ingen-Housz și *Priestley* au meritul de a fi arătat că în asemenea condiții, gazul care se degaja, este oxigenul.

Priestley, unul din cele mai originale capete dintre mulții și marii naturaliști ai patriei sale britanice, pleacă dela observația că aerul fix, rezultat din respirație și impropriu la respirat, devine respirabil prin intermediul plantelor verzi. Experiența fundamentală a lui *Priestley*, ca să dovedească aceasta, constă în a vicia aerul dintr'un clopot de sticlă, fie prin arderea unei lumânări, fie prin respirația unui șoarece pînă cînd lumînarea se stinge sau cînd șoarecele se asfixiază. Autorul pune apoi în atmosfera stricată a clopotului o tulpină de mentă, pe care o lăsa cîteva zile. După acest timp constata că atmosfera redevenia respirabilă, căci întreținea arderea lumînării sau respirația șoarecelui. Plantele verzi se comportă, deci invers decît animalele; pe cînd acestea emit aer fix, plantele îl descompun. În urma acestei descoperiri, *Str L. Pringle* îi oferi medalia de aur. El mai găsi că aerul de sub clopot, în care erau puse plante verzi, la lumină, era cu mult mai curat decît aerul exterior și că bulele de gaz, ce se ridică în apă din plantele verzi constau din oxigen. A mai stabilit, în fine, că producerea acestui oxigen încetează la înlăturarea luminii (întuneric).

Ingen-Huosz reuși să deosebească la plantele verzi două feluri de schimburi gazoase: unul, care se efectuează la lumină numit „*respirație diurnă*” și altul, care are loc la întuneric, constituind „*respirația nocturnă*”. Acestea sînt primele noțiuni obținute în fiziologia vegetală relativ la fenomenele de fotosinteză și respirație propriu zisă.

În timp ce *Priestley* ajungea la principii stabilite în mod empiric, în capul genialului *Lavoisier*, contemporan cu el, chimia se prezenta sub o formă nouă. *Lavoisier* era un spirit tot atît de inventiv ca și ordonat, și deaceia Chimia căpătă o formă clară și logică, încît confrății săi franceji, urmîndu-l cu entuziasm, nu mai vorbeau de Chimia lui *Lavoisier* ci, de o „*Chimie française*”. Aceasta nu o făceau cu intenținea de a micșora meritele savantului, ci sub impresiunea puternică, pe care o produceau nouile și irezistibilele sale idei asupra tuturor învățaților străini, considerau în orgoliul lor național atît ideile cît și știința chimiei de esență curat franceză.

Aici este locul să stabilim meritele lui *Lavoisier*, atît în fiziologia generală, cît și în fiziologia plantelor.

Prin descoperirea oxigenului și prin experiențe, care au rămas clasice, *Lavoisier*, ajunsese la concepția de astăzi asupra naturii chimice a acidului carbonic. Lui se datoresc experiențele referitoare la respirația animală și la schimbările, pe care le suferă aerul la trecerea lui prin plămîni. El a fost cel dintîi care a susținut că respirația este o ardere înceată, complet asemănătoare cu arderea cărbunelui. Căldura, rezultată din respirație, înlocuște pe aceia pierdută de corp. Studiile lui constituiesc baza de astăzi a teoriei respirației oxigenate.

Una din primele lucrări ale lui *Lavoisier*, în domeniul fiziologiei vegetale, se referă la pretinsa transformare a apei din pămînt. Prin cîntăriri precise și experiențe executate cu îndemînare și exactitudine, dărimă această concepție falsă din biochimie, stabilind adevărata sursă a elementelor constitutive din corpul plantei. Mai tîrziu, tot el făcu primele analize, arzînd materii organice ca să determine compoziția chimică a lor; astfel stabili, în compoziția chimică a zahărului trei elemente: *O*, *H* și *C*, cel din urmă existînd în cantitate mare, iar hidrogenul și oxigenul în raportul necesar ca să formeze apa. În studiile sale, asupra fermentației mustului de struguri, ajunse

la concluzia descompunerii lui în : bioxid de carbon și spirt de vin. Trebuie să afirmăm cu hotărîre că biochimia de azi nu s'ar fi creat, dacă *Lavoisier* nu i-ar fi pus bazele prin stabilirea compoziției chimice a materiei organice.

În lucrările lui *Lavoisier* nu s'a luat în considerație, la multe substanțe organice, decît cele trei elemente : C, H, O, despre azot nu se menționa nimic. Cunoștințele despre acest element important al organismului animal și vegetal, s'au căpătat foarte încet. *Berthollet* a pus, cel dintîi, în evidență conținutul în azot al materiilor animale ca o caracteristică a acestora față de cele vegetale. Cel care a stabilit, pentru prima oară, noțiunea de materie albuminoidă, a fost *Fourcroy*. Acesta demonstrează asemănarea glutenului cu substanțele de natură animală, el își dăde păreră că sucurile plantelor pot fi atît de viscoase ca și albumina, că se pot coagula prin căldură și că sînt capabile de putrefacție. O generalizare a substanțelor albuminoide la plante n'a fost recunoscută, de către învățați, decît mai tîrziu.

Aceasta era starea fiziologiei vegetale și a biochimiei, în primele timpuri, după moartea lui *Lavoisier*. Unul, dintre cei puțini, care a lucrat, la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, mai departe în spiritul lui *Lavoisier* și *Ingen-Housz*, ca chimist și biolog, a fost *Th. de Saussure*. Trebuie să-l considerăm, fără îndoială, ca cel mai mare biolog în domeniul fiziologiei vegetale, pe care l-a produs secolul al XVIII-lea. El arată cel dintîi, că respirația diurnă este indispensabilă nutriției vegetalelor, deci constituie un fenomen de nutriție, iar cea nocturnă este un fenomen de respirație propriu-zisă. El demonstrează că CO_2 este necesar vieții și creșterii plantelor. Din numeroasele lui experiențe rezultă următoarele concluziuni : plantele ca și animalele degajează, în mod constant, bioxid de carbon, atît la lumina solară, cît și la întunec ; plantele, ca și animalele, produc bioxidul de carbon cu ajutorul oxigenului atmosferic. Dacă nu observăm, la plante, producția lui în timpul zilei, aceasta se datorește faptului că CO_2 se descompune imediat după ce s'a format ; prezența CO_2 este necesară creșterii plantelor la soare ; lumina înlesnește această creștere atît cît participă la decompunerea acestui gaz. Toate aceste fapte arată cît de departe ajunsese *de Saussure* în concepțiile sale de fiziologie vegetală.

Opera principală a lui *Th. de Saussure* constă în cercetările sale chimice asupra vegetalelor. Această operă, prin abundența conținutului, prin importanța experiențelor și prin expunerea circumspectă a faptelor, a rămas neîntrecută pînă astăzi. În această operă se găsesc date analitice fundamentale relativ la problema satisfacerii nevoii de carbon a plantelor terestre din CO_2 din aer. Acesta est un merit absolut original al acestui învățat. *Din cauza importanței acestor lucrări și impulsului ce a dat dezvoltării acestei discipline, Th. de Saussure este considerat ca fondatorul „Fiziologiei vegetale“.*

* * *

Trecînd la secolul al XIX lea constatăm că, în prima sa jumătate, studiul nutriției plantelor stă complet în minile chimiștilor. Putem afirma că a fost o împrejurare fericită ca cei mai mari chimiști ai timpului, cum sînt : *Davy*, *Dumas*, *Berzelius* și *Liebig* să se ocupe de această problemă și să arăte un cald interes chimiei biologice. Mulțumită lucrărilor lui *Berzelius*, *Dumas* și *Liebig*, care introduseră metode noi în determinarea cantitativă a elementelor constitutive din materiile organice, s'a putut descoperi un număr mare de combinații ale carbonului în regnul vegetal, așa încît acest studiu domina chimia întreagă. Toate aceste substanțe erau considerate ca produse specifice ale organismelor vegetale și animale și nu trebuie deci să ne mirăm că în această epocă studiul materiilor minerale a trecut pe al doilea plan.

Deacum încolo fiziologia vegetală progresează și cucerește repede noi domenii de cercetare. Vedem pe *Boussingault* în Franța și pe *Just. Liebig* în Germania, aplicînd această disciplină la probleme de chimie agricolă. *Liebig* determină în mod exact

ca materii nutritive absorb plantele din sol și cum trebuie să se întreprindă un îngrășământ rațional. Din îndemnul și ideile lui metoda soluțiilor minerale artificiale — creată de *Sachs*, *Knop*, *Nobbe* și alții — în cultura plantelor luă un avânt covârșitor și pe dezvoltarea ei se bazează azi cunoștințele noastre de biochimie referitoare la rolul materiilor minerale din plante. Tot în prima jumătate a acestui secol se descoperiră „enzimele” (*Payen* și *Persoz*) care mai târziu, prin școala lui *Ostwald*, căpătară o bază curat chimică, aducând în zilele noastre concepții vaste și surprinzătoare în explicarea diferitelor procese chimice vitale, atât din organismul vegetal, cât și animal. Astăzi, acest capitol, prin tehnica perfecționată de *Hofmeister*, *Oppenheimer* și *Willstätter* a atins apogeul. Datorită acestor enzime se pot urmări, pe cale chimică, numeroase procese chimice din celulele diferitelor organe, demonstrând independența lor față de celelalte acțiuni vitale.

Tot în această jumătate a secolului al XIX-lea, biologia vegetală face o nouă descoperire, aceea a descoperirii „microbilor”. Prin experiențe exacte s’a cunoscut precis natura acestor microorganisme, nașterea și felul lor de viață, de înmulțire și dezvoltare. În fine, s’a determinat modul lor de acțiune în multe fenomene biologice ca fermentații, putrefacții, descompuneri, etc. Fiziologia microbilor își are timpul de înflorire în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin lucrările marelui *Pasteur*, care aduce, prin numeroasele sale experiențe, idei clare și precise în răspîndirea și modul lor de infecțiune. El descoperă principiile de hrănire a bacteriilor și stabili, în mod sigur, *faptul extraordinar de important al vieții lor fără oxigenul din atmosferă*, cunoscut sub numele de „anaerobioză”. Astăzi biochimia bacteriilor reprezintă unul din cele mai bine și mai exact studiate domenii de fiziologie vegetală. *Pasteur*, prin experiențele lui precise și rigurose executate asupra dezvoltării bacteriilor, a distrus ipoteza fantezistă a generației spontane, care a dominat atîta timp biologia. De cercetările școlii lui *Pasteur*, sînt legate cele mai importante descoperiri ale ultimului sfert de secol, pe terenul biochimiei, ca: formarea salpetrului, asimilația azotului liber de către leguminoase prin ajutorul bacteriilor nitrifiante din pămînt.

Mai amintim, în trecere, cum *Imunochimia* și *Serobiologia* au deschis, mai recent, un nou cîmp de cercetare, plin de promisiuni și în fiziologia vegetală. Incercările făcute pînă acum în această direcție au arătat că la baza asimilației diverselor sururi și la eliminarea complexului de toxine de către organismul vegetal, există aceleași legi ca la vertebratele superioare.

Cercetarea fenomenelor de *ereditate* și *variația speciei* aparține tot domeniul Fiziologiei generale, constituind capitolul important al *Fiziologiei speciei*, care în urma cercetărilor biologice și chimice este pe cale să se desprindă ca o știință aparte, numită „*Genetica*”, dar care rămîne tot ca o anexă, în special a Fiziologiei vegetale.

În sfîrșit, cunoașterea recentă a substanțelor activatoare de creștere și reglare a diverselor funcțiuni vitale din organisme vii, ca: *auxine* și *hormoni vegetali* constituie un capitol ce aparține aproape exclusiv Fiziologiei vegetale. Azi nu există funcție, fenomen sau proces vital, care să nu fie sub dependența unei asemenea substanțe, care în cantitate extrem de mică, determină acțiuni și efecte mari, excitînd, accelerînd, moderînd sau oprind complexul de reacțiuni și procese vitale dintr’un organ. Echilibrul și armonia funcțională dintr’un corp superior organizat sînt îndeplinite tot de aceste substanțe misterioase.

Fiziologia vegetală cu un domeniu de cercetare așa de vast și cu numeroase legături de colaborare cu alte științe, s’a încheiat ca știință experimentală dela 1860, cînd începe, pentru ea, o nouă perioadă de înflorire, prin lucrările lui *Julius Sachs* și apoi ale lui *W. Pfeffer*. Acesta din urmă, mai ales, a dat la iveală o mulțime de rezultate precise, care constituiesc, pînă astăzi, bazele experimentale moderne ale acestei ramuri de știință.

* * *

Am făcut expunerea istorică de mai sus, ca să se vadă în mod precis cum s'a născut și cum a evoluat această știință nouă pînă la completa ei emancipare și separare de științele care au tutelat-o. Rezultă din cele expuse că Fiziologia vegetală a evoluat paralel și treptat cu dezvoltarea și progresul chimiei și fizicii, extinzîndu-și domeniul de cercetare de la viața restrînsă a plantelor la o mulțime de alte specialități de o importanță extraordinară atît pe teren teoretic cît și practic. Astăzi, Fiziologia vegetală scăpată de orice tutelă a devenit independentă și constituie o disciplină specială, care cercetează cele mai variate și captivante probleme de biologie generală.

Din examinarea istoricului, făcut mai sus, se vede în mod absolut netăgăduit că botaniștii, în special cei vechi, sunt aceia, care au contribuit cel mai puțin la dezvoltarea și progresul Fiziologiei vegetale. Faptul că ea a avut și are ca obiect studiul vieții plantelor nu înseamnă că trebuie să fie subordonată botanicei, care, în general, se ocupă cu descrierea și clasificarea formelor vegetale. Dimpotrivă, astăzi și botanica modernă este toată dependentă și subordonată fenomenelor și problemelor de Fiziologie vegetală.

Cu toate acestea s'a pretins și se pretinde, din nenorocire la noi, de către unii, fie din ignoranță, fie din rea credință sau din amîndouă laolaltă, că Fiziologia vegetală e o anexă subsidiară a botanicei, aceasta din urmă fiind știință fundamentală. Nu se poate închipui o greșală și o rătăcire mai mare ca aceasta!

Cum că botanica în vechea accepțiune a cuvîntului nu mai poate fi considerată ca o știință fundamentală, rezultă din faptul că azi sunt rari botaniștii, care să se mai ocupe cu descrierea și clasificarea plantelor. Catalogarea și sistematizarea vegetalelor, stabilite de marele naturalist *Linné* acum 170 de ani, completată și desăvîrșită pînă la începutul secolului al XX-lea, au devenit în momentul de față un studiu absolut static, de muzeu sau de ierbar. Fenomenele de adaptare, de oecologie, taxonomie, fitosociologie, etc., pe care le revendică unii botaniști, nu sunt, în esență decît procese de ordin fiziologic. A le interpreta fără cunoștințe de Fiziologie vegetală înseamnă a le deforma și denatura, cum dealtfel se și întîmplă cu unii, așa ziși fitosociologi sau botaniști generali.

În deformarea faptelor s'a mers așa de departe, încît în străinătate cît și la noi, *dar mai ales la noi*, pare a se forma o mentalitate curioasă, printre unii ziși botaniști, de a se crea o disciplină de *Botanică generală* și o categorie de preinși *botaniști generali*. Nici un om serios și cu autoritate în știință nu admite această tendință ciudată și pe nimic întemeiată de a crea discipline și specialiști ieșiți din imaginații primejdioase dezvoltării și progresului real al științei. Referitor la pretinsa existență a unei „*Botanice generale*“, care pe lîngă Morfologie, Organografie și Anatomie ar mai cuprinde și Fiziologia vegetală, citez în traducere, un pasagiu dintr'un articol al cunoscutului fiziologist și botanist englez Prof. *W. Stiles* dela Universitatea din Cambridge.

„Ruzim vorbindu-se uneori despre un „*mysterious gentleman called the general botanist*“, care ar fi specialist în botanica generală și care ar fi diferit de un morfologist, un fiziologist, micologist sau un alt cercetător într'un domeniu definit. Asemenea persoană, care ar fi specialistă în botanică generală, nu există, pentrucă în adevăr nu există subiecte de botanică generală. Dacă prin botanist general se înțelege specialistul într'o ramură a botanicei, care apreciază și se interesează și de progresele făcute de specialiștii din celelalte ramuri ale botanicei, atunci noi toți sîntem botaniști generali, dar acest lucru îl face fiecare botanist“.

„Dacă, însă, *botanica generală* este ceva deosebit de botanică, atunci aceasta e un *mith*, adică ceva ce există numai în imaginația unora“.

Credem, că în lămurirea chestiunii de mai sus, cele citate sunt de ajuns, ca să mai fie nevoie să adăugăm și noi ceva.

Iar în altă parte, referitor la progresul diferitelor ramuri de botanică, *Stiles* scrie: „În timpul din urmă, cunoștințele noastre din diversele ramuri ale botanicii s-au înmulțit enorm de mult, această înmulțire este cu deosebire notabilă în fiziologia vegetală, mycologie, genetică, cytologie. Din această cauză este imposibil unui cercetător să-și întindă activitatea sa peste un cîmp prea larg din domeniul botanicii”.

Prin urmare, profesorul dela Cambridge recunoaște imposibilitatea unui cercetător, oricît de iscusit și de stăruitor ar fi el, de a putea îmbrățișa cu competență toate domeniile botanicii, iar pe de altă parte de a îngloba într'o disciplină numită „botanică generală” pe un sistematician, morfologist, cytologist și fiziologist.

Biologia vegetală, numire adecuată astăzi botanicii de odinioară și care se aplică pretutindeni în străinătate acestei discipline, a făcut progrese de așa natură încît, după cum am spus mai sus, Fiziologia vegetală s'a constituit disciplină separată și independentă. Aceasta din urmă se ocupă, în general, cu studiul fenomenelor exterioare ale vieții plantelor și cu explicarea proceselor vitale ale lor. O parte din Fiziologia vegetală caută să explice transformările de energie și întreaga arhitectonică vitală cu ajutorul legilor fizice, pe cînd o altă parte, luînd mai puțin în considerație structura corpului vegetal, studiază schimburile de materie și energie din corpul plantelor ținînd socoteală de proprietățile organismului ca de acelea ale unui aparat complicat. Această parte de Fiziologie caută să stabilească anumite raporturi între fenomenele vitale și legile generale din chimie, mergînd chiar pînă a le exprima prin anumite ecuații chimice.

Cu toate că multe din fenomenele vitale cunoscute, urmează și se supun legilor fizico-chimice, totuși există o mulțime de procese vitale, care nu se pot încadra în aceste legi, rămînînd, încă, o enigmă, pe care, însă, știința noastră în plin progres de dezvoltare le va lămuri desigur într'un viitor apropiat.

Importanța extraordinară a fiziologiei vegetale nu e numai de ordin curat teoretic, ea este tot atît de mare și pe teren practic. Agricultură, medicină, farmacia și anumite întreprinderi tehnice sunt tributarele Fiziologiei vegetale. Din această cauză o armată întreagă de chimiști agricoli, farmaciști, ingineri chimiști, etc., colaborează pe terenul fiziologiei vegetale, în special al chimiei vegetale, căutînd să conformeze și să adapteze cît mai mult necesitățile practice ale specialității lor la principiile științifice și regulile stabilite de fiziologia vegetală.

Fiziologia vegetală actuală, nu mai poate fi privită deci ca o anexă nici a botanicii, nici a chimiei sau fizicii, ci ea este o știință independentă cu un vast domeniu de cercetare în toate specialitățile ce aparțin biologiei generale și cu un viitor a cărui măreție se poate întrevădea cu siguranță, fiind dat dinamismul obiectului ei—acea manifestare de energie veșnic în mișcare și prefacere—, care este viața.

* * *

Fiziologia vegetală, în urma extinderii și importanței căpătate a devenit știință principală de studiu cucerind un loc de frunte printre disciplinele deja existente. De aceea, ea se predă astăzi în toate Universitățile din lume ca o ramură de știință aparte avînd ca obiect un domeniu de cercetare vast, foarte variat și bine definit.

Fiind dată însemnătatea extraordinară pe care o are Fiziologia vegetală atît din punct de vedere teoretic cît și practic, ea a fost menținută în legea de raționalizare a învățămîntului superior din 2 Noiembrie 1938 ca disciplină fundamentală la toate Universitățile noastre din țară.

La noi, în România, Fiziologia vegetală a căpătat o dezvoltare și a atins un progres de așa natură, încît stă în fruntea multora din semenele ei din străinătate.

S'a constituit ca disciplină de studiu pentru prima oară încă dela 1907, la Universitatea din București, încredințându-se această catedră eminentului și singurului profesor în specialitate *E. C. Teodorescu*. Prin frumusețea cursurilor sale savante, predate cu precizie, metodă și logică de fer, precum și prin priceperea, puterea lui de muncă și pasiune neîntreruptă închinată acestei științe, profesorul *E. C. Teodorescu* a știut să atragă o seamă de tineri în jurul lui formînd o școală romînească de Fiziologie vegetală. Prin perseverența și îndemnul lui la lucru, el însuși servind de pildă admirabilă, a reușit să imprime școlii romînești de Fiziologie vegetală o autoritate și un prestigiu demne de invidiat. Renumele școlii sale a depășit de mult hotarele țării noastre.

Această disciplină a intrat solid în patrimoniul științei romînești contribuind pînă în prezent, în mod neîntrerupt la mărirea și îmbogățirea lui. Ea constituie o fală pentru țara noastră, căci școala profesorului *E. C. Teodorescu*, care este creatorul și părintele Fiziologiei vegetale romînești, și-a găsit imitatori și la diferite Facultăți, altele decît cele de științe, din țara noastră.

În împrejurările grele, atît materiale cit și morale, prin care trece țara noastră astăzi, este o datorie sfîntă din partea elevilor profesorului Teodorescu să continue tradiția școlii create de el căutînd cu orice sscrificii să menție cel puțin ce s'a dobîndit, dacă putința nu le permite să adauge ceva nou la ceia ce s'a creat.

AUTORII CONSULTAȚII:

CZAPEK FRIED. — Biochemie der Pflanzen, Iena 1913.

KOSTYTSCHEW, S. — Lehrbuch der Pflanzenphysiologie Iena, 1926.

STILES, W. — The general Physiology of the plant cell and its importance in pure and applied Botany.

Considerațiuni asupra vegetației halofite a văiei pîrîului Elan

de

CONSTANTIN PAPP

Profesor la Universitatea din Iași

Pîrîul Elan ¹⁾, afluent pe malul stîng al Prutului, ocupînd în partea răsăriteană-sudică a Moldovei, o direcțiune S. S E, aprox. 45°, 38' lat. și 45°, 42' lat., are valea săpată în un complex meotic argilo nisipos. Fundul văiei — albia majoră — destul de largă, în unele puncte atinge chiar 500 metri în lățime, formată din aluviuni fini, argilo nisipoși, în care amestecul de argilă are un procent însemnat, deoarece în unele locuri apa stagnează, formează băltoage, astfel se văd unele iezături, iazuri sau fîntîni dar puțin adînci. Compoziția acestor lungi este totuși destul de poroasă, în aluviuni predomină nisipul fin, deoarece locurile uscate ocupă suprafețe mult mai întinse ca cele umede, apa strecurîndu se prin acești aluviuni. În special, pătura de argilă conține săruri care duse de apele puhoaelor, se revarsă pe terenul din jurul lor, ajutînd astfel la disolvarea sărăturilor depe suprafețe mari; cînd bălțile se usuacă, rămîn sub formă de eflorescențe saline. Aceste sărături se formează și prin evaporarea apei ridicată prin capilaritate, în urma cărui proces, sărăturile rămîn la suprafață. Dintre sărăturile solubile, sînt mai ales cele de sodiu și anume sub formă de cloruri, sulfați și carbonați. Procesul de formare al sărurilor este mai slab în partea


1) Cu toate că pîrîul are o lungime de peste 70 km., debitul redus și neregulat, ne face să-l considerăm pîrîu tipic de stepă.

superioară și mijlocie a luncăi, unde covorul vegetativ cu toate că este jos, este însă complet¹⁾; la vale însă formarea sărăturilor este foarte activă, căci ele acopăr valea sub formă de pete albe ocupînd suprafețe destul de apreciable²⁾. „Datorită abundenței carbonaților alcalini din soluții, prin evaporare, solul argilos devine compact, lutos. Soluțiile alcaline disolvă humusul în mare parte, de aceea pe aceste terenuri sărate, covorul vegetativ este incomplet sau lipsește cu totul“, (5).

În această notă sînt expuse rezultatele noastre obținute prin cercetarea văiei, pe o distanță aprox. de 30 km.³⁾, dela localitatea Poșta Elanului și pînă la vreo 5 km. mai la sud de tîrgușorul Murgeni; pe porțiunea cercetată, precipitațiile anuale sînt în mediu cam 4—500 mm. iar temperatura medie în lunile de vară, în partea superioară a văiei este $+20^{\circ}$ — 22° C, mai cald în partea inferioară ($+22^{\circ}$ — 23°). Albia pe această porțiune cercetată, are o înclinare foarte slabă—căci la Poșta Elanului, altitudinea e cam 69 metri, mergînd aproape plană pînă la Popeni (67 m.), coborîndu-se la sud de Murgeni, unde ajunge pînă la 24 metri alt.⁴⁾

Această vale face parte din sărăturile uscate, ce sînt depresiuni plane din stepă, acoperite cu vegetație numai primăvara și toamna iar în timpul verei, vegetația e aproape uscată. Începînd dela punctul cel mai nordic cercetat al văiei (Poșta Elan), vegetația se prezintă sub forma unui covor des și jos, dar compact, alcătuit din suprafețe întinse de culoare roșcată, formate din asociații aproape pure ale mușchiului *Syntrichia ruralis calcicola*, care aici se prezintă chircit iar tulpinile abea trec de 1 cm. înălțime; culoarea roșcată e datorită poate solului calcar. Frunzele se termină prin peri lungi hialini, ce se pot considera ca o adaptare contra luminei prea intensă din stepă, împrăștiind razele soarelui, care prin intensitatea lor mare, ar distruge clorofila (4). Aceste suprafețe roșcate de mușchi, sînt mărginite de pete alburii formate din *Artemisia austriaca*, — pelința comună a stepelor noastre. Ici și colo se văd exemplare izolate de *Nonnea pulla*, cu tulpinile păroase și florile roș închise precum și *Chorispora tenella*, ridichioara caracteristică stepelor noastre răsăritene. Pe lăturile văiei — în partea de jos a cîmpurilor ce o mărginesc — și care se ridică la înălțimi variînd între 170—270 metri (de ex.: Dealul Copăcenii), ca și o parte din povîrnișuri, *Euphorbia glareosa*, ocupă o suprafață mare, persistînd neatinsă de turmele de oi, pînă toamna tîrziu, astfel că e ușor vizibilă prin culoarea ei portocalie.

Pe lăturile drumului ce urmează tot lungul văiei, se întîlnesc o sumă de plante ruderaie, din cele mai comune, abundente, între care se întîlnesc mai rare ori: *Centaurea orientalis*, *Euphorbia Esula*, *Linaria genistifolia*, *Marrubium peregrinum*, *M. vulgare*, *Phlomis pungens*, ș. a. În locurile bătătorite, pe loess, se găsește între altele și *Taraxacum serotinum*, caracterizat prin frunzele bazale în rozetă, plane, late și lucioase, apoi *Podospermum taci-niatum*, cu florile galben aurii, ce persistă chiar pe



Harta schematică a regiunii cercetate
Carte schématique de la région explorée

1) Cam pînă la Găgești.

2) Pînă la sud de Murgeni.


3) În tovarășia d-lor M. Răvărui și C. Burduja, asistenți ai Laboratorului de Botanică al Facultății de Științe din Iași și a d-lui I. Gugioman, Profesor sec. din Galați, cărora le exprim pe această cale toate mulțumirile noastre.

4) La vărsare în Prut, altitudinea este de 17 metri.

căldurile cît de mari (vara temp. trece de $+40^{\circ}$ C.). Ici și colo mai persistă exemplare izolate de *Nonnea pulla* sau *Kentrophyllum lanatum*, cu frunzele sale spinose; deasemenea și *Ranunculus pedatus* — piciorul cucoșului — cu frunzele bazale divizate, caracteristice; această specie se găsește și în solurile mai nisipoase.

În apropierea locului numit „la Ripi”, din fața dealului Tupilați, valea are între coline o lățime de peste 500 metri, acoperită cu un covor aproape compact, format din graminee joase, mai ales din *Poa dura*; celelalte specii ce se întîlnesc sînt în cantitate mică, astfel: *Arthemisia-austriaca*, *Euphorbia glareosa*, *Hordeum murinum*, *Medicago minima* și chiar muschiul *Syntrichia ruralis calcicola*, e sub formă de pete roșii, datorită cantității prea mici de umezeală ce produce această șuviță de apă, față de lățimea terenului destul de întinsă. Coastele dealurilor ce mărginesc valea, au aspectul unui covor galben cu pete cenușii (la sfîrșitul lunei Mai), pete formate din speciile sus amintite de *Euphorbia* și *Arthemisia*; sus pe coaste (50—100 metri), sînt asociații de *Kochia hirsuta*; cîteva exemplare de *Myosotis caespitosa* completează covorul vegetativ. Covorul mai sus amintit de graminee, se continuă și în fața satului Tupilați, unde abundă împreună cu Cyperaceele sterile; dintre Fanerogame, mai ales *Polygonum aviculare* — troscotul — mai rar și mai ales pe sub maluri se găsește un fel de coada șoricelului *Achillea Nieblichii*, apoi se mai deosebește și o oarecare vegetație de mușchi, formate din pîlcuri roșcate de *Syntrichia*, iar în locurile unde covorul vegetativ e mai încheiat, pe pămînt se găsesc păjiștoare formate din tulpinele ramificate ale mușchiului *Brachythecium albicans decolorata*, culoare deschisă obținută prin xerofitismul foarte accentuat al mediului (4, 14).

În unele puncte, valea este foarte îngustă, permițînd chiar a se face lucrări de rectificare a cursului apei — așa cum sînt acelea dela N. de Popeni — unde lă-



1. Sărăturile din valea pîrului Elan (Popeni). — Les salants de la vallée du ruisseau Elan (Popeni).
2. Asociație de *Lepidium crassifolium*, la sud de Giurcani. În primul plan: *Suaedetum*. — Association de *L. c.* au sud de Giurcani. Au premier plan: *Suaedetum*.

țimea văii abea trece de 1 metru. Malul stîng e acoperit cu păjiști, alcătuite din o vegetație destul de abundentă și de o talie mai înaltă. Se deosebesc astfel: *Berteroa incanna*, *Bunias orientalis*, *Capsella bursa pastoris*, *Cirsium (furiens?)*, *Glaucium phoeniceum*, *Lamium amplexicaule*, *L. purpureum*, *Lathyrus tuberosus*, *Lepidium campestre*, *Lychnis dioica*, *Medicago minima*, *Nasturtium austriacum*, *Potentilla reptans*, *Ranunculus acris*, *Sinapis arvensis*, *Sonchus oleraceus*, *Tanacetum vulgare*, *Vicia villosa*, pecînd pe malul drept, vegetația este mult mai redusă, cu caracter mai pronunțat xerofitic. Condițiunile locale de umezeala sînt mult mai grele pe acest mal, căci argila e mai compactă, pe cită vreme pe malul stîng este mai afînată.

Urmînd cursul apei, vegetația este aproape uniformă, pentru a ajunge să fie redusă la sărături tipice, cu eflorescențe saline (nord de Găgești), albe, alcătuite din *Suaedeturi* pure (*Suaeda maritima*). Flora acestor pîlcuri sărete, este alcătuită din o

numă de plante xerofite ce se comportă perfect în terenurile sarate, astfel: *Achillea senecioidea*, *Arthemisia salina*, *Chorispora tenella*, *Kochia hirsuta*, *Myosotis caespitosa*, *Salicornia herbacea*, *Suaeda maritima*, *Syntrichia ruralis calcicola*, precum și multe specii de *Lepidium* (*L. campestre*, *L. Draba*, *L. perfoliatum*, *L. ruderales*), apoi *Matricaria Chamomilla*, care e poate elementul cel mai tipic dintre cele comune ale stepelor și sărăturilor noastre. Se găsesc și specii exclusiv halofite: *Aster villosus*, *Camphorosma ovata*, *Lepidium latifolium*, *Plantago sibirica*, *Ranunculus pedatus*, *Statice Gmelini*, *Suaeda maritima* iar pe malurile șuvoaelor sarate: *Beckmania eructiformis*, graminea ușor de recunoscut prin spicușoarele sale alipite de axa inflorescenței, asemănătoare cu niște omizi.

Vegetația acestor sărături, ia cu totul alt aspect pe malul drept, mai la Sud de satul Giurcani, unde apar tufe frumoase și dezvoltate de *Lepidium crassifolium*. Este o specie ce se aseamănă cu *L. latifolium*, ambele halofite; ea are frunzele groase, piezoase, frunzele radicale întregi, eliptice, cu flori albe și cu siliculele glabre, pe cînd *L. latifolium* are frunzele mai subțiri, succulente, crenat serate iar frunzele radicale ovale, florile alb verzui, mai mici și siliculele pubescente. Timpul de înflorire pentru *L. crassifolium* în această vale, este sfîrșitul lunii Mai. Această specie este citată de către Guebhard (3) din localitatea Piscu (Kisku), alt. cc. 60 m., așezată pe un pînt de deal, la confluența pîraei Suhaiul cu Gerul, afluent de pe malul stîng al Siretului; această localitate este prin urmare chiar în Sudul Moldovei. Cziha și Szabo (2, 274), pomenesc această specie rară din Moldova, fără a indica localitatea. Cu ocazia unei excursiuni ce am făcut o anul trecut, în luna Mai, împreună cu asistenții noștri, am recoltat-o dela Giurcani, — și am distribuit-o prin Fl. Rom. exicc.

Lepidium crassifolium, se prezintă în asociații expuse la soare — limitînd locuri ceva mai umede, căci nu departe de asociațiile ce le formează, se găsesc unele finitii, de altfel puțin adînci. La periferia acestor asociații, umiditatea este suficientă pentru a se putea forma finețe compacte, alcătuite în mare parte din diferite feluri de mazărișchi (*Lathyrus tuberosus*, *Trigonella purpurea caerulea*, *Viola villosa*) și un mare număr de plante ruderales de talie mai înaltă. *Lepidium crassifolium* este aici totdeauna în vecinătate cu *Suaeda maritima*, formînd de regulă, fiecare în parte, asociații pure; acolo unde umiditatea este mai mică, se localizează numai asociația de *Suaeda*. Cîteodată mai intervine și *Atropis limosa*, graminea cu inflorescența delicată. În cazuri mai rare, asociațiile sînt formate din elemente mai numeroase; dintre acestea unele, precum: *Arthemisia salina* sau *Suaeda maritima*, împestrițate cu exemplare izolate de *Chenopodium*, *Kochia hirsuta*, *Aster villosus*, sau mai rar *Plantago sibirica*, cea mai însemnată specie halofită de *Plantago* cu frunze late. La periferia asociațiilor se găsește: *Arthemisia austriaca*, *Camphorosma ovata*, *Lepidium crassifolium*, *Statice Gmelini*. De obicei *Lepidium crassifolium* se găsește împreună cu *Statice Gmelini*, dezvoltîndu-se bine în locurile libere, fără altă vegetație mai înaltă prin împrejurimea lor, care le-ar putea înăduși. Vegetația briofită este reprezentată prin indivizi rari, căci caracteristicile pete de *Syntrichia* ce le am urmărit tot lungul văii, aici încep să devie tot mai rare, mai ales la Sud de Giurcani.

Pe malul lutos, rupt, chiar din vecinătatea drumului de pe malul drept din lungul văii, se găsesc pete mici de mușchi, formate din: *Brachythecium albicans julaceae* și *Barbula unguiculata cuspidata*. La forma de *Brachythecium*, se observă o adaptare a plantei contra uscăciunii, formată prin imbricarea frunzelor pe ramuri, așa că aceste ramuri par a fi niște „mișșori” (4, 59). Solul sărat nu este prielnic dezvoltării mușchilor, deaceia acest grup de plante este foarte puțin reprezentat. Ei se găsesc mai ales la marginea sărăturilor sau sus pe marginea malurilor, unde salinitatea este mai redusă, datorită spălării relative, a salinității prin ploi violente.

În locurile umede ale văii, pe malurile ei sau coborîndu-se pînă la linia

apei, se găsesc un mic număr de plante hygrofite, reprezentate prin: *Atropis limosa*, *Beckmania erucaiformis*, *Carex muricata*, *C. hirta*, *C. nutans*, *Juncus bufonius*, *J. Gerardi*, *Oenanthe Phaellandrium* și *Ranunculus repens* care împreună cu *Tussilago Farfara* este mai mult pe malurile umede. Elemente mai rare sînt *Orchys elegans* — în dreptul satului Tupilați și *Iris Gueldenstaetiana*, mai la Sud de Murgeni.

Pe toată porțiune cercetată, vegetația lemnoasă este aproape inexistentă; rar, citeva tufe de *Rosa canina*; în unele locuri, chiar la mal, se găsesc specii de *Salix*, izolate, sau dezvoltate, pe scoarța unora sînt tufe de *Orthotrichum pumilum*, mușchi corticoli. Pe lîngă așezămintele omenestii — sate — sau pentru marcarea hotarelor loturilor, sînt plantații de salcîm (*Robina Pseudo Acaccia*), dar datorită condițiunilor grele de trai, sînt slab dezvoltăți, subțiri și ades au tulpini strimbe.

* * *

Din cele expuse pînă aici, se poate constata că flora halofită a văiei Elanului cel puțin pe lungimea celor 30 Km. cercetați (față de vro 70 km. lungimea totală a văiei), e formată din un mic număr de indivizi, acomodați unui mediu foarte arid. Cu cît căldurile din timpul verei sînt mai mari, cu atît numărul speciilor ce pot rezista, se impuținează, ajungînd în cele din urmă a forma numai pîlcuri—adică un covor vegetativ incomplet. Deși flora este relativ săracă, totuși se găsesc reprezentate aproape toate genurile halofite din flora țării (5).

Datorită situației geografice și condițiunilor mediului, în flora acestei văi predomină caracterul sudestic, dar sînt reprezentate și elementele răsăritene. Se recunoaște o slabă influență a elementelor pontice și mediteranee. Astfel, în ordinea însemnătății, în afară de elementele central europene destul de comune ¹⁾, se găsesc următoarele elemente geografice:

Elemente sudestice: *Asperula humifusa*, *Camphorosma ovata*, *Centaurea orientalis*, *Ceratocarpus arenarius*, *Iris Gueldenstaetiana*, *Kentrophyllum lanatum*, *Lepidium crassifolium*, *Orchys elegans*, *Plantago sibirica*, *Rochellia stellulata*, *Statice Gmelini*, *Trigonella purpureum caeruleum*.

Elemente răsăritene: *Achillea Niebreichii*, *Chorispora tenella*, *Taraxacum serotinum*.

Elemente pontice: *Nonnea pulla*.

Elemente mediteranee: *Barkhausia setosa*.

Caracterul predominant al florei este al stepelor sudestice ce se găsesc în districtul floristic al Buceagului, care e o stepă tipică prin abundența asociațiilor halofite și lipsindu-i aproape complet lemnoasele (1); cercetată mai în amănunt, flora acestei văi, formează o trecere pe nesimțite între teritoriile apusene ale stepei Buceagului și ale stepei și antestepei din răsăritul subdistrictului floristic păduros al Bărăganului.

LITERATURA CONSULTATĂ.

1. BORZA AL. — Die Vegetation u. Flora Rumäniens, in Guide de la VI-me Exc. Phytog. en Roumanie, (1931) Cluj.
2. CZIHAK I. u. SZABO I. — Heil u. Nahrungsmittel. Farbstoffe welche die Ost-Romanen-Moldauer u. Walachen—ausdem Pflanzenreich gewinnen. Flora (1862).
3. GUEBHARD CH. — Enum. pl. quas per anno 1842 ad 1848 in Moldavia collegit et observ. (Manuscris în Bibl. Alphonse de Candolle, Geneva, după citatul din: Dr. D. Brândză, Prodromul Fl. Române, București, 1879—83, pag. 142).
4. HERZOG T. — Geographie der Moose, Iena, 1926.
5. PRODAN I. — Oecologia plantelor halofite din România, în Bul. Grăd. și Mus. Bot. Cluj, II (1922), 1—17; 37—52; 69—84; 101—114.

Iași, Februarie 1939.

1) Elementele central europene sînt de 8 ori mai numeroase ca toate celelalte elemente împreună.

Migrațiile peștilor euryhalini

(Anadromi și Catadromi)

de

EUGEN A. PORA

Doctor în științe naturale. Asistent universitar.

I. **Introducere.** Problema migrațiilor peștilor, reptilelor, mamiferelor, dar mai ales a păsărilor, a atras încă din vechime atenția naturaliştilor. Legătura acestor deplasări de mare suprafață cu fenomenele climatice, și indirect cu cele dependente de cauzele meteorologice, s'a văzut din vremuri vechi și migrațiile s'au definit încă de atunci ca sezonare.

Dar apariția și dispariția periodică a animalelor migratorii în anumite locuri, a atras nu numai atenția specialiștilor, ci și a diletanților și amatorilor în științe naturale. Grație acestora din urmă o mulțime de fapte nelămurite din fenomenul misterios al migrațiilor, au putut fi explicate. Și între acești observatori anonimi trebuiesc în primul rând amintiți pescarii tuturor țărmurilor de mare sau de riuri, toți iubitorii de natură — oameni cu știință de carte, dar de altă meserie, — regii sprijinitori ai culturii și spiritele luminate ale evului mediu, care s'au interesat cu toții de problema migrațiilor, mai ales când aceasta avea o oarecare însemnătate economică.

Ne vom ocupa în prezentul studiu numai cu *migrațiile peștilor*, lăsând la o parte migrațiile nu mai puțin interesante ale reptilelor, mamiferelor, păsărilor sau ale unor Nevertebrate.

În apropierea unui țărm se găsesc unii pești al căror pescuit se face în tot decursul anului — sînt peștii permanenți la țărm, — și alți pești al căror pescuit se face numai în anumite epoce de mare afluență în apropierea țărmului — sînt peștii sezonari.

Apariția și dispariția regulată a acestor *pești sezonari* în zona litorală, a interesat în primul rând populația de pescari. Din cauza aceasta chiar, pescarii au fost cei dintîi observatori ai migrațiilor de pești, cît și a cauzelor imediate care le determină. Experiența cîștigată în decursul veacurilor, s'a transmis prin tradiție generațiilor următoare, iar studiul științific al migrațiilor de pești a început cu datele asimilate de populațiile riverane.

Să nu credem însă că numai peștii sezonari execută migrații. Am putea spune că toți peștii, în anumite epoce din dezvoltarea lor — mai ales în timpul maturității genitale, — sînt supuși deplasărilor. Peștii de baltă se refugiază în zonele în care apa e mai caldă, vegetația mai bogată, pentruca în desișul ierburilor de apă să-și lepede icrele. Peștii din riurile tulburi și mari se îndreaptă spre afluenții mai curați, cu ape mai limpezi. Peștii sedentari ai țărmurilor marine caută plajele nisipoase, savanele de alge etc., pentruca acolo să-și depună ouăle. Toate aceste deplasări sînt un fel de migrații în mic, asupra cărora nu vom insista în studiul de față, și ele nu diferă de migrațiile peștilor stenohalini marini sau dulcicoli, decît prin întindere și suprafață.

Și dacă deplasările mici ale peștilor sedentari au rămas aproape neobservate, față de marile deplasări ale peștilor sezonari, se datorește faptului că acestea din

urmă atrăgeau atenția prin intervalul anual regulat la care apăreau și dispăreau din apropierea țărmului, cât și prin cantitatea enormă de animale pe care le aduceau sau le făceau să dispară deodată dintr'un loc.

Încă din vechime, de prezența peștilor sezonari, de bancurile în care aceștia apăreau în apropierea coastelor, era legat un pescuit intens, care asigura viața familiilor de pescari pînă la sezonul următor. Astăzi de prezența acestor bancuri este dependentă și o mare industrie de conserve, care deservește necesitățile populației de uscat depe aproape tot globul terestru. Factorul care a determinat crearea industriilor de conserve a fost surplusul producției (pescuitului) față de consumul imediat (41), cit și progresul tehnicii de preparare, sterilizare, împachetare etc., care în ultimele decenii a luat un avînt remarcabil. Astăzi heringele, sardelele, scrumbiile, lacherda, somonul, țiparul, morunul, nisterul, ca și o mulțime de Nevertebrate marine ca homarul, sepia, crevetele etc., fac obiectul acestui fel de pescuit sezonar intens și puternic, furnizor aproape unic al industriei de conserve.

Iată de ce studiul migrațiunilor peștilor este nu numai interesant prin latura lui misterioasă și atrăgătoare spiritului scrutator, dar este important și pentru anumite probleme economice generale de imediată utilitate și mai este foarte însemnat și pentru anumite chestiuni de biologie experimentală și fiziologie aplicată.

Dintre mulțimea condițiilor de mediu care influențează viața acvatică, *salinitatea* joacă un rol capital în comportarea și răspîndirea animalelor. Ea se exprimă prin cantitatea de săruri minerale ce se găsesc la 1 litru soluție și variază foarte mult în natură. Unele lacuri sărate pot avea pînă la 360 gr. săruri la litru, fără ca viața bacteriană să lipsească. În lacul Bulac din Rusia, cu o salinitate de 285,3 gr.‰, pot trăi larve de muște, de Crustacei, Rotifere, Flagelate etc. (16). În toate apele — pînă la salinitatea oceanelor, — viața deasemenea nu lipsește. Marea Roșie are o salinitate pînă la 45‰; oceanele și mările largi au în medie 35 gr. săruri la litru; Marea Neagră numai vreo 18 gr.‰ (în medie); partea de nord a Balticeii abia 3—5 gr.‰ ca și unele limanuri îndulcite depe țărmul mării noastre. În apele dulci ale rîurilor, sărurile dizolvate sînt foarte puține (0.03 gr.‰); ape distilate, complet lipsite de elemente minerale, nu se găsesc în natură.

Unii pești pot trăi în oricare din mediile saline de mai sus (apă dulce — apă de mare), alții sînt legați de o salinitate determinată. Cei din urmă se spune că sînt *euryhalini*¹⁾, cei din urmă se zic *stenohalini*²⁾.

În general se crede că peștii marini nu pot trăi în ape dulci, precum nici peștii dulcicoli nu pot trăi în apă de mare. Această credință este însă în mare parte eronată. Biologia actuală cunoaște o mulțime de forme marine care pot trăi în apele dulci sau îndulcite, precum și pești dulcicoli care se pot găsi în estuare sau chiar în mare.

Stenohalinele, adică animalele legate de o salinitate fixă a mediului lor extern, nu se pot adapta variațiilor saline externe, nu pot cuceri medii noi, astfel că în studiu dinamic al migrațiilor în legătură cu nașterea spițelor noi, nu ne pot interesa prea mult. Totuși dată fiind importanța lor economică, vom aminti pe scurt migrațiile lor și cauzele care le produc.

Animalele stenohaline fiind legate de o salinitate determinată, trebuie să caute această condiție de mediu, atunci cînd factorii externi produc variația ei. Din această cauză stenohalinele execută deplasări, fie pe verticală, fie pe orizontală, fie pe ambele aceste direcțiuni combinate, în căutarea păturii de apă cu salinitatea de care au nevoie și care a variat. Ploile, curenții, evaporarea etc. sînt factorii care provoacă variații de salinitate, încît indirect ei sînt cauza migrațiilor peștilor stenohalini.

1) eury = larg; halinos = sărat (variații largi de salinitate).

2) stenos = strîmt (variații strîmte de salinitate).

Studiul migrațiilor peștilor stenohalini, cu o foarte mare însemnătate economică, este încă la început. Deplasările bancurilor de sardele sau scrumbii din Atlanticul de nord, sînt capricioase și încă nu pot fi prevăzute întotdeauna cu precizie, pentru că și cauzele meteorologice care produc variațiile de salinitate sînt capricioase. Totuși se pot aplica anumite reguli generale — rezultat mai mult al observațiilor îndelungate ale pescarilor, — în urma cărora unele regiuni ale oceanelor, cu un fund mai ridicat, formează locul de întîlnire a bancurilor de pești în sezoane determinate din viața animalelor. Așa e cazul bancului dela Terre Neuve, din partea estică a Americii de nord și a altora mai puțin însemnate din celelalte regiuni ale oceanelor și mărilor, în enumerarea cărora nu putem intra.

Migrațiile peștilor stenohalini se fac în interiorul aceleiași mase lichide, fie oceanice (deci marine), fie dulcicole (deci în rîuri). Ele sînt determinate numai de cauze externe, uneori combinate cu satisfacerea anumitor necesități fiziologice. Pentru cunoașterea unui caz complex de migrație stenohalină, vom analiza pe scurt viața thonului (*Orcynus thynnus* L.) din Mediterană și din zona intertropicală a Atlanticului nordic.

Thonul sau *Lacherda* adultă ajunge pînă la 2 m. lungime, cu o greutate de pînă la 300 kg. Animalele sînt și stenotherme, adică au nevoie de o apă cu o temperatură determinată (20°C). Deplasările lor în masa marină sînt deci condiționate de acești 2 factori combinați: salinitate și temperatură. Primăvara lacherdele se adună în basinelul dintre Sardinia, Sicilia și Tunis, dispărînd din restul Mediteranei. Este călătoria de nuntă ce ține 2 luni în aceste meleaguri. După fenomenul nupțial și depunerea ouălor, adulții se diseminează din nou în tot restul Mediteranei.

În acest loc central al Mediteranei se găsesc condițiile cele mai constante de salinitate și temperatură. Curentul atlantic, ce vine din Gibraltar, se pierde dealungul coastelor africane; apele dulci ale diferitelor rîuri (Rhon, Tibru, Guadalquivir, etc.) se uniformizează în masa apei saline; vînturile nu produc decît curenți circulari între aceste coaste. Deci din cauza constanței remarcabile a condițiilor de salinitate și temperatură, lacherdele mediteraneene încredințează acestui loc progenitura lor. În ultima analiză deci numai factorilor de mediu li se datorește migrația acestor animale în Mediterană.

Aceste obiceiuri ale lacherdei sînt bine cunoscute de pescari și în conformitate cu ele este reglat și pescuitul animalului (42), furnizorul exclusiv al conservelor de „thon“.

La noi în Marea Neagră se pare că tot un fenomen asemănător se petrece cu scrumbiile albastre (*Scomber scombrus* L.), ale căror deplasări în apele țărmlui romînesc nu se pot încă prevedea și sînt variabile dela un an la altul.

Euryhalinele, adică animalele ce pot suporta în mod normal variații de salinitate, sînt mai cosmopolite, mai diseminate în apele pămîntului. Prezența lor în bancuri este semnalată numai în anumite epoce din viața lor, și adunarea la un loc e provocată de cauze fiziologice, cu un scop mai superior decît conservarea individului.

Valoarea lor economică nu e de mai mică importanță decît a acelor stenohaline. Iar deplasarea lor dintr'un loc în altul poate fi provocată și de alte cauze decît salinitatea: hrană, temperatură, oxigen, pH, etc.

Trebue menționat că fenomenele de eury- și stenohalinie, nu sînt întotdeauna paralele cu fenomenele de eury și stenotermie sau cu cele de eury- și stenoionie etc. Somonul cu toate că e un euryhalin, e în același timp și un stenoterm pentru rece, cu variațiuni de temperatură destul de limitate. Alosa este deasemenea un euryhalin și un stenoterm (23°C) mai accentuat decît somonul și cu limite de variații ale temperaturii mult mai restrînse.

Mai degrabă putem face un paralelism între eury- și stenohaline cu eury- și stenoionie. Animalele care în mod normal pot suporta variații de salinitate, trebuie să poată suporta și variații de pH, căci un mediu salin este tamponat, adică cu un pH fix, pe cînd un mediu dulcicol este netamponat, adică cu un pH variabil după natura solului, a plantelor din el, a cantității de acizi humici solvați, a presiunii CO₂-ului din atmosferă etc.

Animalele limitrofe sînt, în general, euryione, mai ales în zonele de maree, pe cînd cele din larg sînt stenoione. La țărîm sînt variații diurne de pH foarte însemnate (ploi, evaporație, căldură, dejecțiuni, vegetație etc.), care însă nu mai influențează fauna de țărîm. Dar cu toate variațiile însemnate de pH, salinitatea apei din regiunile coastelor nu variază atît de mult, astfel că animalele limitrofe pot fi euryione și stenohaline, încît nici între aceste 2 însușiri nu este întotdeauna un paralelism.

Fischer (15), Legendre (30), etc., au arătat că animalele de țărîm pot suporta variațiuni de pH dela 6 la 9,3 (uneori chiar 11), adică oscilații de 50%, pe cînd variații de salinitate numai de 15% le omoară.

Experiențele numeroase ale lui Fontaine și Boucher-Firly (18), Drillhon și Pora (13) etc., au arătat de altă parte că animalele euryhaline atunci cînd trec dintr'un mediu tamponat (apă de mare) în unul netamponat (apă dulce), își măresc rezerva alcalină, adică posibilitățile de a menține un pH intern invariabil cresc. Rezerva alcalină scade cînd trecerea se face în sens invers.

Euryionele au prin urmare un mecanism intern foarte eficace, care se opune variațiilor de pH ale singelui.

Problema unui *tropism* în legătură cu aceste fenomene de migrație s'a pus de multă vreme și sînt numeroase experiențe care dovedesc că urcarea în contra curentului de apă a unui pește, este datorită unui rheotropism pozitiv, al cărui sediu de percepție ar fi linia laterală a animalului (frecarea apei), cît și fenomenele optocinetice, datorite imaginilor de deplasare ale țărîmului. În cazul de descendență a curentului lichid, aceleași cauze, percepute invers, ar fi cele care ar produce fenomenul.

S'a numit rheotropism orientarea și deplasarea animalelor acvatice într'o direcție determinată față de curentul apei. Explicarea acestei orientări se face astăzi prin 2 teorii, una a lui Hofer și Steinmann (26), care atribuie liniei laterale perceperea senzațiilor necesare pentru orientarea peștelui și alta a lui Lyon și Loeb (16), care atribuie senzațiilor vizuale această orientare. „Nu curentul de apă este excitantul, ci deplasarea imaginilor retiniene, care are loc dacă peștele este mișcat de curentul lichid“ (Loeb).

Nu putem insista aici asupra tuturor dovezilor pro și contra acestor 2 teorii cari explică rheotaxia. Cert este că există pești a căror orientare este datorită în primul rînd liniei laterale, deci senzațiilor tactile culese de acest organ sensibil (*Esox lucius*, *Cottus gobio*) și există pești a căror orientare e datorită în special senzațiilor vizuale, optocinetice (*Gasterosteus*).

O analiză mai profundă a fenomenului dovedește că și senzațiile tactile propriu zise, cît și cele labirintice, de echilibru, intervin în această orientare.

Alături de aceste mecanisme fiziologice, se mai poate da însă și o explicație pur fizică pentru rheotaxie, ținînd seama de centrul de greutate al animalului și de centrul de aplicare al presiunii externe. Dacă centrul de greutate se află înaintea centrului de presiune, animalul va avea o rheotaxie pozitivă, iar dacă așezarea acestor centre este inversă, el va avea o rheotaxie negativă.

Dar dacă acțiunile rheotropice pozitive sau negative ne pot explica o anumită comportare a peștilor dulcicoli (căci numai cu aceștia s'au făcut astfel de experiențe), ele nu pot fi invocate decît într'o mică măsură, atunci cînd e vorba de pești anisotrofici sau catadromi. S'a spus că somonul urcă rîurile în urma unui rheotropism pozitiv

și că țiparul le scoboară în urma unui rheotropism negativ. Este probabil că aceste reacțiuni rheotropice joacă și ele un rol în urcarea sau scoborîrea râurilor, dar nu pot fi luate drept cauze ale migrațiilor, care după cum vom vedea sînt determinate de necesități fiziologice mai superioare decît excitațiile mediului.

Dealtfel studiul dinamic al rheotaxiilor în legătură cu fenomenele de euryhalinitate este încă la început, astfel că nu putem afirma nimic.

S'au mai atribuit migrațiile și altor tropisme. *Roule* (40) crede că e un oxitropism cel care provoacă migrația somonilor. Elaborarea produșilor genitali cere o cantitate de oxigen mai mare, din care cauză somonul se îndreaptă spre ape dulci, mai bogate în oxigen decît apele marine. Observațiile lui au pornit dela păstrăv. Dar dacă pentru acesta — care e permanent ducicol — este evident acest oxitropism pozitiv, nu tot astfel stau lucrurile la somon. Somonii marini nu urcă toate râurile coastelor, nu se găsesc nici în toți afluenții unui aceluiași rîu. Urcă pe unii dintre ei dar evită pe ceilalți, cu toate că oxigenul solvat e de multe ori egal între cei 2 afluenți (vezi fig. 6). Sînt deci și alte cauze care determină această selecțiune a locului de depunere a ouălor. După cum spune *Roule*, s'ar părea că ei se supun unui rit dela care nu se pot abate, dar pe care noi încă nu-l cunoaștem.

Migrațiile catadromilor sînt apoi tocmai de sens contrar celor de mai sus, acești pești ar trebui deci să aibă un oxitropism negativ, ceea ce ar crea o confuzie în înțelegerea necesităților interne din timpul maturității genitale. Astfel încît oxitropismul poate fi invocat în anumite cazuri, dar nu poate fi acuzat de a fi originea tuturor migrațiilor.

Alosa ar avea — ca și *Petromyzonidele* și *Accipenseridele* — un thermotropism pozitiv, care ar determina ascendența râurilor. Țiparul tot în urma unui thermotropism pozitiv scoboară râurile. Iată cum o aceeași cauză poate, provoca interpretări greșite, pentru că nu e completă, ci doar o parte dintr'un ansamblu pe care încă nu-l cunoaștem în întregime.

Uneori hrana peștilor este și ea în funcție de salinitatea externă, astfel că vedem ce complicație a problemei poate aduce intervenția însușirilor eury — sau stenohaline a materialului nutritiv în studiul diferitelor migrații și deplasări ale peștilor. Și această problemă se pune mai ales pentru peștii de mare talie, a căror hrană o formează bancurile de pești mai mici, care au migrații proprii sau neregulate după însușirile lor eury — sau stenohaline.

Migrațiile sînt deci deplasări ale indivizilor unei spițe, provocate de cauze diferite, care pot fi cauze de mediu: salinitate, temperatură, presiune, curenți, lumină, pH, oxigen, sau pot fi cauze interne dintre cari necesitățile de reproducere sînt cele mai însemnate. *Migrațiile provocate de aceste cauze de mediu sînt neconstante atît ca timp cît și ca spațiu, cele provocate de condițiuni fiziologice sînt sezonare, constante și întotdeauna aceleași.* În prima categorie intră mai ales stenohalinele, stenotermele, stenoionele etc., în cea de a doua intră peștii euryhalini, anadromi și catadromi, cit și unii pești marini care execută migrații sezonare pentru depunerea ouălelor întotdeauna în aceleași locuri cu condiții de mediu constante — *Conger vulgaris*, *Orcynus thynnus* etc.

Migrațiile nu se fac la întîmplare, ele sînt provocate fie de o cauză de mediu, fie de una fiziologică internă.

Astăzi prin termenul de migrații se înțeleg mai ales deplasările peștilor euryhalini, care se pot găsi fie în mediu de apă dulce, fie în mediu marin, după cum necesitățile epocii de dezvoltare în care se află o cer. Deplasările peștilor stenohalini sînt determinate de 2 grupe de cauze: 1) interne (epoca de maturitate genitală, hrana) și 2) externe (condițiuni fizico-chimice ale mediului exterior cerute în acea epocă de organism). Din combinarea celor 2 factori complexi rezultă deplasarea lor. La peștii euryhalini deplasările sînt determinate numai de cauze interne (reprodu-

cere) și mediul extern nu influențează asupra sensului deplasării. Se spune astăzi că peștii steohalini execută călătorii, iar cei euryhalini execută migrații.

Pescuitul somonului, a lăcherdei, a heringilor etc. este rentabil numai când aceste animale sunt adunate în bancuri în regiuni ușor accesibile. Ori prezența bancurilor trebuie pusă în legătură cu anumite condiții de mediu sau condiții fiziologice ale vieții animalului, studiul cărora este încă incomplet.

Migrațiile peștilor se pot face fie numai în interiorul masei oceanice sau marine, fie din acestea în ape salmastre sau chiar dulci, și invers.

Când migrația se face din mare în ape dulci (somon), sau din partea de jos a râului în spre izvoare (păstrăv), adică deplasarea se face în contra curentului de apă, fenomenul ia numele de *anadromie*¹⁾, iar când migrațiunea se face din ape dulci în ape marine, (țipar), adică în direcțiunea curentului de apă, se numește *catadromie*²⁾.

Noțiunile acestea au fost definite și altfel. Peștii marini anadromi, după Roule (41), s'au numit și *potamotoci*³⁾, iar cei dulcicoli catadromi, s'au numit și *thallassotoci*⁴⁾. Termenii aceștia apropiați mai ales de biologii francezi, nu au însă răspîndirea celor de ana — și catadromie.

Să analizăm acum cazul peștilor anadromi și catadromi, cât și posibilitățile acestora de a cuceri medii noi și a fi deci sursă de spițe noi.

Anadromi sau Potamotoci. Fie pentru anadromi peștele cunoscut sub numele de somon (*Salmo salar* L.) (fig. 1).




Fig. 1.

Somonul (*Salmo salar* L.)

Atît somonul atlantic-european, (*S. salar*), cât și cel pacific-american (*Oncorhynchus*) — ca și aproape toate Salmonidele de altfel, — sunt anadromii cei mai bine cunoscuți și cei mai bine studiați (43).

Somonul european trăiește obișnuit în Atlantic. Încă nu se cunoaște locul unde se găsește în apele oceanice, dar se presupune

că e la adîncimi mai mari de 500 m., în zonele masivelor de corali albi (*Amphihelia* și *Lophohelia*), cu multe Crustacee (*Acantheephyra purpurea*) roșii, a căror pigmenți dau și colorația specifică a cărnii de somon.

Somonul este unul dintre animalele cele mai vorace. Are nevoie de o cantitate



Fig. 2.

de hrană pe care numai în mări o poate găsi. Voracitatea aceasta a fost probabil cauza care l-a determinat să și caute noul mediu de viață în apele oceanice, îmbelșugate în hrană. Căci e sigur că somonul își are originea într-o formă dulcicolă.

Adultul măsoară pînă la 0,70 m lungime și atinge vreo 10 kg. greutate în mod obișnuit, dar poate ajunge pînă la 30 kgr. și 1 m lungime.

În timpul perioadei de reproducere animalele se apropie de gurile râurilor (vezi detalii pe harta dela fig. 2), stau o anumită vreme în aceste ape îndulcite, decolorîndu-se ușor, iar odată cu

1) ana = contra; dromos = drum, curent.

2) Kata = cu, paralel.

3) potamos = apă dulce; tokos = a puia.

4) thalassé = mare.

capul devin complet argintii, suferind în acelaș timp o modificare morfologică în lina de sudură a corpului cu capul. Această modificare este mai evidentă la somonul regal al Americii de nord și Asiei (din Oc. Pacific) și este însoțită și de o schimbare în psihicul animalului, care în rîuri devine din ce în ce mai violent, bălăcios, nervos (fig. 3). Fenomenele acestea morfologice sînt desigur expresiunea unei modificări chimice interne, căci știm că pe baza materialului chimic se produc toate modificările morfologice indiferent de impulsul care le-a provocat.

Somonii urcă rîurile în foarte mare număr, mai ales în America, formînd aici obiectul unui pescuit intens, și după o călătorie oboșitoare care poate dura cîteva săptămîni, parcurgînd uneori mii de kilometri, ajung aproape de izvoare. Ei înving în drumul lor toate obstacolele naturale, cascade, cursuri repezi etc., făcînd uneori adevărate salturi pentru trecerea acestora. Se servesc de înotătoarea codală ca de un arc care îi ajută să trecă peste baraj, sau în susul cascadei. În tot acest timp animalele nu se hrănesc, slăbesc enorm de mult, se urîșesc, se acoperă cu ciuperci parazite (*Saprolegnii*) și devin foarte puțin rezistente la schimbări de condițiuni din mediu. În această slăbire e atinsă mai cu seamă musculatura animalului, se produce o intensă mioliză, a cărei urmare este o eliminare renală puternică de N, P, și chiar Fe. Grăsimea și hidrocarbonatele musculare servesc la alăptarea organelor genitale, care în aceasă vreme iau o dezvoltare excesivă, umplînd complet cavitatea abdominală a animalului. La începutul urcării rîurilor organele genitale erau cam 1/100 parte din greutatea corpului, iar la locul de depunere a ouălor, adică în momentul cînd sînt complet formate, ele formează 25/100 din greutatea corpului. În schimb organele digestive—din cauza neîntreținerii lor—se atrofiază aproape complet (fig. 4).

Paralel cu modificările morfologice s'au putut pune în evidență și modificări chimice ale mediului intern. Green (23) măsurînd presiunea osmotică a animalelor marine și a celor trecute în ape dulci, obține următoarele rezultate:

Δ singelui în mare	00762
Δ „ în estuare (ape salmastre)	00737
Δ „ în ape dulci (locul de depunere a ouălor)	00628

Deci mediul intern suferă variațiuni ușoare de $\Delta = -00134$, atunci cînd animalul trece dintr'un mediu salin de $\Delta = -2000$, în apă dulce. Acest fapt denotă că mediul intern al somnului este foarte constant și foarte puțin supus influenței mediului extern, de care este izolat și față de care are o independență destul de accentuată.

Ajunși la locul de depunere a ouălor (Decembrie-Ianuarie) animalele îmbracă haina de nuntă: purpurul, verdele auriu, carminul, negrul și alte combinații de culori le dau un aspect de bijuterii antice de un foarte frumos efect estetic, cu toate că în fond pigmenții aceștia noi, nu sînt decît produși de excreție a metabolismului azotat (în special conținînd sulf), care se elimină la nivelul tegumentului, probabil sub o acțiune hormonală caracteristică acestei epoci. Femelele sapă cu ajutorul înotătoarei codale un șanț în nisipul albiei, de pereții căruia își freacă abdomenul, care astfel



Fig. 3.

Schimbarea aspectului morfologic și psihic a somonului regal (America de Nord) în timpul perioadei de reproducere.

(d. Tschernawin din Scheuring)




Fig. 4.

Reducerea organelor digestive la *Oncorhynchus* în timpul urcării fluviilor. a=în mare; b=după 2 săptămîni de urcare; c=în locul de depunere a ouălor.

(d. Rutter din Scheuring)

contractat lasă ouăle să iasă la exterior. O femelă depune cam 1500—2000 de ouă pe kg. de animal. Dealungul șanțului masculii își varsă apoi sperma asigurând astfel fecundația. Spermatozoizii pentru a ajunge la ouăle depuse de femele, trebuie să trăiască un anumit timp în apa dulce a râurilor, constituind astfel o nouă dovadă a originii dulcicole a acestor animale.

După depunerea ouălor adulții în majoritate mor, fiind epuizați de un drum obositor, ne mai putîndu-se hrăni, și fiind infectați de ciuperci parazite. Unii totuși izbutesc să recîștige marea, — lăsîndu-se duși mai mult de curentul râului, — unde apa sărată îi scapă de *Saprolegnii*, iar hrana bogată le permite o revenire la normal.

Millet (22) a arătat încă din secolul trecut, că o salinitate cît de mică împiedică desvoltarea ouălor de somon. Acest fapt constituie un indiciu foarte important în ceea ce privește originea acestor animale, care trebuie să fie dulcicolă, iar adaptarea la mediul salin au suferit-o numai adulții, probabil în urma unei căutări de hrană mai abundentă.

Puii ce ies din ouă rămîn multă vreme în ape dulci. Chiar indivizii unei aceleiași incubații, rămîn timp diferit în apă dulce, dela 2—5 ani. S'a observat că această diferență este datorită timpului cît a durat cloceirea; cu cît aceasta a fost mai îndelungată, cu atît și durata de rămînere a puilor în ape dulci este mai mare. Ne putem în felul acesta explica diferențele de comportare între gemeni. Probabil că acest fenomen trebuie pus în legătură cu temperatura și cu procesele chimice și fiziologice ce se petrec în oul în desvoltare sub acțiunea acestui factor fizic extern.

Puii ajunși la un stadiu anumit de desvoltare, cu o lungime de 10—12 cm și puternic pigmentați, se îndreaptă spre mare. În acest stadiu puii au toate caracterele adultului, afară de mărime. Solzii sînt desvoltați și pigmentația lor este asemănătoare adulților, sînt pătați cu pete negre și roșii mai ales în partea dorsală a corpului, partea ventrală fiind argintie și nepigmentată. Numai după cel puțin 60 de zile dela atingerea acestui stadiu de desvoltare, puii sînt capabil de a suporta apa sărată. Experiențele au dovedit că puii netrecuți de aceste 60 de zile, luați direct din râuri și puși în apă sărată, mor, chiar atunci cînd trecerea se face treptat.

În timpul scoborîrii — mai mult pasive — a râurilor, puii se întîlnesc pe drum cu adulții chemați la un nou ciclu de reproducere și trabue admirat în această orînduială faptul că, adulți nu se hrănesc în timpul urcușului, căci cu voracitatea lor și cu epuizarea energiei de urcare, puii ar putea fi o hrană abundentă și ușor accesibilă adulților, iar prin aceasta rațiunea perpetuării s'ar nimici și nu ar mai fi eficace.

Cauza acestei scoborări a râurilor ar fi un fototropism negativ, care i-ar determina să fugă de lumină în spre zonele mai întunecate ale oceanelor (*Roule*), cît și o rheotaxie negativă.

Odată ajunși la gurile râurilor, puii rămîn un anumit timp în estuare, pentru a se adapta saliniității și numai după trecerea acestei perioade de aclimatizare, se pot aventura în larg, unde avînd o hrană bogată se desvoltă repede.

Din studiul solzilor s'a putut cunoaște că somonii au o capacitate de creștere enormă. Ei pot crește într'un an cu 2-3 kg., fapt ce dovedește nu numai că sînt foarte voraci, dar că pot să depună o mare parte din hrana asimilată. Ei au un anabolism foarte ridicat. Acesta este însă mult mai mare vara decît iarna, iar ca urmare zonele de creștere a solzilor în timpul verii sînt mai mari decît cele din timpul iernii. Numărînd zonele largi de creștere a solzilor, putem deci ști vîrsta solzului respectiv, deci și a animalului, căci numărul solzilor ce acoperă corpul rămîne același toată viața animalului. În creșterea individuală trebuie deci și solzii să crească, să urmeze epocile de creștere puternică (vara) și cele de creștere încetinită (iarna) (vezi fig. 5).

Tot datorită studiului solzilor, se poate ști dacă un individ a mai urcat în prealabil râurile, adică dacă s'a mai reproduc. Dat fiindcă în timpul urcușului pe râuri, animalele nu se hrănesc, solzii se opresc în creștere și marginile lor chiar se

distanțează ușor. O astfel de zonă neregulată într'un solz ne arată deci că, animalul s'a mai reproduș odată (vezi fig. 5).

În mod obișnuit un individ se reproduce o singură dată și apoi moare. Dar în unele cazuri animalul are șansa să recîștige marea și astfel se mai poate reproduce odată. Foarte rar (1/1000) un individ se poate reproduce de mai multe ori, sînt cazuri excepționale care se observă foarte rar.

Masculii pot urca râurile deja după 1½ an de viață marină, pe cînd femelele de regulă numai după cel puțin 3 ani.

Celace este și mai curios în această migrație e faptul că puii ce s'au născut într'un râu oarecare, revin pentru depunerea ouălor în același râu sau în unul foarte apropiat. Observațiile acestea s'au făcut prin marcaje de animale, adică prin punerea unui semn de metal sau de ebonită pe corpul peștelui. E probabil că explicarea acestui fapt trebuie căutată în prelungirea văilor râurilor, dealungul plaței continentale (Rin, Sena, Loire etc.), care formează astfel ca niște alee dealungul cărora puii descind la adîncimi mari și dealungul cărora adulții ajunși la maturitate urcă albia oceanică, pentru a da de albia actuală, terestră, a aceluiași râu.

Viața zbuciumată a somonului știința nu a lămurit-o complet. Sînt mai multe chestiuni a căror deslegare este în minile viitorului. Explicările care s'au dat pentru a lămuri urcarea fluviilor nu sînt suficiente. Oxitropismul invocat de Roule, nu poate constitui în sine cauza urcușului. Instinctul de reproducere este un fel al nostru de a ne clarifica o nedumerire. Dece în urcarea râurilor, unele sînt evitate și altele căutate? Dece unii urcă râuri scurte și întotdeauna aceleași, alții preferă râuri lungi al căror urcuș e de mii de kilometri și ține luni de zile? Care sînt normele care dictează această selectivitate? (vezi fig. 6).

Puii descind râurile din cauze încă necunoscute în întregime. Fototropismul negativ e numai o mică parte din cauzele generale, căci în contra luminii animalele ar putea lupta prin pigmentare. Și apoi dece păstrăvul are aceleași deplasări fără a avea aceleași cauze? Și dacă e așa, dece devine somonul lucifug și oxifug ca pui, și din contra, lucifob și exifob ca adult? Unde se duc toți puii în mare, unde cresc și care e rațiunea lor de a se depărta de țărm? Dece în timpul pescuitului în mări, la toate adîncimile căutate, încă nu s'au putut prinde somoni? Dece ei nu pătrund în Mediterană și nu urcă și râurile ce se varsă în aceasta? Care e locul, unde pot găsi o hrană atît de abundentă, încît să satisfacă voracitatea lor și să le permită o creștere excesiv de repede?

Păstrăvul (*Salmo fario* L.) este un anadrom și mai ales formele lui lacustre urcă râurile pentru depunerea ouălor, apoi se reîntorc cu puii în lacul din care au plecat. Această migrație se petrece numai în ape dulci. Ea este prevestitoare a mării și completei migrații a somonului.



Fig. 5.
Solz de somon ce s'a mai produs odată.

(d. Roule)



Fig. 6.

Răspîndirea somonului în Franța.

Rîurile cu linie plină sînt cele pe cari are loc o urcare, cele cu linie întreruptă nu sînt vizitate de somoni. Punctele pline indică locul actual de depunere a ouălor, cercurile arată locul fostelor ape în care somonii își mai depuneau ouăle în secolul trecut. Regiunea hașurată din spre Mediterană arată lipsa somonilor din râurile ce se varsă în această mare.

(d. Roule)

Tot ca somonul european sau pacific, se mai comportă o mulțime de pești marini. Dintre aceștia vom cita *Accipenseridele* din M. Neagră, care urcă Dunărea. Niprul etc. pentruca în locuri de ape curate, pe bancuri de nisip (Porțile Dunării), să-și depună ouăle. Adulții pot rămînea timp îndelungat în ape dulci pentru paza icrelor; uneori e femela, dar de cele mai multe ori e masculul cel care supraveghează puii și îi conduce în mare.

Fenomenele nu sînt însă atît de simple. Înainte de a pătrunde în ape dulci, Sturionizii fac un stagiul de aclimatizare în brațele Dunării, chiar petrec adesea iarna în mîlul din deltă și numai primăvara urcă cursul rîului. Puii ieșiți din ouă nu rămîn în ape dulci decît puțină vreme, ei se îndreaptă spre mare (nu toți deodată, ci există diferențe chiar între frați), iar la gurile de vărsare ale rîurilor, fac un stagiul de aclimatizare, care poate dura chiar 2-3 ani. Numai pe urmă pot lua drumul largului, în spre adîncimi mai mari, cu salinități mai crescute decît la suprafață.

Observațiunile acestea au fost făcute mai ales de Dl. Prof. Dr. Gr. Antipa (2,3), pe morun (*Huso huso*), nisetru (*Accipenser Guldenstädti*), păstrugă (*A. stellatus*).

Accipenseridele sînt deci pești anadromi, afară de 2 spițe: *Accipenser ruthenus* (cegă) și *A. glaber* Marsigli (viza), care nu s'au putut adapta vieții marine. Anadromia lor dovedește că și originea lor trebuie să fie dulcicolă, însă mult mai veche decît a *Salmonidelor*, deoarece puii pot chiar în timpul unui an să treacă din apă dulce în apă de mare, posibilitate cîștigată în urma unei perioade de adaptare foarte îndelungată.

Mai amintim, ca pești anadromi cunoscuți, aproape toate *Clupeidele*.

Dintre acestea mai bine studiată este *Alosa alosa* și *A. finta*. Animalele în vîrstă de cel puțin 3-5 ani urcă fluviile, primăvara, pentru depunerea ouălor. În acest drum se pare că temperatura apei este factorul direcționant. *Alosa* avînd un termotripism pozitiv, caută ape calde căroră să le încredințeze viitoarea progenitură (23°C). După depunerea ouălor animalul e complet istovit și numai prin puțini indivizi mai reajung înapoi în mare.

O femelă poate depune pînă la 100.000 de ouă. Timpul de incubație este abia de cîteva zile. Puii se pot reîntoarce în mare încă în acelaș an, dovedind deasemenea o adaptare mai veche decît a somnului la viața marină.

În timpul trecerii din mare în apă dulce presiunea osmotică a mediului lor intern aproape nu se schimbă. În schimb se produce o puternică declorurare a animalului, astfel că în stabilirea presiunii osmotice totale ClNa nu intră după depunerea ouălor, decît într-o proporție de 20%, pe cînd la indivizii marini ea avea o parte de 70%.

Iată rezultatele lui Fontaine (17) pe acest animal:

	Δ mediului intern	ClNa în gr. ‰	ΔClNa Δ total
Aprilie. Normal (animale marine)	— 0°78	9,30	0,71
Iunie. ♀ la începutul urcușului, cu ouă	— 0°59	5,47	0,56
♀ slăbite, după depunerea ouălor	— 0°53	1,97	0,22
♀ foarte slăbite	— 0°59	2,19	0,22
♂ cu aspect încă normal	— 0°60	3,35	0,33
♂ foarte slăbiți	— 0°52	1,75	0,21
♂ foarte slăbiți	— 0°53	1,61	0,19

Aceste determinări dovedesc că nu se produce numai o simplă diluție a mediului intern, printr'o hidratare, atunci cînd animalul trece din mare în ape dulci, ci o schimbare profundă în raporturile elementelor minerale ale sîngelui. Cu toate acestea presiunea osmotică variază foarte puțin, ceea ce este o dovadă că alte

elemente decât CNa, iau parte în stabilirea Δ total. Nu se găsesc însă date în literatură, care să arate natura noilor componenți ai mediului intern a animalelor anadrome ajunse la locul de depunere a ouălor. Dar rezultatele determinărilor de rezervă alcalină dovedesc creșterea acesteia. Dacă admitem împreună cu *Fontaine* și *Boucherfirly* (18) că tot Co_2 ul s'ar găsi sub o formă de bicarbonați solubili, atunci hipocloremia observată mai sus, este perfect explicată de creșterea bicarbonaților (într-o mică măsură și a fosfaților), astfel că menținerea unui Δ constant nu e greu de înțeles.

La noi scrumbiile de Dunăre (*Alosa pontica*) formează obiectul unui pescuit intens și foarte productiv. Unele din ele caută apele dulci pentru depunerea ouălor, altele preferă apele salmastre ale limanurilor.

Dintre alte Clupeide foarte însemnate pentru Dunăre, este *Alosa Nordmanni* (nezeafca), de o talie mai mică decât adevăratele scrumbii de Dunăre, dar al cărei pescuit este de mai lungă durată și deci mai rentabil (4).

Un alt reprezentant anadrom, al cărui studiu este destul de avansat, este *Petromyzon marinus*, caracteristic mai ales țărmurilor atlantice. El nu se aventurează încă în regiunile noastre, fiind prea îndepărtate, dar Rinul, Loire-ul și toate râurile direct atlantice sunt pline de *Petromyzon marinus*, care în stare adultă și în apropierea epocii de maturitate genitală (primăvara), urcă râurile pentru a căuta locuri propice unde să depună ouăle. Este curios că un individ ce a urcat fluviile nu mai poate suporta apa salină ce trece de un $\Delta = -1^{\circ}00$. După depunerea ouălor adulții nu se mai întorc în mare.

Fontaine (17) a studiat mediul intern al acestor animale și a constatat că este destul de independent de mediul extern, cu toate că animalul face parte din clasa cea mai primitivă a peștilor actuali (Cyclostomi). Independența mediului lor intern față de cel extern, nu are valoarea celeia dela somon, dar este destul de însemnată și dovedește că ea este un fenomen de adaptare ce nu este legat de superioritatea sau inferioritatea animalului pe scara zoologică (vezi fig. 10).

Și la *Petromyzon* se observă o declorurare a singelui, când animalul trece din mare în apă dulce, dar aceasta nu este atât de accentuată ca la *Alosa*. În schimb Δ mediului intern nu are constanța celeia a Teleosteenilor anadromi. Iată datele lui *Fontaine* (17):

	Δ mediului intern	CNa în gr. ‰	Δ CNa Δ total
Aprilie. Normal	— 0°54	6,09	0,77
Iunie. ♂ în stare normală	— 0°47	6,06	0,76
♀ în stare rea	— 0°41	5,03	0,73
♂ în stare foarte rea	— 0°25	2,26	0,56

Prin trecerea din mare în apă dulce și rezerva alcalină a acestui animal crește, astfel că deficitul clorat s'ar putea explica și aici prin surplusul de bicarbonați, pentruca să se mențină presiunea osmotică la un nivel destul de ridicat (18). Paralel cu creșterea bicarbonaților se observă și o creștere a consumului de oxigen pe kg — oră de animal (20).

S'ar mai putea aminti și alți pești potamotoci, a căror anadromie este însă mai redusă (*Osmerus eperlanus* L. etc.). Aceștia vin din mare să-și depună ouăle în lagune, estuare etc. dovedind prin aceasta sau o foarte veche origină dulcicolă, sau un început de adaptare la viața în ape dulci.

Peștii anadromi formează o categorie însemnată de animale exploatabile comercial. Atita vreme cât pescuitul lor se face ținând seama de necesitățile fiziologice ale animalelor și de asigurarea progeniturii lor, ei vor fi o sursă însemnată de venituri pentru Stat. Dar dacă acest pescuit va fi nesistematizat și nu va ține seama

de biologia animalelor, va fi o pacoste care va secătuï în scurtă vreme apele de această bogăție a cărei exploatare astăzi încă lasă de dorit. Pentru raționalizarea pescuitului este însă nevoie de a cunoaște amănunțit viața acestor animale, dezvoltarea puilor, hrana lor, etc., lucruri numai în parte cunoscute, pentru aprofundarea cărora Statul ar trebui să pună la dispoziția cercetătorilor toate fondurile necesare. Căci numai prin mici sacrificii, ce pot părea în ochii profanului drept inutile, se poate asigura un mare beneficiu viitor.

Din acest succit studiu a peștilor anadromi, reținem că trecerea dintr'un mediu salin într'unul dulcicol (sau invers pentru pui), nu se face decît după un anumit stadiu de aclimatizare și că *mediul intern al anadromilor are o anumtă independență față de variațiunile saline ale mediului extern*. Deasemenea e important că trecerea dintr'un mediu într'altul se face, însoțită de regulă, de anumite *modificări morfologice*, expresiunea unor schimbări chimice în interiorul mediului intern al animalului.

(va urma)

Filogeneza sistemului urogenital la Vertebratele gnathostomate

de

ADRIANA ANTONIU MURGOCI

Asistentă la Lab. de Zoologie, Universitatea Iași

Între organele de reproducere și cele de excreție se stabilesc la Vertebrate, ca și la Nevertebrate, legături strînse de așezare, de geneză și de funcționare; de aceea se studiază de obicei împreună, sub denumirea comună de „sistem urogenital”. Acest sistem oferă o mare variabilitate la diferitele grupe de Vertebrate, în privința relațiilor dintre gonade și cele trei trepte de dezvoltare ale aparatului excretor: pro—mezo—și metanefros. De aceea diferiți cercetători care au studiat anatomia și embriologia sistemului urogenital, la una sau la mai multe clase de Vertebrate, au căutat în limitele posibilităților, să traseze cîte un plan, care să cuprindă și să explice această mare variabilitate, arătînd tipurile principale de sisteme și raporturile filogenetice presupuse dintre ele.

Una dintre cele mai noi încercări în această direcție a fost făcută de savantul rus *Maschkowzeff*; după studii îndelungate asupra embriologiei și anatomiei sistemului urogenital la *Acipenseride*, *Amfibiene* și *Teleostei*, începute înaintea războiului mondial, la Giessen, în laboratorul profesorului *Spengel* și continuate la Laboratorul de Morfologie evolutivă dela Academia de Științe din Moscova, *Maschowzeff* a ajuns la următoarele concluzii:

La toate Vertebratele gnathostome gonocitele primare migrează în timpul vieții embrionare și trec prin plăcile laterale și prin mezenterul dorsal, fiind atrase spre regiunea dorsală a corpului de pîlniile mesonefrotice primare, lîngă și în a căror buză medială se așează, dezvoltînd-o și formînd astfel o serie de gonade metamerice; după aceste cercetări, glandele genitale deci n'ar fi decît buzele mediale ale nefrostomilor mezonefrotici primari, dezvoltate prin îngrămădirea gonocitelor primare, sub epiteliul lor (fig. 1).

În urmă, prin creșterea în senz longitudinal a gonadelor și a pîlniilor primare¹⁾ se ajunge la o gonadă unică și la un șanț ciliat, care se întinde în tot lungul go-

1) *Semper* încă din 1875 a formulat ipoteza că la Teleosteenii și la Dipnoi canalul genital se formează pe seama nefrostomilor mezon. primari și deci este omolog cu canalul longitudinal testicular dela Selacieni, Urodele, ș. a.

model (fig. 1). Prin închiderea acestui șanț se formează canalul longitudinal al testicolului, omologat de Maschowzeff și de majoritatea celor ce s'au ocupat cu embriologia sistemului urogenital, (Felix, Kerr, Budget, ș. a.) cu canalele genitale masculine și femela dela Teleostei și Crossopterigii și cu canalul central testicular dela Ganoizi, Saraceni, Dipnoi, Amfibii și Amniote.

După numeroase observații, sistemul urogenital la vertebratele gnathostomate are ca rezultatul unei evoluții ortogenetice, plecând dela un tip primitiv, comun tuturor două sexe. Sistemul ancestral consta din câteva canalicule pronefrotice și o serie de canalicule mezonefrotice primare și secundare, deschise toate în celom printr'un nefrostom ciliat și cu celal capăt deschise în ureterul primar (fig. 2). Lingă buza medială a pilnii mezonefrotice primare se găsesc gonadele; ovulele sau spermatozoizii cădeau în celom de unde erau conduși spre ureterul primar prin toate cele trei serii de pilni: pronefrotice și mezonefrotice primare și secundare. În acest stadiu, aparatul reproducător și cel excretor aveau o dispoziție segmentară, fiind legate strâns împreună prin aceiași produsele lor foloseau aceiași căi pentru a ajunge la exterior.



Fig. 1.

Formarea gonadei unice, prin contopirea gonadelor segmentare. Prin creșterea în sens longitudinal a nefrostomilor mezonefrotici primari se formează un șanț ciliat, care, se va închide din cauza creșterii laterale a glandei genitale, formînd canalul longitudinal al acesteia.

(d. Al. Maschkowzeff)



Fig. 2.

Sistemul urogenital în stadiul primitiv ipotetic, comun tuturor vertebratelor gnathostome.

(idem)

a) Plecînd dela ¹⁾ tipul ancestral (fig. 1), la unele vertebrate s'a format o *cameră pronefrotică laterală*, care a închis complet drumul pilnii pronefrotice pentru elementele sexuale, determinînd evacuarea lor numai prin pilniile mezonefrotice. La toate

aceste forme căile genitale sînt de origine mezonefrotică de aceea această dezvoltare a fost numită de Maschowzeff „*de tip mezonefrotic*“. În acest grup de vertebrate au fost două direcții posibile de evoluție, determinate, după toate probabilitățile, de extinderea în lungime a gonadelor, în raport cu lungimea mezonefrosului.

1. În primul caz, gonada, rezultată din contopirea gonadelor metamerice primitive și canalul longitudinal, format, cum am văzut, din pilniile mez. primare, s'au dezvoltat în tot lungul mezonefrosului, utilizînd pentru evacuarea produselor lor, numai canalele mez. primare: precursorii Teleosteiilor și cei ai Crossopterigiilor actuali (fig. 3, a). Produsele genitale străbăteau astfel tot mezonefrosul, jenînd în epocile de reproducere funcția de excreție; această jenă a fost probabil cauza, pentru care canalul longitudinal s'a separat de nefrostomii care i-au dat naștere și a rămas legat cu ureterul primar numai prin ultimul canalicul (fig. 3, b). Căile genitale s'au separat astfel complet de cele excretorii. La Crossopterigii masculi (Polypterus) și la Teleosteenii masculi, canalul longitudinal al testicolului continuă capătul posterior al gonadei și se deschide la baza papilei urogenitale, ca în fig. 3, b. Tot așa se comportă și conductul Teleosteenilor; la Polypterus femel însă, șanțul longitudinal nu se închide

¹⁾ Vezi: Al. Maschkowzeff, Anat. Anz., vol. 59, 1924. Id. Zool. Jahrb., Anat., vol. 48, 1926. Id. Anat., vol. 58, 1934. Id. Ibid. vol. 59, Heft 1/2, 1934 și Heft 3, 1935.

în canal decît la partea posterioară, rămînînd scurt și deschis la partea anterioară în celom printr'o pîlnie largă (fig. 3, c).

Cum se explică marea variație întîlnită în dezvoltarea canalului longitudinal la Teleosteenii? Embriologia arată că în această clasă canaliculele nefrostomale primare se separă de timpuriu de nefrostomi lor. Acești nefrostomi intră în constituția unei plăci epiteliale, pe socoleala căreia se formează și gonadele și canalul lor. O astfel de dezvoltare prescurtată, face ca materialul celular să fie foarte mobil; deaceia lumenul canalului apare uneori direct în interiorul gonadei, alteori ca un șanț pe pe-

retele lateral al gonadei și care se închide ulterior; alteori însîrșit se formează după tipul arătat în fig. 1. E probabil că strămoșii Teleosteenilor actuali aveau oviductul deschis printr'o pîlnie în celom, ca la *Polypterus* femel, oviduct care s'a închis în urmă complet prin creșterea laterală a ovarului. Porii genitali dela Salmonide, Muraenoide și Mormiride corespund cu aceste canale longitudinale, rămase foarte scurte, așa cum a arătat întăia oară Weber (1886).

2. În al doilea caz gonadele nu s'au întins decît pe o porțiune din lungimea mezonefrosului, de aceia produsele lor, nestîngherind prea mult funcția de excreție, au continuat să fie conduse spre ureterul primar prin acele pîlnii mezonefrotice primare, care se aflau în dreptul gonadei; singurele pîlnii al căror epiteliu a luat astfel parte la formarea canalului longitudinal al gonadei. În acest al doilea caz însă, alături de acest canal și în afara lui (fig. 4, a) s'a format un al doilea canal, exact în acelaș fel ca primul (cum s'a arătat în fig. 1) numai că la formarea lui au participat pîlniile mesonefrotice secundare, ceiace reiese din studiul foarte amănunțit al dezvoltării sistemului urogenital al Acipenseride. Acest al doilea canal este un oviduct și nu se închide niciodată complet, rămînînd deschis la capătul anterior, în celom, printr'o pîlnie largă, iar la capătul posterior comunică, prin ultimul canalicul mezon. secundar ce i-a dat naștere, cu ureterul primar. (fig. 4, b).




Fig. 3.

Dezvoltarea sistemului urogenital la Teleostei și Crossopterygii.
(Idem)

Fig. 4.

Evoluția sistemului urogenital la Chondrostei și Osteogonoi.
(Idem)

Primul canal (can. longitudinal al gonadei), îndeplinește la acest tip de dezvoltare și la toate cele ce vor urma, numai funcția de conducere a spermatozoizilor la masculi, oviductul însă persistă la Chondrostei la ambele sexe, servind în tot timpul vieții (*W. Baschmakoff*) la eliminarea unei părți a lichidului celomic, iar la femeli servește, în perioada de reproducere și la conducerea ovulelor, prin ureter, spre exterior. Cauza care a determinat, la acest grup de animale, formarea unui canal special pentru conducerea ovulelor, a fost probabil mărirea volumului acestora, prin încărcare cu vitelus, ceiace a cerut un canal mai larg și evitarea căilor renale interne.

La Holostei femeli oviductul se formează la fel; la *Amia* femel, acest oviduct se deschide cu totul posterior în ureter (fig. 4, c), iar la *Lepidosteus* femel, pîlnia oviductului se închide complet, prin creșterea laterală a ovarului, de aceia, la acest gen, oviductul provenit din nefrostomi mezon. secundari, se află în prelungirea ovarului.

La *Amia* și la *Lepidosteus* masculii oviductul nu se formează de loc, deci sistemul lor urogenital amintește tipul primitiv (fig. 3, a) presupus la strămoșii Teleosteiilor și *Crossopteri*gilor actuali, formînd ca o punte de trecere între cele două ramuri ale tipului „mezonefrotic”.

b). Restul Vertebratelor: Selacieni, Dipnoi, Amfibii și Amniote, nu prezintă în cursul dezvoltării lor o cameră pronefrotică internă sau au o astfel de cameră larg deschisă în celom; aici, produsele sexuale au găsit drumul liber spre ureter prin toți nefrostomii: pronefrotici, mezonefrotici primari și secundari (fig. 2). Cu vremea a urmat și aici o specializare, datorită poate tot măririi volumului ovulelor, prin acumulare de vitelus și anume, ovulele au început să fie conduse spre ureter numai printr'un singur canalicul pronefrotic, care s'a transformat în oviduct și a început să se separe treptat de ureterul primar (fig. 5, a). Oviductul se constituie la ambele sexe, dar rămîne la masculii mai mult sau mai puțin rudimentar. Fiindcă la Selacieni, Dipnoi, Amfibii și Amniote, nefrostomii pronefrotici iau și ei parte la constituirea căilor genitale sistemul lor urogenital, este considerat de Maschkowzeff că aparține tipului de dezvoltare „pronefrotic”. Din punctul de vedere al dezvoltării căilor spermatice, se deosebesc și în acest grup două direcții de evoluție:

1. La formele primitive din care se trag Dipnoii actuali, repliul genital s'a dezvoltat în toată lungimea mezonefrosului, ca și canalul longitudinal al testicolului (fig. 5, a), asemănîndu-se în această privință cu premergătorii *Crossopteri*gilor și Teleosteiilor actuali.

Intocmai ca la aceștia din urmă, rinichiul Dipnoilor primitivi era străbătut de spermă în toată lungimea sa, în epoca de reproducere, ceea ce a dus la o separare treptată a canalului longitudinal testicular. La *Ceratodus* acest canal rămîne legat cu ureterul prin 12 canalicule mezon. primare = vasa efferentia; la *Lepidosiren* numai prin 5; iar la *Protopterus* această separare și-a alina termenul, canalul longitudinal rămînînd legat cu ureterul numai prin un singur canalicul renal (fig. 5, b), și anume cel mai posterior.

2. Premergătorii Selacienilor, Amfibiilor și Amniotelor actuale au urmat o altă cale de evoluție: gonadele lor s'au dezvoltat pe deplin numai în dreptul regiunii mesonefrotice anterioare (fig. 6, a).

Canalul longitudinal al testicolului s'a format probabil la început, în tot lungul mezonefrosului, deoarece *Semper*, la embrionii de Selacieni, l-a găsit dezvoltat normal la capătul anterior, iar la capătul opus se vedea încă o placă celulară, neînchisă spre a formă un canal.

Canalul longitudinal nu s'a separat de canaliculele mezon. primare și toată regiunea mezonefrotică străbătută de spermă a devenit un rinichi genital, al cărui canal = vas deferens, începe să se separe treptat de ureter (fig. 6, b și c).

La *Scymus*, *Centrophorus*, *Scyllium*, *Squatina*, rinichiul genital e legat de canalul longitudinal prin 10-6 vase eferente; la *Holocefali*. *Rajide* și *Galeus*, acestea se reduc la unul singur.




Fig. 5.
Dezvoltarea
oviductului la
Dipnoi, după
„tipul prone-
frotic”
(Idem)

Fig. 6.
Dezvoltarea oviduc-
tului de tip pronefrotic
la Selacieni și Amfi-
biene.
(Idem)

Acelaş lucru se petrece şi la Urodele (*Spengel*); Axolotl şi Triton posedă 10 vase eferenţia, *Desmognathus fuscus*, numai unul singur.

Printre Anure, dispoziţia cea mai primitivă se găseşte la genurile *Rana* şi *Bufo* (cu numeroase vase eferente în regiunea genitală a rinichiului); urmează apoi *Discoglossus* cu 3 şi *Alytes* cu un singur vas eferent. Dintre Anure, numai la *Alytes* eăile genitale sînt separate complet de căile urinare (fig. 6. c) aşa cum este şi la Urodele.

În marele grup al *Amniotelor*, oviductul s'a separat tot din ureterul primar, iar ostiumul său abdominal este de origină pronefrotică, deci oviductul *Amniotelor* se poate omologa în totul cu acela dela *Selacieni* şi dela *Amfibii*. În ce priveşte sistemul excretor, se pare că în decursul timpului, metanefrosului *Amniotelor* a fost precedat de stadii în care, pe măsură ce întreaga parte anterioară a mezonefrosului se transformă în rinichi genital, funcţia excretorie s'a deplasat treptat spre partea caudală a corpului şi acest proces de „caudalizaţie al mezonefrosului“ a condus în cele din urmă la formarea unui organ de sine stătător: Metanefrosul.

O privire de ansamblu asupra evoluţiei sistemului urogenital la Vertebratele gnathostomate, din punctul de vedere al separării căilor genitale de cele excretorii, arată că această evoluţie a avut loc fără utilizare de organe noi; s'au întrebuiţat în acest scop numai cele trei tipuri de canalicule renale primitive: pronefrotice şi mezonefrotice primare şi secundare, după un principiu care pare a fi comun tuturor sistemelor de organe şi anume: arareori şi cu greu se creiază organe cu totul nou; în general se întrebuiţează materialul preexistent, ceiace limitează numărul căilor posibile spre perfecţionare, şi imprimă evoluţiei un caracter ortogenetic.

Rolul bogăţiilor naturale în apărarea naţională ¹⁾

de
Dr. ING. ALEX. CHELARESCU

Cu ocazia unui război, în timpurile noastre, apărarea naţională e rezultatul unui întreg complex de factori, pe care dacă nu i-am pregătit în prealabil, hotărâsc peste voinţa noastră, soarta conflictului armat. Rolul acestor factori e capital şi hotărîtor; ei sunt rezultatul unor pregătiri sistematice, minuţioase şi de mare previziune care trebuiesc executate din timp de pace şi cu mult înaintea conflictului armat. Totalitatea acestor factori alcătuiesc ceiace se cheamă: „potenţialul naţional de război“ a unui stat ²⁾.

Acest complex poate fi divizat în două părţi distincte:

1. Puterea efectivă a unui popor la mobilizare.

2. Puterea potenţialului său de război.

1. *Puterea efectivă la mobilizare*, la rîndul ei este condiţionată de capacitatea de acţiune şi volumul armatei active împreună cu rezervele ei instruite; de stocurile de muniţiuni şi armamentul aflător asupra efectivelor active şi de rezervă şi în fine de fortificaţiile de frontieră şi de coaste maritime.

Puterea potenţialului de război este rezultanta următoarelor condiţii:

a) *Moralul naţiunii* depinde în cea mai largă măsură de unitatea de conducere şi capacitatea energetică, rezultat al modului cum guvernul înţelege să dirijeze opera de apărare şi organizare a vieţii interne precum şi de mijloacele de luptă pe front.

b) *Putinţa de hrănire şi aprovizionare* atât a armatei cît şi a populaţiei.

c) *Existenţa tehnicienilor* şi a cît mai mulţi specialişti, în afara celor plecaţi pe front, care să constituie o garanţie a aprovizionării cu muniţiuni şi armament şi

1) Conferinţă ținută în ziua de 26 Martie 1938 în Amfiteatrul Laboratorului de Mineralogie a Universităţii din Iaşi, în cadrul ciclului de conferinţe organizat de A. G. I. R.

2) *Rudeanu, Gen.*: Apărarea noastră naţională şi bogăţiile României întregite. Timişoara 1936.
Col. Dr. Alex. Costin Dobre.: Industria ţării şi apărarea naţională sub aspectul crizei. An. Economice şi statistice. XX, 3—5 pg. 173, 1937.

să amelioreze clipă de clipă, cantitativ dar mai ales calitativ, toate mijloacele posibile de luptă.

d) *Materiile prime* existente în țară cît și aprovizionarea și depozitarea din vreme a celor care ne lipsesc.

e) *Capacitatea industriei naționale.*

f) *Viteza de transformare a industriei* dela tipul de pace la cel de război.

g) *Rețeaua de comunicații* de toate categoriile, cu capacitatea ei de transport și calitatea materialelor de care se servește. Se știe că uzura e direct proporțională cu calitatea materialelor care îi alcătuiesc inventarul său.

h) *Situația geografică* a punctelor vitale prin distanțele și situația lor față de centrele industriale și miniere cît și acelor industriale față de front și restul țării.

i) *Capacitatea financiară* a statului.

Toate cele enumerate sub numele de potențial de război, în afară de moralul națiunii și puțința de hrănire și aprovizionare sînt denumite la un loc „potențialul material de război“.

Din cele expuse mai sus, spre a vă da ocazia unei vederi de ansamblu, eu mă voi ocupa în cele ce urmează de rolul bogățiilor naturale și în ultima parte a conferinței de bogățiile noastre naturale văzute prin prisma apărării naționale.

Țara care va fi aptă să răspundă prompt tuturor cerințelor de înarmare, cît și să-și asigure în limita posibilităților așa zisele captole surpriză în evoluția unui conflict armat, va avea asigurată calea către victorie.

În zilele noastre tot ce iese aparține acestei țări fie element human, fie element material, trebuie utilizat contra inamicului cu un randament cît mai ridicat. Astăzi nu mai există acel separatism între populația civilă din interiorul țării și armata de pe front. Apărarea activă și cea pasivă cere locuitorilor dela mic pînă la mare, atît pe linia de foc cît și în interiorul țării, un efort continuu și susținut. Tehnica a ajuns la o asemenea dezvoltare încît pretutindeni elementul human tinde a deveni comandant ori mînuitor al celor mai complicate mijloace tehnice întru apărarea sa și a țării sale.

În rîndurile de mai sus am amintit că una din condițiile esențiale de pregătire este aceea de a fi în stare să furnizăm și îmbunătățim zi de zi armamentul și munițiile cerute de semenii noștri din linia de apărare.

În cele ce urmează vă voi enumera pe scurt imperativele unei perfecționări și mai efectiv al armamentului. Indirect vom ajunge la concluzii pentru materiile prime necesare la fabricarea lor.

Puterea mare de distrugere a unui armament modern crează zone inaccesibile inamicului care ne atacă. Ele întrețin moralul trupelor noastre.

Ofensiva germană din 1917 a prăbușit în înțelesul adevărat al cuvîntului moralul trupelor franceze. Numai datorită tacticei și prestigiului generalului Pétain Franța a fost salvată dela o adevărată catastrofă.

Tot îmbunătățirii armamentului se datorește și micșorarea perderilor, prin o mai mare eficacitate de distrugere a adversarului.

Astfel în bătălia de pe Somme dela 1 Iulie 1916 englezii au pierdut într-o singură zi 60.000 oameni. Mai tîrziu după introducerea carelor de luptă, în bătălia dela 8 August 1917, pe care din cauza dezastrului, generalul Ludendorf o numește ziua de doliu a imperiului German, englezii au avut o pierdere de 1000 oameni.

O statistică engleză deduce că la începutul războiului pierdeau pentru fiecare mie de metri pătrați cucerii 5300 — 8200 oameni. Către finele războiului cînd dispuneau de un armament cu mult superior celui dela începutul războiului pierdeau pentru aceeaș suprafață circa 83 oameni.

Un bun armament sporește viteza de înaintare. Iată ce glăsuiește aceeaș statistică de mai sus:

În anul 1917 și anume în timpul celei de a doua bătălii dela Ypres Englezii înaintau 101 m; în 1918 după introducerea cailor de asalt ei înaintau circa 1010 m., pe zi.

Contrar așteptărilor, cu cît capacitatea de foc e mai mare și armamentul mai bun, se face economie de muniții și armament. Aceasta se explică prin efectul mult mărit al acestor arme. Se uzează mai puțin gurile de foc. În ultima bătălie dela Ypres numai englezii au consumat 4.283.500 obuze. Mult mai târziu și anume în marea bătălie dela Cambrai la care au luat parte și 378 care de luptă s'au întrebuințat numai 293.149 obuze.

În timp de război, în transport, există două imperative: depasarea de trupe și aprovizionarea lor cu munițiuni, armament și hrană. În cazul cînd nu ar exista mijloace de aprovizionare prin rechiziții locale, pentru o divizie sînt necesare 4 trenuri de circa 26-30 vagoane pe zi. Referindu-ne la transport, economia de proiectile de artilerie cu ocazia introducerii cailor de luptă la Cambrai, care se cifrează la 3.900.352 obuze sau cca. 23.942.112 Kgr., rezultă că s'a economisit transportul a 2394 vagoane.

A doua consecință e economia. Pentru a ne edifica, să analizăm costul luptei dela Ypres și a celei dela Cambrai.

În bătălia dela Ypres consumîndu-se 4.283.500 obuze care costau cîte cinci lire bucata fac în total circa 21.417.500 lire.

În lupta dela Cambrai din 378 care de luptă au fost distruse 42 care costau 223.000 lire sterline. Cele 293.148 obuze costă 1.465.740 lire. Din cifrele de mai sus rezultă o economie de circa 19.728.760 lire sterline.

După cum vedem mai sus, toate luptele pot fi interpretate și din punct de vedere economic și comercial. Un conflict armat nu se mai rezolvă numai prin efective puternice. Ele vor conduce și utiliza armamentul manual, mecanizat sau motorizat. Complexitatea compoziției din care sînt prelucrate piesele care compun acest armament ne pune problema dificilă a pieselor de schimb sau fabricate dea întregul. Această cerință are două aspecte, unul industrial și altul de aprovizionare cu materii prime și deci minier.

La noi în țară în intervalul dela 1916-1925 înarmarea și problema apărării noastre naționale, atît de vitală existenței noastre ca stat independent, erau lăsate în desuetudine. În zadar erau eforturile depuse de militari și civili pentru trezirea unui interes pentru apărarea patriei noastre. Forul genevez și statele principale cu politica lor în favoarea unei dezarmări generale, influențau și politica țării noastre, iar cei care militau pentru înarmare erau socotiți încă insuficienți de cultivați sufletește pentru a-și putea însuși teza pacifistă în toată măreția ei.

Capacitatea industrială poate fi redusă la zero prin lipsa materiilor prime. Aceasta s'ar putea remedia prin depozitarea masivă de armament și munițiuni din timp. Nu se recomandă acest procedeu din două puncte de vedere și anume: am posedat armament înapoiat din punct de vedere al calității sale față de cel modern, iar pulberea din munițiuni ar fi supusă alterării într'un timp dat.

Între capacitatea industrială din timp de pace, randamentul exploatării materiilor prime și materialul depozitat pentru necesitățile imediate ale armatei, trebuie să existe un raport bine cunoscut de acei care au în grija lor înarmarea și apărarea acestei țări.

Spre a ne da mai bine seama să trecem iar la statisticele de război.

Armata I-a britanică în anul 1917 a trebuit să aștepte două luni munițiuni și armamente. Din acest motiv în acest timp operațiunile se făceau într'un tempo lent utilizînd munițiuni cu foarte mare economie.

În Iulie 1917 Ministrul Armamentului Francez înștiințează pe Marechalul Foch că față de consumul zilnic de 280.000 obuze de 75 mm el poate fabrica numai

220.000; în consecință se recomandă economie căci surplusul se cheltuiește din depozitele de rezervă. Se intervine pentru aducerea oțelului din America. Germania se ardează și îngreue transporturile prin atacurile cu submarine. Luna August e cea mai critică din punctul de vedere al munițiilor pentru aliați. Criza a fost remediată deabia în Octombrie a aceluiaș an, cînd se trimit din America obuze gata fabricate pentru a fi încărcate cu pulbere.

În general industria franceză a fost cea mai încercată fiind necesar a satisfăce și cererile urgente ale armatelor engleze și americane. La un moment dat nu mai erau suficiente brațele de lucru. Din aceste motive marechalul Foch a intervenit la generalul Haig comandatul trupelor Engleze pentru a-i ceda 4000 de prizonieri spre a fi întrebuințați în minele de cărbuni.

Germanii achiziționau materii prime din America pînă la intrarea acesteia în război. Astfel just înainte de intrarea St. Unite în război, au achiziționat majoritatea fenolului de pe piața americană și datorită abilității diplomatice și unor trucuri reușite aceste cantități au scăpat neconfiscate.

În cazul cînd lipsește unul din mineralele necesare pentru a ne completa potențialul material de război, se va vedea dacă e cazul să poată fi depozitat din vreme. În caz contrar vom trebui să încheem din timp de pace contracte și tratate cu statele care ne pot furniza mai ușor aceste materiale. Cu toate acestea vom suferi riscurile transporturilor care pot fi ușor distruse de aviația inamică.

Iată cîteva date despre asemenea transporturi (3) și greutăți de aprovizionare din timpul blocărei germaniei organizate de către antantă. Se știe că statele care sînt neutre caută să-și valorifice materiile prime cu ocazia unui război învecinat. Din cauze economice aceste state puteau fi greu convinse să renunțe la asemenea venituri și speculau pe adversari între ei. Astfel abia în Mai 1918 s'a putut convinge Suedia să reducă la 1/3 exportul de mînereu de fer în Germania; Dela acea dată Suedia a cedat din transporturile sale 400.000 tone antantei. Cu această ocazie Suedia și Norvegia au pierdut 850 nave care au fost scufundate de submarine. În 1914-1915 Norvegia a expedit în Germania 400.000 tone de pește; în 1916 nu mai exportă decît 50.000 tone.

Acelaș lucru s'a petrecut și cu Danemarca: din 1918 reduce la 1/2 exportul său de materii prime și alimente spre Germania, cedînd restul aliaților și în acelaș timp asigurîndu-le monopolul pentru unt și slănină.

Din Martie 1918 Olanda a crescut cu 1/3 tonajul său de export pentru aliați, iar Elveția a micșorat aproape la zero exportul pentru Germania.

Impedecarea importului nitrăților din Chili au avut de efect micșorarea recoltei cu 50%. În rezumat în timp ce în 1915 Germania importă 1.750.000 de tone, în 1918 nu putea importa decît 27.000 tone. Iată una din principalele cauze pentru care Germania a trebuit să capituleze în fața aliaților, cu toate că era atît de bine pregătit potențialul său material de război.

Din punct de vedere economic ea a fost forțată a accepta și speculațiunile de preț. Un stat suportă în asemenea ocazii servitutea politică și cea economică.

În orice caz este absolut necesar a asigura măcar cuantumul normal al munițiilor de toate felurile și toate armele și materialul aviativ.

O serie întregă de materii prime, după cum vom vedea mai jos, sînt numai decît necesare creerii unui potențial material de război. Cel mai important e combustibilul. În timpul războiului cerîndu-se o amplificare a capacității industriale, metalurgice, etc. consumul combustibilului crește de 4 sau 5 ori mai mult decît sporul realizat de fiecare industrie în parte.

Unitățile militare motorizate consumă o cantitate enormă de benzină. A rămas clasică scrisoarea lui Clemenceau către Wilson prin care acesta îi solicită disperat petrol. Americanii s'au executat în stil mare trimițînd toate tancurile odată, însoțite

de flotă de război. Din acest punct de vedere se spune că victoria aliaților a venit pe valuri de petrol. Astăzi petrolul se plasează pe același plan de importanță ca și oțelul și pulberea.

În cele ce urmează mă voi ocupa pe scurt de materiile prime care se găsesc sub formă de minerale în subsolul țării noastre, în raport cu utilitatea lor pentru crearea unui potențial material național de război. Din acest punct de vedere materiile prime se împart în două categorii:

1. *Materii prime absolut indispensabile*: Combustibili, fer, sulf, cupru, zinc, plumb, aluminiu, mercur.

2. *Materii prime secundare*, descrescând din punct de vedere cantitativ: mangan, molibden, crom, nichel, titan, tungsten, vanadiu, antimoniu, potasiu, dolomit și grafit.

1. *Combustibili*. După starea lor fizică ei pot fi împărțiți astfel:

a) Combustibili gazoși:

1. *Gazul natural sau gazul metan*. Conține 99,12% metan. Se degajă cu o presiune de 4-80 atmosfere. Puterea sa calorică e 8700 cal/mc. Rezervele au fost evaluate la cca 700 miliarde mc.

Se găsește în Sarmațianul podișului Transilvaniei și în Dacianul dela Aricești și Boldești din Jud. Prahova.

2. *Gazul de sonde*, este conținut în pungile cu petrol și se degajă în timpul exploatărilor. Are o putere calorică de 2000—7000 cal/mc. Se mai poate capta încă 2-2½ miliarde mc. anual.

Dau mai jos mersul progresiv al captărilor (4):

Anii ¹⁾	Vechiul regat	Transilvania	Total	Indice cant.
1921	90.419.750	90.062.666	180.482.416	100
1923	101.083.194	186.030.428	287.113.622	111
1925	144.742.360	225.077.363	369.819.723	160
1927	186.726.175	252.311.768	439.037.943	206
1929	547.731.507	258.867.397	806.598.904	605
1931	1.222.717.146	160.354.815	1.383.071.961	1352
1933	1.342.435.856	157.475.291	1.499.911.147	1484
1935	1.626.914.314	185.165.423	1.812.079.737	1799
1936	1.925.727.475	204.721.172	2.130.448.647	2130

După electricitate, gazele naturale constituiesc izvorul termic cel mai ușor de mînuit și cu randamentul optim.

b) Combustibili lichizi.

Petrolul și cu derivații săi alcătuiesc această grupă. În cele ce urmează ne vom ocupa de petrolul brut înțelegînd că avîndu-l la îndemînă se pot extrage oricare din derivații săi. Se găsește în miocenul subcarpatin din Muntenia și Moldova. În flișul carpaților meridionali și orientali începe din Prahova și ajunge în Bucovina. Pentru potențialul material de război necesităm: benzină, toluen, xilen, uleiuri grele, valvolină, vaselină, păcură. Au fost evaluate rezervele sigure pe o suprafață de 6500 ha iar rezervele posibile pe 5000 ha. În aceste evaluări nu intră semnalările de petrol din Bucovina, Maramureș și Jud. Vilcea. Pînă în anul 1930 din 3967 sonde săpate, erau productive 1487. Între anii 1927 și 1937 s'au săpat 96 sonde din care 44 au fost productive. Din acestea, 79 sonde erau pe terenurile statului, iar 17 pe cele private.

Iată mersul exploatărilor petrolului brut:

1) Din cauza lipsei de spațiu dau numai cuantumul producțiilor din 2 în 2 ani.

Anii	Prod. în tone	Indici	Anii	Prod. în tone	Indici
1921	1.168.414	100	1931	6.756.064	578
1923	1.512.302	129	1933	7.376.604	631
1925	2.316.979	198	1935	8.376.017	717
1927	3.669.354	314	1936	8.703.497	745
1929	4.836.974	414	1937	7.219.414	618

În anul 1937 producția de petrol a scăzut cu 17%, față de cea din 1936, cu toate că forajul pentru aceiași ani a crescut cu 19%. Nu a existat în țara noastră o politică a petrolului. Controlul tehnic din partea statului era slab, societățile exploatare barabar și cu risipă acest produs. În acest timp de intensă exploatare, societățile nu au fost silit să facă noi foraje. Acum când producția scade nu avem suficiente sonde în perspectivă de erupție. Asupra viitoarelor perspective a producției de petrol părerile sînt împărțite. După unii specialiști dacă nu se vor descoperi noi orizonturi petrolifere în decurs de 6-7 ani actualele rezerve vor fi secătuite. Acest termen după alții (7,8) e mai lung. Chiar în cel mai bun caz va interveni o scădere temporară a producției care va avea drept consecință pierderea unei părți din actualele debușuri și implicit o diminuare simțitoare a veniturilor statului.

În anul 1937 rafinările au lucrat numai cu 55,5% din capacitățile lor. Se știe că în măsura în care scade producția, cresc cheltuielile de rafinare. Cu atît mai greu vor putea fi deci suportate cheltuielile de investiție cu ocazia noilor foraje.

c) Combustibili solizi.

Dintre combustibilii solizi nu ne vom ocupa de turbă de oarece are o putere calorică prea redusă.

Ligniții, cărbunii brunii, huila și antracitul au o bogăție în carbon începînd cu 57% pentru ligniți și pînă la 92% la antracit. În total rezervele de cărbuni au fost evaluate la 2792 milioane tone.

1. *Ligniții* au o putere calorică de 2600—4100 cal./kgr. și conțin 57—58% C. Se găsesc în mod discontinuu în Dacianul Carpaților meridionali și orientali dela T. Severin pînă în jud. Bacău (incl.).

Iată mersul exploatării ligniților 4):

Anii	Prod. în tone	Indici	Anii	Prod. în tone	Indici
1921	1.594.719	100	1931	1.631.861	102
1923	2.229.410	140	1933	1.313.625	82
1925	2.615.278	164	1934	1.623.858	102
1927	2.850.011	179	1935	1.666.761	104
1929	2.675.080	168	1936	1.671.825	105

2. *Huila* conține 70-89% C și are o capacitate calorică de 7000—9000 cal./kgr. Tot aici după unii autori putem clasifica și cărbunii brunii care se exploatează în bazinul superior al Jiului. Huila propriu zisă se găsește în liasul și carboniferul din regiunile Reșița, Anina, Cozla, Vulcan, Codlea și Cristian.

Exploatarea (4) huilei a evoluat în modul următor:

Anii	Prod. în tone	Indici	Anii	Prod. în tone	Indici
1921	209.576	100	1931	286.530	137
1923	291.831	139	1933	176.778	84
1925	313.572	150	1934	210.326	100
1927	373.457	178	1935	261.085	125
1929	370.947	177	1936	288.861	138

Exploatarea acestui fel de combustibil nu a progresat în acelaș ritm cu celelalte combustibile. Ea nu acopere cerințele consumului intern. În consecință importăm diferența din străinătate. În 1932: 60.579; 1933: 36.651; 1936: 22.871 tone huiă.

Cocsul metalurgic și gazul aerian sunt derivații cei mai importanți ai huii. Cocsul de cea mai bună calitate se fabrică la Anina dar producția nu acopere măcar cerințele Reșiței. În anul 1936 s'au fabricat în țară 220.461 t cocs. Importăm cam 20-30% cocs metalurgic după cum se vede mai jos:

In 1932 s'a importat	44.252	tone	cocs	metalurgic
" 1934 " "	40.507	"	"	"
" 1935 " "	38.483	"	"	"
" 1936 " "	38.578	"	"	"
" 1937 trim. I "	22.599	"	"	"

În 1937 Soc. Petroșani (5) cearcă să pue la punct instalația sa de cocserie de o capacitate care alături de cea dela Anina să acopere cerințele interne.

3. *Antracitul* conține 90-95% C cu o capacitate calorică de 9000-9200 cal/kg. În țară este semnalat în numeroase locuri dar se exploatează la Coasta Rea (Schela, Gorj), la Secul (Caraș) și Baia Nouă (Severin). Exploatarea au evoluat astfel:

Anii	Prod. în tone	Indici	Anii	Prod. în tone	Indici
1921	392	100	1934	18.010	4.594
1923	152	39	1935	17.207	4.390
1932	12.245	3.124	1936	3.708	946

Între anii 1925-1931 exploatarea au sistat, reluându-se cu însușită amploare în 1932. Se importă următoarele cantități de antracit în tone: În anul 1932: 232 tone 1934: 2006 t., 1936: 224 tone.

II. *Ferul*. Principalele minerale avantajoase pentru extracția directă a ferului sunt: Magnetitul Fe_3O_4 conținând 72% fer; Hematita Fe_2O_3 cu 70% fer; Limonitul $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ cu conținut în fer variabil și Sideritul FeCO_3 cu 48% fer. Rezervele totale de fer (6) sunt evaluate la 26.000.000 t pentru localitățile: Goldari, Teliu, Dognecea, Vașcău, Lueta, Blazna (Maramureș) și Comarzan.

Exploatarea în mare se fac la Ocna de fer (6) pentru magnetit și hematită cu un conținut de 60-75% fer, aici se crede că există rezerve de cca 20.000.000 t. La Moravița se extrage magnetit, iar la Delinești hematită. În ritmul exploatarea actuale rezervele ar mai ajunge încă 50 ani. Producția totală a minelor dela Bocșa și Moravița atinge cca. 10.000 t. lunar.

Dau mai jos pe ani și tone mersul exploatarea minereurilor de fer și în paralel fabricarea fontei și oțelului.

Anii	Fontă (4) în tone	Indici	Oțel (4) în tone	Indici	Minereu (4) în tone	Indici
1921	33.362	100	—	—	91.109	100
1923	39.102	117	—	—	99.293	109
1925	64.273	192	37.706	100	107.384	118
1927	63.498	190	116.707	309	97.138	107
1929	72.346	216	49.383	130	90.014	99
1931	25.894	77	113.258	300	61.907	68
1933	2.024	6	144.766	386	13.831	15
1935	81.989	245	213.086	565	93.813	103
1936	97.096	291	220.082	586	108.549	119

Pentru a ne putea da sama de repartiția cuantumului prelucrării minereului pentru stat și particulari dau situația pe anul 1936 :

U z i n i	Fier brut în tone	Fontă în tone
Uzinele statului	51.031	24 746
Reșița	21.400	54.067
Titan, Nadrag, Calan	32.200	16.507
Vlahița	3.730	1.776

În ce privește fabricarea oțelului acum există în țară patru mari oțelării: Reșița, Vulcan și Schiel.

În afară de producția de mai sus s'a importat (6) în ultimii trei ani :

Felul produselor	1934	1935	1936	Ian.-Oct. 1937
Minereu de fer . .	—	33.164	64.999	77.344
Fier vechi, decheuri .	—	24 812	24 832	10.683
Fontă brută	—	4.020	3 183	3.543
Fier brut	—	40.883	88.978	77.373
Fier special	—	1.727	2.462	2.484
Fier semifabricat . .	—	61.030	91.919	50.134
Fier laminat	—	1.345	942	778
Iar pentru oțel:				
Oțel de creuzet . .	393	495	824	—
Oțel laminat . . .	851	1.364	1.221	—
Oțel, arcuri	886	1 078	861	—

Totalizînd ferul importat pentru anii 1935 și 1936 constatăm că în 1935 s'a importat 136.754 t. material feruginos adică 31% din cca. 450.000 care reprezenta consumul intern; în 1936 s'au importat 280.221 sau 40% din consumul total. În 1937 cîștigul de import au scăzut din cauza lipsei ferului de pe piața mondială. Cu toată restricția ce se pune de fiecare stat pentru a împiedica ieșirea acestui metal din țară, între 1 Ianuarie și 8 Iulie 1937 Uzinele statului dela Hunedoara au expediat Uzinelor Cărb. din Budapesta cca 510 t fontă albă. (5) Un furnal cu capacitatea de 42—45 t dintr-o dată începe să lucreze mai departe și după această dată pentru aceeași firmă Budapestană.

Cu toate că în Mai 1937 prețul ferului (5) s'a scumpit față de acela din Mai 1936 cu 126%, totuși întreprinderile noastre miniere erau încă departe de a satisface măcar consumul intern. În timpul unui război acest deficit va fi dureros resimțit.

Minereuri de fer ca: Pirita FeS_2 47% Fe, Pirotina FeS 56% Fe și Calcopirita CuFeS_2 31% Fe nu se pot utiliza direct la extracția fierului din cauza sulfurului în calcopirita și din cauza Cuprului. Din aceste motive ele se prăjesc în cuptoare speciale; SO_2 este captat și utilizat la fabricarea ac. sulfuric.

Pirita se găsește la Rodna Veche, Baia Mare, M-ții Apuseni, Dobrogea și Banat. Rezervele totale (6) se cifrează la 9.000.000 t. Cele mai bune pirite sînt la Rodna Veche. Ele conțin 43% S și au rezerve de 294.000 t. La Altîn Tepe în Dobrogea se găsește 430.000 t pirită și calcopirită cu 40% S.

Iată mersul exploatării acestor minereuri (4) :

Anii	Prod. în tone	Indici	Anii	Prod. în tone	Indici
1921	15.937	100	1931	24.784	156
1923	25 512	160	1933	12.112	76
1925	26.983	169	1934	4 001	65
1927	25.514	160	1935	9.855	62
1929	23.851	150	1936	9.999	63

III. *Sulfur* este utilizat pentru fabricarea ac. sulfuric. La noi a fost semnalat la Mureșenii Bîrgăului (Bistrița) și la Puturosul (Trei Scaune). Nu s'au făcut prospecțiuni. Din prăjirea piritelor s'au obținut următoarele cantități de sulf în tone (4).

In 1934 . . . 3.308 t. 1935 . . . 6.475 t. 1938 . . . 6.287 t.

Aceste cantități nu acopăr necesitățile acestor fabrici încît se importă restul de pirite.

IV. *Cuprul* se găsește la noi mai obișnuit sub formă de calcopirită. Au fost semnalate următoarele minerale de cupru: Calcopirita CuFeS_2 cu 34% Cu; Calcozina Cu_2S cu 80% Cu; Covelina CuS cu 66% Cu; Bornitul Cu_5FeS_4 cu 55% Cu; Tetraedritul $\text{R}_8\text{Sb}_2\text{S}_7$ în care R poate fi Cu, Ag, Fe, Zn, Hg. cu 15—55% Cu; Malachitul $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ cu 72% Cu; Azuritul $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ cu 55% Cu și Cupritul Cu_2O , cu 89% Cu. Din toate aceste minerale cea mai răspîdită e Calcopirita asociată în cantități foarte variabile cu pirita. La noi de fapt se găsesc pirite cu calcopirită. Pentru clasificarea zăcămintelor și rezervelor, acestea s'au împărțit în trei grupe: zăcăminte bogate: cu peste 4% Cu, zăcăminte sărace: cu peste 2% Cu și zăcămintele slabe care conțin sub 2% Cu.

Zăcămintele bogate sînt considerate cele din Dobrogea, Hăghimaș și Bihor. Ele constituiesc o rezervă de cca 2.830.000 t minereu ceea ce face aproximativ 140.000 t Cu.

Zăcămintele sărace sînt zăcămintele din Carpații meridionali și orientali cu 400.000 t rezervă de minereu sau 8—9.000 t de Cupru.

În grupa zăcămintele slabe sînt trecute acele din patruleterul aurifer, dela Baia Mare și dela Rodna Veche. Ele reprezintă o rezervă de cca 6.700.000 t minereu sau 10—12.000 t Cu.

Cu alte cuvinte la noi în țară dacă s'ar putea epuiza într'un timp relativ scurt toate rezervele de minereuri de Cu, abia am ajunge la o cantitate de cca 250.000 t Cu metalic.

Iată mersul exploatărilor minereului de cupru, în paralel cu extracțiile cuprului metalic:

Anii	Minereu ⁽⁴⁾ în tone	Indici	Cupru ⁽⁴⁾ în tone	Indici
1921	1.420	100	107.569	100
1923	220	15	70.823	66
1925	8.147	574	132.661	123
1927	4.990	351	215.455	200
1929	12.503	880	143.470	133
1931	544	38	174	—
1933	1.909	134	453.205	421
1935	1.241	87	212.948	188
1936	1.582	111	398.016	370

Neregularitatea indicilor de producție a minereurilor de cupru ne dovedește că această ramură a mineritului e foarte șubredă și fără continuitate. Discordanța dintre cantitățile de cupru metalic extras și aceea a minereului, ne dovedește că la noi în țară cuprul se recuperează cu ocazia exploatărilor minereurilor pentru aur și argint. Cu alte cuvinte la concentrația minereurilor de cupru în zăcămintele rentabilitatea e foarte slabă. Diferențele dintre cerere și ofertă sînt acoperite prin import.

S'au importat ⁵⁾ în anii: 1934 1935 1936

Minereuri	—	—	3 t.
Cupru neprelucrat	2 447 t.	3 395 t.	2 994 t.
Cupru vechi, resturi	1 561 t.	1 066 t.	353 t.

Pentru a acoperi nevoile înarmării s'a contractat aducerea a 1500 t de cupru metalic din Turcia (6). Problema cuprului rămîne deschisă pentru țara noastră.

V. *Zincul și Plumbul*. Datorită conjuncturii economice de acum, care influențează direct rentabilitatea unei exploatare, cit și modului de asociere a minereurilor noastre, nu se exploatează azi zăcămintele special pentru zinc ori plumb. Mineralele cele mai răspândite de zinc și plumb sînt blenda SZn (67% Zn) și galena SPb (87% Pb). Aceste metale se extrag din minereurile Auro-argentifere sau din cele argențifere. Regiunile de exploatare sînt M-ții Apuseni, Banat, Baia Mare, Baia Sprie, Capnic. Nu cunosc o evaluare a rezervelor de zinc și plumb.

Dau mai jos mersul exploatărilor pentru minereurile de plumb paralel cu extracția plumbului metalic și a glazurii de plumb în tone:

Anii	Miniu de (4) plumb	Plumb (4) metal	Indici	Glazura (4) de plumb	Indici
1921	33	368	100	213.350	—
1922	29	230	62	247.075	100
1923	15	403	109	152.650	62
1924	32	427	115	150.857	61
1925	—	489	132	106.325	43
1927	—	828	225	67.300	27
1929	16	565	153	106.441	43
1931	—	1.314	356	251.189	101
1932	31.818	1.938	526	293.885	119
1933	35.767	4.082	1108	697.516	282
1935	—	4.968	1349	1.132.450	458
1936	—	6.074	1650	1.342.988	629

În anii 1925-1928 și 1930-1931 nu s'au făcut exploatare pentru minereuri de plumb. Din 1932 au început să crească brusc din cauza argintului și aurului care erau obiectivul principal al exploatare. Din aceste motive din 1934 toate cantitățile au fost trecute la categoria minereurilor auro-argentifere. Din aceeași cauză cantitățile de plumb și glazură nu concordă cu cantitățile de minereuri de plumb exploatate.

Deoarece nu existau deloc uzine pentru extragerea zincului nu se exploatau minereuri de zinc. Din anul 1934 a început a fi recuperat și zincul din minereurile auro-argentifere după cum urmează:

În 1934 . . 3567 (100%). 1935 . . 4066 (114%). 1936 . . 4214 (118%).

Iată și cantitățile de plumb și zinc importate (5):

Felul produselor	1934	1935	1936
Plumb neprelucrat . .	156	51	30
Resturi de zinc vechi .	287	477	10
Zinc neprelucrat . . .	6249	3676	4202
Zinc granulat	4	1	4

În anul trecut s'a proiectat înființarea unei Uzine (5) pentru extragerea zincului cu o capacitate de 60 vagoane anual. Ea va funcționa la Ploiești.

VI. *Mercurul*. Se găsește sub formă de cinabru HgS cu 86% Hg. A fost semnalat în Apuseni, Baia Mare, și în Carpații Orientali. Se exploatează neregulat la Valea Dosului.

Iată mersul exploatare minereurilor de mercur paralel cu extracția mercurului metalic (4) în Kgr.:

Anii	Minereu	Indici	Metal	Indici
1923	200 000	100	—	—
1924	1.583.000	792	254	100
1925	4 273 000	2.137	3.257	1.282
1927	2.204.000	1.102	3 560	1.401
1928—1930	—	—	—	—
1931	50.000	25	250	98
1933	48.000	24	272	107
1935	150	—	13	5
1936	247	—	81	32

Această producție nu acoperă cerințele interne. Diferența s'a importat după cum urmează în Kgr.:

1934 . . . 75.000: 1935 . . . 57.000: 1936 . . . 156.000.

VII. *Aluminul* se găsește la noi în țară în cantitate mai mare sub formă de Bauxită în munții Bihorului pe o suprafață de cca 2400 Kmp. Rezervele (5) au fost evaluate la cca 22.000.000 t. Se găsește în cantitate mai mică la sud de Crișul Negru, Valea Arieșului și Sohodol. La Remetea pe riul Drăgan s'a instalat o uzină de 30 HP care extrage zilnic pînă la 10 vagoane minereu, care se exportă în Bulgaria, Ungaria și Elveția.

Iată mersul exploatării (4):

Anii	Prod. în tone	Indici	Anii	Prod. în tone	Indici
1922	3.737	100	1930	678	18
1923	4.162	111	1933	1 156	31
1926	745	20	1935	6 218	166
1928	653	17	1936	10.829	290

Germanii au extras în 1917 din Bihor 150.000 t. minereu de aluminiu (6). Consumul intern (5) a aluminiului a evoluat astfel:

Felul prod. importate	1934	1935	1936	Sem. I 1937
Aluminiu (5)	1.458	1.468	2.039	789
„ neprelucrat	58	67	91	1 118
„ granulat	2	—	2	6
„ semifabricate (6)	?	?	27.990	62.690

În 1937 s'a proiectat construirea la Tirgoviște (5) a unei uzine pentru extracția aluminiului cu o capacitate de 3600 t. anual. Această problemă (6) este foarte dificilă deoarece o astfel de uzină necesită investițiuni de 700-900 milioane lei, iar rentabilitatea ei este asigurată pentru o producție care să depășească 20.000 tone anual.

VIII. *Manganul* se găsește sub formă de Piroluzită MnO_2 cu 62% Mn; Psilomelan; Hausmanit Mn_3O_4 cu 35% Mn; Braunit Mn_2O_3 , cu 69.6% Mn; Manganit $MnHO_2$, cu 62.5% Mn; Rodonit $MnSiO_3$ cu 49.4% Mn și Rodocrozit $MnCO_3$ cu 47.8% Mn. Se găsește la Mașca și Răzvan în Maramureș, în Banat, Munții Lăpușului, Zărandului, Codrului, la Poiana Ruscă și în Carpații Meridionali. În Carpații Orientali se exploatează în Bucovina la Șarul Dornei, Jacobeni și Dorna.

În 1917-1918 s'au extras din Munții Lăpușului cca 32.000 tone Mangan. Este utilizat sub formă de ferro-mangan la fabricarea oțelurilor rezistente.

Exploatarea minereurilor de mangan (4) a evoluat astfel:

Anii	Prod. în tone	Indici	Anii	Prod. în tone	Indici
1921	3.305	100	1931	18.787	619
1923	12.511	412	1933	2.774	91
1925	5 368	177	1934	12 057	397
1929	35 038	1.154	1936	33 856	1.116

IX. *Nichelul*. A fost semnalat în Banat la Oravița, Teregova, Ogradena și Dubova, la Ciugani, Zlatna, Vințul de Jos și Bădenii Ungureni. Se găsește sub formă de Annabergit $\text{Ni}_3\text{As}_2\text{O}_8 + 8 \text{H}_2\text{O}$, cu 14% Ni; Nichelina NiAs cu 44% Ni; Cloantit NiAs_2 cu 28% Ni. Se utilizează la fabricarea oțelurilor speciale. Nu se exploatează la noi în țară.

S'au importat următoarele cantități de Nichel (5). Nichel neprelucrat: 1934: 13 tone; 1935: 12 tone; 1936: 46 tone; Sem. I. 1937: 23 tone.

X. *Cromul*. La noi în țară se găsește în Banat sub formă de Cromit FeCr_2O_4 cu 46% Cr. Este utilizat la fabricarea oțelurilor speciale. A fost exploatat (4) în timpul războiului și în anii: 1922: 30 tone; 1923: 60 tone; 1929: 29 tone, în anul acesta s'a importat crom metalic cca. 2000 tone.

XI. *Titanul*. Se întrebuițează în cantități mici la prepararea oțelurilor speciale. A fost semnalat în aluviunile dela Pianul Romînesc sub formă de Rutil TiO_2 (61% TiO_2). Minereurile de crom din Banat conțin cca 6% TiO_2 ; iar bauxita din B.hor 1-3% TiO_2 .

XII. *Tungstenul* a fost semnalat la Baia Sprie, Băița (Bihor); la Ciclova Montană și Teregova (Banat).

XIII. *Molibden*. Se găsește sub o formă de Molibdenit MoS_2 cu 60% molibden și Wulfenit PbMoO_4 cu 26% Mo la Băița (Bihor) de unde a și fost exploatat de nemți în timpul războiului mondial. Lucrările de exploatare au fost părăsite. În anul 1936 s'au exploatat 45 tone de molibdenit. Nu știu dacă această exploatare a continuat și în 1937.

XIV. *Antimontu*. Se găsește sub formă de Stibină Sb_2S_3 cu 72% Sb, iar sub formă de Tetraedit (vezi Cupru) cu 20-24% Sb. Sub prima formă se găsește la Baia Mare, Baia Sprie, Capnic, Rodna, Cîrlibaba. Ca Tetraedit se găsește în Apuseni. Mai ales din acest din urmă mineral care se exploatează pentru argint și cupru se poate extrage și antimoniul: lată extracția pe ani în kgr.:

Anii	Prod. în kgr.	Indici
1921	3557	100
1924	6459	181
1925	7280	204
1927	8689	244

Extracția s'a făcut discontinu și numai în anii arătați, totuși progresînd.

XV. *Potasiu*. Se exploatează sub formă de sare de mare din lacurile sărate din sudul Basarabiei. Statul posedă o astfel de exploatare la Tuzla pe lacul Șabolat. Se mai poate extrage din apele sărate care se găsesc în zăcămintele petrolifere. Aceste ape conțin uneori pînă la 16 gr. potasiu la litru. Apele limanurilor Basarabene conțin pînă la 0.4% gr. Această sare marină este utilizată la săratul peștelui.

XVI. *Dolomitul*. Se găsește din abundență în sudul Bucovinei la Cîrlibaba, la confluența Cibăului cu Bistrița, pe Valea Rusaei; iar în Transilvania la Rodna Veche, Baia de Arieș și în multe alte părți. Este întrebuițată la prepararea căptușelilor convertisoarelor Thomas. În 1936 s'au exploatat 10.454 tone de dolomit din care 1/3 din Bucovina și 2/3 din Transilvania.

XVII. *Grafitul*. Se găsește în Pasul Vulcan, la Baia de fer, Rodna-Veche, și la Comana. Este utilizat la facerea creuzetelor care să reziste la temperaturi înalte în turnătorii. În timpul ocupației germanii au prospectat unele din aceste aflorimente. Nu s'au făcut exploatare.

Din cele înșirate pînă acum se vede că în subsolul țării noastre se găsesc marea majoritate a materiilor prime necesare pentru organizarea potențialului nostru național de război. Numai cîteva din aceste materii prime reușesc să acopere cerințele pieții noastre interne.

La noi în țară nu a existat o politică a materiilor prime. Totul s'a dezvoltat desorientat. Statul nu a căutat să dirijeze eficace această producție de materii prime spre a obține o dezvoltare armonioasă cu industria și cerințele interne. În ultimul an principalele Uzine metalurgice au utilizat materii prime indigene după cum urmează:

Uzinele	Reșița lucrează cu	100% material indigen
" Ferdinand "	" 80% "	" "
" Nagrag "	" 30% "	" "
" Titan "	" 10% "	" "
" Ind. Sârmei "	" 10% "	" "

În industria aviatică se importă aproximativ 70% din materiile brute. Prin prelucrarea unor anumite fracțiuni de distilare a petrolului se obține cca 9000 t toluen. Aceasta la rîndul său e întrebuințat la fabricarea trinitrotoluenului. Fabricile de munițiuni ar necesita cca 24.000 t toluen anual.

Fabricile de explozibili dela Dudești și din Făgăraș utilizează salpetru ca materie primă. Salpetrul este importat din Germania sau Norvegia. Ce vom face în timp de război?

În ce privește munițiunile, quantumul de materii prime se calculează pe baza unui coeficient de explozivi. În timpul războiului mondial acest coeficient a fost sporit pînă la 12.000 t lunar. Materiile prime necesare pentru executarea munițiunilor corespunzătoare acestui coeficient cere un efort considerabil pe care nici industria nici producția noastră de materii prime nu l-ar putea suporta. Din aceste motive noi suntem siliți să adoptăm un plan de pregătire riguros executat din timp de pace spre a putea compensa această deficiență. Timp de 2-3 ani ne vom pregăti pentru materialele care se pot păstra nealterate, pentru un coeficient de cca 2000 t pulbere lunar. Să ne edificăm care sînt cerințele unui asemenea coeficient. Dau mai jos pe trei coloane cantitățile de oțel, plumb, cupru, zinc și aluminiu comparativ cu producția noastră și importul acestor metale în tone, lunar și pe anul 1936.

Materii prime	Cota armament. și munițiuni	Producția națională	Import	Total consum intern	Totalul necesar
Oțel	45.000	20.833	241	21 074	66.074
Plumb	1.200	506	3	509	1.709
Cupru	2.400	33	375	408	2.808
Zinc	1.900	351	355	706	2.606
Aluminiu	350	170	2 500	2.670	3.020

Din cele de mai sus se desprinde clar situația producției naționale de materii prime și cerințele fabricării armamentului și munițiunilor pentru un coeficient de 2000 tone pulbere lunar. Chiar dacă prin absurd am admite că pentru un timp foarte scurt s'ar reduce la zero consumul intern, nici unul din metalele de mai sus nu ar satisface cerințele înarmării noastre.

Se impune alcătuirea unui consiliu tehnic care are a se ocupa de stimularea și protecția materiei prime naționale, pentru fiecare din ele după consumul intern

și cerințele unei bune înarmări. Industriile noastre să fie obligate ca măcar pentru comenzi de înzestrare a armatei să utilizeze sută la sută material românesc.

Acest consiliu va avea în subordine comitete de specialiști pe centre universitare și corpuri de armată. Aceste comitete vor inventaria, evalua rezervele și chiar prospecta toate bogățiile exploatabile a subsolului nostru. Fiecare din societățile miniere azi în funcțiune să fie obligate a trimite comitetului respectiv situația la zi și proiectele de exploatare pentru viitor, astfel organizate spre a garanta un maxim al punctelor de atac în cazul unei exploatare forțate cerută de împrejurări. Numai așa se va putea ști pe ce contăm în fiecare regiune a țării, căci se poate ca unele din regiunile cu anumite exploatare miniere să cadă în mâinile inamicului. În acest caz se nu vom avea debușee noi gata în orice moment de deschis, ne vom dezechilibra potențialul de război și deci rezistența noastră va fi mult micșorată.

Închei această conferință cu speranța că cei care sînt chemați să vegheze la siguranța țării noastre se vor seziza și vor întreprinde tot ceea ce e necesar pentru a sistematiza politica materiilor prime naționale. Trebuie să se înțeleagă că o industrie nu de dezvoltată nu valorează nimic, dacă baza de plecare reprezentată prin materiile prime, nu este suficient asigurată.

BIBLIOGRAFIE

1. RODEANU, Gen. — Apărarea noastră națională și bogățiile Romîniei întregite. Timișoara 1936.
2. DR. ALEX. DOBRE, Col. — Industria țării și apărarea națională sub aspectul crizei. Ann. Economice și Statistice XX, 3-5 pg. 173, 1937.
3. MORDACO, Gen. — Învățăminte din 1914. Traducere de Cpt. Matei. Constanța, 1936.
4. STATISTICA INDUSTRIEI EXTRACTIVE, pg. 10-14, 17-19, București 1938.
5. FINANȚE ȘI INDUSTRIE, an. V, pg. 98, 375, 483, 945, 1139 și 1420 Buc. 1937.
6. FINANȚE ȘI INDUSTRIE, an VI, pg. 171, 231, 407, 408, 1024, 1302, Buc 1938.
7. FIȘINESCU TH. — Pentru cît mai are petrol țara Romînească? Bul. I. R. E. An. V, vol. II, pag. 511-525, Buc. 1937.
8. MACOVEI GH. — Din perspectivele industriei noastre de petrol. Bul. I. R. E. An. V, vol. II pg. 526-534 Buc. 1937.

Note și informațiuni

100 ani dela întemeierea teoriei celulare a structurii organismelor. — În anul 1839, naturalistul *Theodoro Schwann* publică lucrarea: «*Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen*», Berlin. Această lucrare, care puneaze bazele definitive ale teoriei celulare a structurii ființelor viețuitoare, face parte din acele puține lucrări epocale care se pot compara cu țîșnirea la lumină a unei pînze subterane de apă, sub formă de nori înviorători.

Desigur pentru a continua comparația, după cum această pînză de apă ascunsă este datorită picăturilor de ploaie care s'au infiltrat discret în porozitățile scoarței pămîntului, în urma ploilor căzute, tot așa am putea spune că opera lui *Schwann* este cristalizarea, în atmosfera genială a creierului său, a unui mănunchi de idei și de fapte adunate cu multă trudă, de multeori cu multă ingeniozitate, de o întreagă pleadă de predecesori.

În adevăr, concepția structurii celulare a organismelor fusese emisă înaintea lui *Schwann* de către *Dutrochet*, la 1837, în lucrarea sa: «*L'histoire anatomique et physiologique des végétaux et des animaux*» în care acest autor spunea în mod hotărît: „În țesuturile organizate ale vegetalelor, totul derivă din celulă și observația ne dovedește ca este acelaș lucru și la animale. Toate țesuturile, toate organele, nu sînt probabil decît celule deosebit modificate”. Nu s'ar putea schimba astăzi un

singur cuvînt din aceste afirmații, care cuprind de fapt mai mult adevăr chiar decît unele din concepțiile adoptate ceva mai tîrziu de *Schwann*.

Fără îndoială că *Dutrochet* ținuse seamă de un fapt foarte important, descoperit cu cîțiva ani mai înainte de *Dumortier* (1832) și *Meyen* (1833), și anume diviziunea celulei. Acești doi autori susțineau că celulele nu pot lua naștere în mod spontan, din substanțe moarte, ci numai din celule vii care existau mai înainte. Faptul era limpede și bine pus, dar tradiția era mai puternică. Ideea generației spontanee și formarea heterogenului din homogen, susținută în mod strălucit chiar de naturaliști distinși ca *Wolff*, avea încă tăria de a înăbuși mijirea adevărului. *Schwann*, urmînd pe contemporanul său *Schleiden*, nu a putut să nu adopte această idee în formarea celulelor, necontrolînd în mod serios faptele aduse de *Dumortier* și *Meyen*. El socotea anume ca și *Schleiden*, că celulele iau naștere prin formație nouă într'un fel de substanță formatoare—care nu este vie—, numită de ei *citoblastem* sau *blastem* formator de celule.

Cînd se vorbește de *Schwann* ca întemeietor al teoriei celulare la animale, nu se poate lăsa la o parte numele lui *Schleiden* care prin lucrarea sa: «*Beiträge zur Phytogenesis*» (1838), a pus bazele teoriei celulare la vegetale, cu atît mai mult că *Schwann* s'a inspirat dela *Schleiden*.

Așa dar, deși lucrări în acest domeniu existau și mai 'nainte, acești doi autori sunt considerați ca părinți ai teoriei celulare a structurii viețuitoarelor. Aceasta datorită faptului că ei au sistematizat observațiile lor și cele făcute pînă atunci de alții și, folosindu-le cu iscusință, au adincit această concepție stabilind-o definitiv în liniile ei mari.

Trebuie să subliniem că meritul cel mare al lui *Schwann* a fost acela de a arăta că structura și modul de creștere al ființelor animale este acelaș ca al vegetalelor și că deci, la baza întregii lumi viețuitoare stau aceleași principii.

Schwann, în studiul structurii organelor, a dat o mare importanță formei celulelor și a raporturilor morfologice dintre ele. Pe baza acestora el a stabilit cinci categorii de țesuturi la animale:

1. Țesuturi constituite din celule de sine stătătoare (celule sanguine și limfatice).
2. Țesuturi constituite din celule de sine stătătoare, însă reunite împreună (Ex. epitelile, unghiile, penele, cristalinul).
3. Țesuturi în care pereții celulari sunt contopiți între ei, sau reuiniți prin substanțe intercelulare (cartilaj, os, dinți).
4. Țesuturi formate din fibre prin faptul că celulele se alungesc în formă de fibre, iar acestea se string în fascicule (țesutul tendinos, etc).
5. Țesuturi constituite din celule ai căror pereți, sau ale căror cavități se reunesc unele cu altele (mușchi, nervi, vase capilare).

Bineînțeles, această calsificare a țesuturilor a suferit în urmă modificările și îndreptările necesare, în legătură cu noile descoperiri ale epocelor ce au urmat; însă ea avea baze mult mai solide decît clasificările precedente, de ex. a lui *Bichat* (1801), care descrisese 21 categorii de țesuturi, fără însă să se întemeieze pe observații microscopice.

Asupra celulei însăși, *Schwann* avea concepții generale care n'au suferit desmîntire în decursul veacului ce s'a scurs dela el și pînă astăzi. El socotea celula ca „un individ, un tot de sine stătător“, iar viața organismelor multicelulare nu era decît rezultanta vieții tuturor celulelor din organism: „Fenomenele de viață ale unei celule se repetă în totul sau în parte în toate celelalte celule“. Și mai departe, spune *Schwann*: „acești indivizi nu stau unii lîngă alții ca simple îngrămădiri, ci ei acționează unul asupra altuia în mod încă necunoscut, așa fel încît constituiesc un tot armonic“.

Pentru anatomistii și fiziologii de astăzi, această concepție asupra structurii organismelor constituie noțiunea elementară care în niciun caz nu poate fi schimbată, ci din contra a căpătat și capătă încă o lumină din ce în ce mai vie, datorită faptelor noi care vin mereu în sprijinul ei.

Descoperirea lui *Schleiden* și *Schwann* a dat un avînt extraordinar cercetărilor microscopice asupra celulei, cercetări care continuă cu aceiași sîrguință și în zilele noastre. În această perioadă s'au pus punctele cardinale ale concepțiilor biologice asupra celulei (pe vremea lui *Schleiden* și *Schwann* se cunoșteau prea puține lucruri asupra ei) puncte dintre care voi aminti aici pe cele mai de seamă.

În primul rînd, pînă la 1850 s'a stabilit definitiv că celulele iau naștere una din alta prin înmulțire și numai așa. În acest an *Virchow* a spus: «*Omnis cellula e*

celulei, fapt de importanță fundamentală, căci toate studiile de analiză a celulei nu-și puteau avea rostul dacă aceasta nu ar fi fost privită ca o individualitate permanentă.

Mai târziu, odată cu diviziunea indirectă a nucleului, s'au descoperit și cromozomii. În privința acestora, cercetările lui *Rabl*, *Boveri*, *van Beneden* și alții au stabilit trei fapte importante: constanța numerică, diviziunea în lung, individualitatea lor, celace a dus la ideea, care s'a arătat atât de fructuoasă, că fenomenele ereditare se au locul în cromozomi. Descoperirea diviziunii heterotipice, adică cu reducerea numerică a cromozomilor la jumătate, în maturarea celulelor sexuale, precum și experiențele de hibridație începute cam în aceeași epocă de *Naudin* și de *Mendel*, au întărit și au aprofundat această concepție asupra eredității. Descoperirea lui *Hertwig* asupra semnificației reale a fecundației a contribuit și ea la cimentarea definitivă a acestei concepții.

În celace privește structura citoplasmei lucrurile au mers mai greu și reale progrese nu s'au făcut decât după 1898. Studiul nucleului a precedat pe acel al citoplasmei din cauză că structurile nucleului se păstrau mai bine prin tehnicile aplicate atunci și procesele regulate ale cromozomilor în timpul mitozei dădeau posibilități mai largi de interpretare a fenomenelor.

Pe vremea lui *Schleiden* și *Schwann* nu se știa aproape nimic asupra citoplasmei. *Dujardin* descoperise, în 1835, proprietățile fizice fundamentale ale citoplasmei când el i-a spus „sacord”. *Purkinje* și *Hugo von Mohl* îi dau mai târziu numele de „protoplasma”, *Nägeli* arată apoi că este vorba de o substanță albuminoidă și în sfârșit, la 1850 *Ferdinand Cohn* stabilește definitiv că protoplasma are aceleași proprietăți la toate ființele animale și vegetale.

Odată cu aplicarea tehnicilor de fixare și colorare a țesuturilor s'au descris (după 1865) în citoplasmă, diferite structuri, care s'au dovedit apoi a fi cel puțin în cea mai mare parte dacă nu complet, false. Din această cauză, chiar descoperirea mitocondriilor de către *Altmann* și *Flemming* nu mai era luată în considerare.

În 1898 *Benda*, și mai târziu *Meves* (1908), prin tehnici mai bune, descriu din nou mitocondriile care de atunci sînt considerate ca un constituant permanent al citoplasmei.

Tot în acea vreme, prin tehnici deosebite, *Golgi* (1898), apoi *Pensa* (1899) și *Kopsch* (1902), descriu un alt constituant important al citoplasmei și anume *aparatul Golgi*.

În 1908, *Mayer* și *Schaffer* introduc în studiul celulei tehnica cercetărilor pe corp negru și arată că citoplasma face parte din grupa substanțelor coloidale și că ea nu posedă nici o structură microscopică în afară de mitocondrii, de formațiunile caracteristice celulelor diferențiate cum ar fi miofibrilele și de incluziuni moarte datorate activității celulare.

După această serie de descoperiri fundamentale în care elementele morfologice ale celulei sînt date la lumină în liniile lor mari, se trece la studii de detaliu și deci la aprofundarea noțiunilor existente pentru lămurirea fenomenelor de viață din celule. — tendința este — încadrarea lor în sistemul concepțiilor fizico-chimice actuale. S'au perfecționat tehnicile de cercetări, s'a pășit la cercetări experimentale cum sînt tehnica de microdisecții introdusă de *Chambers*, tehnica culturilor de țesuturi aplicată prima dată de *Harrison* și perfecționată apoi de *Carrel* (1910—1912), tehnica ultracentrifugării, a grefelor, etc. Se dezvoltă din ce în ce studiul fizico-chimic al celulei, fie prin reacții colorale, fie prin ultramicroscopie, polarizare și microspectroscopie, fie prin tehnici complicate de fotografie cu ajutorul radiațiilor de diferite lungimi de undă.

Culturile de țesuturi „in vitro” au îngăduit o sumă de studii citofiziologice de cea mai mare importanță, după cum asemenea studii au fost posibile, prin tehnici mai puțin pretențioase, asupra protozoarelor și asupra celulelor libere din organism (globule de singe, spermatozoizi).

În ultimul timp s'a trecut la studiul cauzalității fenomenelor biologice din celule și raportul lor cu factorii externi, chimici (diferite feluri de ioni) sau fizici (lumină, temperatură, electricitate, etc.). Mai ales se urmărește lămurirea diviziunii celulare, acest proces fundamental al genezei organismelor, în unele cazuri consecință directă a nutriției și a creșterii, alteleori consecință altor cauze mai ascunse, cum ar fi în segmentația oului sau în celulele canceroase. În cadrul experimental al acestor cercetări este suficient să menționăm studiile lui *Bêlar* și apoi ale lui *Gurwitsch* (radiații mitogenetice).

Iată, în câteva cuvinte, enumerarea unora din progresele mari care s'au făcut în primul secol de studii în atmosfera concepției celulare a structurii organismelor. S'a făcut mult, deși se pare că drumul pînă la adevărul absolut este încă lung și din ce în ce mai greu de parcurs. În orice caz, faptele stabilite pînă acum au depășit cu mult simpla demonstrație a unui fapt care, pentru Schwann, era o ipoteză genială: că celula este unitatea fundamentală a vieții și că manifestările unui individ mult celular nu sînt decît suma reacțiilor armonice ale totalității indivizilor celule din organism.

Este adevărat că există o teorie făurită și susținută în deosebi de *Heidenhein* la începutul acestui secol și anume că celulele nu ar reprezenta ultima treaptă a individualității materiei vii ci, după cum organismul este constituit din celule, tot așa o celulă este destul de complexă pentruca să trebuiască să presupunem că și ea, la rîndul ei, este constituită din unități vii mai mici. Creșterea și diviziunea celulei nu s'ar putea explica decît pe temeiul acestor particule care sînt foarte mici (submicroscopice) și cărora el le dă numele de *protomere*. *Jacobi*, și unii colaboratori ai săi, aduc unele observații prețioase în sprijinul acestei teorii.

Totuși, cum spun unii autori, admitînd existența acestor protomere, nu li se poate admite și puțința unei vieți independente, căci particule de substanță vie mai mici decît o celulă completă, nu pot trăi și nu se pot înmulți în afara organismului. Prin urmare tot celula rămîne acel minim și acel întreg de substanță vie, acea cămăruță misterioasă, în care se petrec fenomenele vitale și în care pînă acum lumină deplină nu s'a putut face.

Teoria celulară a structurii organismelor a avut un răsunset incomparabil în științele biologice și medicale. Am putea spune că adevăratul orizont al biologiei s'a deschis odată cu teoria celulară. Este deajuns să ne gîndim, pentru a ne da seamă de aceasta, la înțelesul pe care-l are astăzi dezvoltarea ontogenetică (embri-onară) a ființelor mult celulare și la înțelesul pe care-l avea înainte de stabilirea acestei teorii, cînd se susținea că organele unui embrion se formează spontan din o substanță moartă! Sau la lumina vie (deși nebuloasă încă în multe puncte) pe care o aruncă concepția celulară asupra fenomenelor de ereditate și variabilitate a individului. Specia însăși, elementul de bază al studiilor zoologice, este pusă într'o lumină cu totul nouă și promițătoare de progres.

Nu mai vorbim de domeniul Fiziologiei, ale cărei studii se bazează astăzi, în majoritate, tocmai pe reacțiile țesuturilor și deci ale celulelor care le constituiesc; iar acolo unde nu s'a pătruns încă pînă la celulă, aceasta este datorită lipsei, pentru moment, a tehnicii potrivite.

În legătură strînsă cu fiziologia normală, vine fiziologia anormală, patologică, am putea spune disarmonică, domeniu medical, unde studiul microscopic al țesuturilor atinse de anomalii au dat și dau încă lămuriri noi, nesperate multă vreme mai înainte. Problema mare a cancerului își va căpăta cu siguranță lămurirea tot pe calea studiului microscopic și experimental al celulelor normale și canceroase, fie prin tehnica culturilor de țesuturi, fie prin tehnica grefelor sau poate altă tehnică ce va fi descoperită de aici înainte.

Căci, este locul s'o spunem aici, progresul în cercetările microscopiei și în general ale celulei și ale țesuturilor, a fost totdeauna condiționat de perfecționarea mijloacelor tehnice. Nu ne îndoim că avîntul extraordinar pe care l-a luat astăzi dezvoltarea și perfecționarea mijloacelor tehnice, va duce și la perfecționarea progresivă a mijloacelor tehnice de cercetare în serviciul chestiunilor biologice puse de celulă. Este adevărat că cercetările de această natură sînt printre cele mai grele și mai oboșitoare din domeniul cercetărilor biologice și, pentru a lucra cu succes, se cere atît o energie viguroasă, tinerească, cit și acea perseverență neslăbită pe care o poate da numai curiozitatea științifică și idealul pus în serviciul științei. Cei ce se dedică unor asemenea studii nu sînt mulți, dar trecutul ne arată că s'au găsit mereu destui pentruca dintre ei și se ivească din cînd în cînd spirite geniale care să stimuleze și să garanteze progresul acestei ramuri biologice.

În cele spuse mai sus, nu am căutat decît să amintesc împlinirea a 100 ani dela întemeierea teoriei celulare a structurii organismelor și să dau o slabă imagine a progresului realizat mulțumită acestei teorii. Am dat deasemeni câteva exmple de importanța mare pe care o are, atît din punct de vedere practic cit și din punct de vedere teoretic, întemeierea acestei teorii care, desigur, a germinat și a prins rădăcini treptat, treptat, dela descoperirea microscopului, dar care și-a căpătat expresia definitivă prin cercetările lui *Schleiden* și *Schwann* și mai ales datorită spiritului pătrunzător și genial al acestuia din urmă, al lui *Theodoro Schwann*.

Considerații fitosociologice și biologice asupra unei noi turbării din jud. Cimpulung, Bucovina. — În vara anului 1937, făcînd o excursie botanică în comuna Șaru-Dornei, am găsit o mică turbărie necunoscută încă pentru flora Romîniei. Suprafața acestei turbării, situată pe malul drept al pîrăului Neagra, în dreptul feres-tului Stratulă, este de circa 5 ha. Privită în general, această turbărie nu este decît o mlaștină ce face parte din grupul bahnelor și care a luat naștere într-o depresiune unde apele de infiltrație se scurg foarte greu. Mlaștina aceasta este foarte bogată în zăcămint turbos, care reprezintă un strat de separație între plantele care trăiesc la suprafața lui și pinza acvatică ce se găsește dedesubtul acestui strat permanent alimentată de izvoare subterane.

Constituția tipică a acestei bahnne o formează mușchiul *Sphagnum* pe unele locuri amestecat cu *Polytrichum commune* și mai ales cu *Vaccinium Oxycoccus* L. În general flora care se dezvoltă la suprafața acestei turbării este mult mai bogată în specii decît „Tinovul Mare” din Neagra Șarului, care este o turbărie propriu-zisă.

Printre plantele mai caracteristice găsite în vara anului 1937 și 1938 cităm :

Sphagnum Cymbifolium Ehrh (?); *Vaccinium oxycoccus* L. (Răchițele); *Eriophorum vaginatum* L.; *Vaccinium Vitis idaea* L. (Merisor); *Carex limosa* și alte specii; *Juncus effusus* L.; *Epilobium palustre* L. (Sburătoare); *Parnassia palustris* L.; *Potentilla Tormentilla* Sibth; *Drosera rotundifolia* L.; *Rumex acetosella* L.; *Menyanthes trifoliata* L.; *Calla palustris* L.; *Galium uliginosum* L.; *Geum palustre* L.; *Equisetum limosum* L.; *Vaccinium Myrtillus* L.; *Geranium palustre* L.; *Deschampsia caespitosa* B. P.; *Agrostis alba* L.; *Nardus stricta* L. (?); *Salix Pentandra* L.; *Salix aurita* L. (?); *Betula pubescens* Ehrh.; *Betula pendula* L.; *Populus tremula* L.

Pinus silvestris, care se găsește în Tinovul Mare aici lipsește.

Deasemenea lipsește și *Andromeda polifolia* L.

Prezența plantelor *Menyanthes trifoliata*, *Calla palustris* și *Parnassia palustris* etc. care deasemenea nu se găsesc în Tinovul Mare, dar găsite și citate de M. Gujuleac în Tinoavele din Poiana Ștampei. Ne arată în mod neîndoios că această turbărie lipsită de *Pinus* se deosebește de Tinovul Mare atît din punctul de vedere al structurii, a reacției mediului cît și a raportului cantitativ de substanțe minerale.

Și în această mlaștină turboasă, ca în toate de acest fel, din cauza acidității, cantității mari de umezeală etc., s'au creat condițiuni speciale de dezvoltare pentru plante. Dezvoltarea lor, structura morfologică externă și internă, sunt strîns legate de reacția solului, de bogăția în substanțe minerale necesară nutriției lor, de cantitatea de umezeală și variațiile climaterice. Așa *Drosera rotundifolia* (Roua cerului) plantă caracteristică turbăriilor și adaptată la carnivorie, trăiește la suprafața mușchiului *Sphagnum* viu și unde lumina solară este relativ intensă.

Acolo unde lipsește mușchiul *Sphagnum* lipsește și *Drosera*. Viața acestei plante deci este strîns legată de a mușchiului *Sphagnum*.

Amestecat cu *Sphagnum* și *Drosera* mai este și *Vaccinium oxycoccus*. Pe cînd *Drosera* trăiește la suprafața *Sphagnetului* viu și are un sistem radical redus, *Vaccinium oxycoccus* își înfige rădăcinile adînc în stratul turbos negru și mort format din *Sphagnum*, rizomii de *Carex* și *Eriophorum* mai bogat în substanțe minerale, dar mai acid.

Am putea spune că plantele din această turbărie sunt astfel adaptate, încît pot suporta o anumită concentrație a mediului, adaptare ce depinde de specia de plantă. Concentrația mediului merge crescînd dela suprafață spre interior. Plantele din turbărie au o proprietate selectivă față de Ph: ele nu și înfig rădăcinile decît pînă acolo unde reacția mediului le favorizează și le permite dezvoltarea, și unde își pot găsi o cantitate suficientă de săruri minerale. Acest lucru se observă foarte bine unde umezeala e foarte mare. *Sphagnum* aici formează un strat continuu care are pe el și colo indivizi de *Drosera rotundifolia*, pe cînd *Vaccinium oxycoccus*, *Eriophorum* *Carex*, lipsește cu desăvîrșire.

Aici reacția mediului e mai puțin acidă, iar cantitatea de săruri minerale este mult mai redusă. Spre periferie, unde umezeala este mai redusă cantitativ, sărurile minerale sînt în cantitate mai mare, *Sphagnum* își încetează evoluția tipică, cedînd locul la Graminee, *Carex* și *Eriophorum*.

Tot la marginea turbăriei se mai întîlnesc și *Ligularia sibirica* L., *Lysimachia vulgaris*, Graminee s. a.

Majoritatea plantelor din această turbărie au un xerofitizm foarte accentuat și se poate vedea prin formarea unui strat ceros la suprafața frunzelor de *Vaccinium oxycoccus*, *Vaccinium Vitis idaea*, *Vaccinium Myrtillus* prin cutinizarea epidermei

frunzelor, prin prezența de papile dermice în jurul stomatelor la frunzele de Ciperacee și tulpinele de Graminee, prin îngroșarea frunzelor la Ericacee, pipernicirea tulpinelor de *Salix*, *Betula*. Aceste caractere sunt în strînsă legătură cu un sol uscat fiziologicește, adică sărac în substanțe minerale, și a luat naștere în vederea micșorării transpirației.

H. CHIRILEI

Sistemul inter-renal, suprarenal și corpusculii lui Stannius, în seria vertebratelor.—Printre principalele glande cu secreție internă, se numără, la vertebratele superioare, glanda suprarenală, numită astfel din pricina așezării sale în vecinătatea rinichiului, cu care nu are de altfel legături genetice sau organice. Această glandă este un organ dublu, fiindcă partea sa corticală are origină mezodermică, derivînd din epiteliul celomic și produce o secreție, care, după experiențele din vreme, are o mare influență asupra creșterii somatice; pe cînd parte medulară provine din ectoderm și anume din țesutul nediferențiat ce va da ganglionii simpatici și secretă o substanță numită adrenalina, cu rol vasoconstrictor.

La vertebratele inferioare cele două formațiuni de origină diferită rămîn separate, partea corticală alcătuiind *sistemul interrenal*, iar cea medulară, *sistemul suprarenal*.

La *Cyclostomi*, sistemul interrenal se găsește în special în țesutul gras dintre aortă și vinele cardinale posterioare, întinzîndu-se în tot lungul corpului, din regiunea cefalică, pînă în regiunea codală. Sistemul suprarenal, reprezentat, ca la toate vertebratele, prin țesut epitelial cu caracter de celule cromafine, urmează drumul arterelor parietale, al vinelor cardinale posterioare și al arterei caudale.

La *Selacieni*, interrenalele sunt așezate, perechi sau neperechi, în regiunea posterioară a mezonefrosului și sunt formate din tubi sau cordoane de celule, de culoare gălbui; suprarenalele se găsesc în tot lungul corpului, în legătură strînsă cu ganglionii simpatici.

La *Teleosteenii* studiul acestor glande a fost pus la punct de profesorul Ercole Giacomini, la Universitatea din Bologna, confirmat astăzi de majoritatea cercetătorilor. În acest grup, sistemul interrenal se găsește sub formă de lobuli, trabecule sau cordoane epiteliale, numai în regiunea anterioară a mezonefrosului și în rinichiul cefalic, în jurul vinei cardinale posterioare. Acest sistem provine din două proliferații perechi ale epiteliului celomic (splanchnopleura) pe laturile rădăcinii mezenterului dorsal în locul unde arterele mezenterice se desprind din aortă,

adică imediat îndărătul pronefrosului. Acești muguri cresc, se divid și se distribuie în regiunea anterioară a vinei cardinale posterioare. Se pare că la *Teleosteenii* primitivi acest sistem avea o întindere mai mare și a suferit în urmă o reducere, în sens caudo-cranial, invers ca la *Selacieni*. Sistemul suprarenal al *Teleosteenilor*, diseminat în tot lungul rinichilor, dar mai ales în regiunea pronefrosului, lîngă sau în pereții vinelor cardinale poste- (în special cea dreaptă, care la *Teleosteenii* este de două ori mai largă decît cea stîngă); corpii suprarenali se găsesc ades la *Teleosteenii*, strîns alăturați de corpii interrenali, formînd în totul adevărate glande suprarenale, asemănătoare cu cele dela *Amfibii*, și comparabile cu cele dela *Vertebratele* superioare. La *Chondro-și Osteo-ganoizi*, tot după studiile lui Giacomini, interrenală are exact aceeași origine ca la *Teleosteenii* și se găsește răspîndită neregulat, sub formă de corpusculi alb-gălbui de formă neregulată, în tot lungul rinichiului și mai ales în regiunea anterioară, lîngă peretele v. card. post. La *Ganoizii* primitivi, interrenală pare să fi avut o extindere mai largă. Sistemul suprarenal (=sistem cromafin, sau feocrom) e răspîndit mai mult în lungul regiunii proximale a rinichilor și în special în pereții mediali ai v. card. post. și în lungul vinelor renale revehente, cîteodată și printre canaliculele urinare, în regiunea caudală a mezonefrosului (*Polyodon*), fără legături strînse cu interrenală. La *Amia* țesutul cromafin stă în strînse raporturi cu ganglionii simpatici. ca la *Amfibii* și *Teleosteenii*.

La *Amfibii*, și *Sauropside* cele două sisteme sunt împletite împreună neregulat, formînd glande suprarenale așezate sub formă de benzi de culoare galbenă-aurie, cîte una în lungul fiecărui rinichi.

La *Mamifere*, cele două sisteme se dispun regulat unul față de celălalt, substanța care corespunde interrenalăi dela *Vertebratele* inferioare constituind corticala, care înconjoară substanța medulară.

Corpusculii lui Stannius, numiți așa după numele celui care i-a văzut și descris întâia oară la *Teleostei*, după cele mai noi lucrări (Giacomini), se găsesc numai la *Teleostei* și la *Ganoizii* osoși.

Ei sunt așezați în partea mijlocie (Lepidosteus, Āmia), sau și caudală (Teleostei) a mesonefrosului și nu reprezintă, așa cum s'a crezut multă vreme (pînă la lucrările lui Giacomini), corticala din supra renală Mamiferelor. Deasemeni Corpusculii lui Stannius nu sunt omologi cu interrenala dela Selacieni sau dela Chondroganoizi, cum a crezut însuși Stannius. Acești corpusculi derivă întotdeauna din proliferarea pereților *ureterului primar* (canalul mezonefrotic), spre deosebire de corpii suprarenali, care derivă din splanchnopleură. La Lepidosteus și la Āmia, corpusculii lui Stannius sunt destul de numeroși, așezați în regiunea mijlocie a mesonefrosului și înconjurați de țesut limfoid. Prezintă o formă rotundă sau ovală, cu diametrul de maximum un milimetru, și cu contur regulat, fiind înconjurate de o teacă de țesut conjunctiv. Sînt formate din vezicule epiteliale pline, cu celule mici cu citoplasmă fin granulară; cîteodată sunt așezate în apropierea interrenalelor. Rolul funcțional al corpusculilor lui Stannius este pînă acum complet necunoscut. *Baecker* și *Vincent* și *Curtis* cred că acești corpi ar putea fi analogi cu lobul inferior al hipofizei, cu corpul galben, cu paratiroidele sau cu insulele pancreatice. Giacomini remarcă lipsa glandelor paratiroide în clasa peștilor și găsește că ar fi oarecare asemănare între structura acestora și cea a corpurilor lui Stannius; tot Giacomini crede că prezența acestor corpi la Teleostei și Osteoganoizi și lipsa lor la Selacieni și Chondroganoizi, ar indică, pentru corpusculii lui Stannius, un oarecare rol în formarea și structura scheletului.

A. MURGOCI

Donații și recunoștință.—Faptele frumoase ale oamenilor de inimă trebuiesc relevate, astăzi mai mult ca oricînd, unei lumi pentru care scopul vieții, se pare, este stăpînit de goana după aur.

Din toate părțile vedem pe acei care mai cred astăzi în primatul spiritului dînd alarmă, demascînd din viteza vieții de azi, superficialitatea condamnabilă a unei epoci.

Epoca noastră pe care cu drept cuvînt apărătorii spiritului o găsesc lipsită de o consistență sufletească, de creația adevărată, irosind vîlga unei generații—la ominea căreia nu este nici o diferență de structură față de cea dinainte alît de bogate în fapte mari—în manifestări brutale, nu este lipsită de oameni de suflet.

Și deaceia cred că făcute cunoscute aceste gesturi oridecîteori se ivește prilejul, se împlinește o datorie de recunoștință față de cei ce le-au făcut și un îmbold pentru cei ce au posibilitatea a le face.

Iar îmboldul trebuie în primul loc să se adreseze celui colț al sufletului în care sălășluiește bunătatea, dragostea către semenii.

Cînd scriu acestea am încă viu în minte conținutul frumoaselor rînduri apărute în Revista Științifică „V. Adamachi” Nr. 1 din 1939, închinată Donației D-lui Prof. Dr. Olin Cristea, Rectorul Politehnicei din Iași și datorate D lui Prof. Stan Ionescu.

Dacă, spuneam în capul acestor rînduri, gesturile mari trebuiesc făcute cunoscute, nu înseamnă că discreția unei fapte frumoase nu păstrează în ea toată creștineasca splendoare a unei mărețe împliniri.

Citind rîndurile D-lui Prof. Ionescu, rămii cu impresia unei aspre muștrări pentru ceilalți, a unei neexplicabile amărăciuni că nu ar mai exista persoane care au posibilitatea a imita cît mai des gestul donatorului.

„Nimeni ca profesorul Olin—scrie Domnia-Sa—nu ne oferă atîtea motive să-i admirăm generozitatea și gestul așa de înțelegătoare a nevoilor epocilor noastre, așa de legate de însănătoșirea societății noastre, așa de deschise la tot ce e frumos în natură și în suflet! Cîți din cei cărora le stă în putință, il vor imita!”

Și totuși mai sînt astfel de oameni. Este vorba de Profesorul Ion Ștefănescu-Radu dela Școala Politehnică din București.

Bursier al Academiei Romîne în anul 1900 din fondul V. Adamachi pentru întregirea studiilor sale în străinătate, Domnia-Sa pătruns de sentimentul înalt al recunoștinței ce datorează strălucitului donator V. Adamachi, a constituit în Ianuarie 1935 o donație dintr'un fond de 600.000 rentă 5%, pentru ca din venit să se trimeată în străinătate la fiecare 2-3 ani ingineri tineri din școlile noastre Politehnice pentru complectarea cunoștințelor prin vizitarea și studierea instalațiilor electrice¹⁾.

Și iată că numai după un an dela instituirea donației doi tineri ingineri electricieni, au luat parte la congresul

1) Regulamentul pentru administrarea fondului „Ing. Ștefănescu Radu” se poate găsi în Buletinul A. P. D. E. Anul IV, Nr. 10-12, 1935.

Uniunii Internaționale a producătorilor și distribuitorilor de energie electrică, ținut la Scheveningen în Iunie 1936, vizitând cu această ocazie cele mai interesante stabilimente industriale ale Olandei.

Tot D-să, deosebit de aceasta, a constituit din anul 1936 premii de 6000 lei anual pentru elevii anului III și IV dela Școala Politehnică București, pentru a se acorda celor mai bune lucrări făcute într-o anumită direcțiune.

Iată o frază caracteristică din actele sale de donație:

„Vă rog Domnule Rector să binevoiți a primi modesta mea contribuție pentru formarea viitorilor ingineri, simțindu-mă obligat la aceasta, ca recunoștință pentru cei ce m'au ajutat în acelaș fel“.

Rînduri de o adevărată înălțime sufletească din care se desprinde acel frumos sentiment al recunoștinței pentru cei ce te-au ajutat cîndva la întregirea cunoștințelor.

Nu puteam, noi care cunoaștem toate acestea, să le lăsăm trecute cu vederea, deși nu ne ascundem teama că procedînd astfel am putea supăra pe acel care a îmbrăcat în atita discreție fapta lui frumoasă, pentru care cerem cuvenita iertăciune.

Ing. ION TEODORU

Vîrsta hîrtiei poate fi determinată în mod precis.—Determinarea precisă a datei fabricării hîrtiei prezintă un mare interes și mai ales atunci, cînd este vorba să se știe dacă avem de a face cu o ediție originală sau cu o simplă imitație.

Astfel, dacă în cazul documentelor scrise cu mîna singura expertiză a cernelii este în măsură să dea indicații prețioase, atunci cînd avem de a face cu o hîrtie imprimată, trebuie să se țină seamă și de indicațiile pe care le poate da un examen atent al hîrtiei însăși.

Este ușor să imiți formatul unui volum și caracterele de imprimare, dar este extrem de greu să imiți o hîrtie anumită dacă nu te servești de aceleași metode, care au fost întrebuințate la fabricarea ei.

În Anglia, în ultimii ani s'a dat multă atenție cercetării metodelor de identificare a hîrtiei. Așa, se poate cita cazul unui volum din Tennyson, care se pretindea că ar fi fost tipărit în 1842, fapt ce a fost luat drept adevărat, pînă cînd s'a descoperit că hîrtia din care era făcută cartea conținea fire de alfa (Stipa tenacissima) și pastă de lemn; ori alfa nefiind întrebuințată în industria hîrtiei decît dela anul 1861, iar lemnul cu vreo douăzeci de ani mai tirziu, înșelăciunea era evidentă.

Deci pentru ca metoda de care am vorbit mai sus să dea rezultate sigure, trebuie natural să se cunoască pe deoparte cu precizie data la care a început să se întrebuințeze cutare sau cutare material, iar pedealtă parte să se cunoască metode proprii pentru stabilirea existenței acestui material în hîrtia examinată.

Astfel, la începutul ultimului secol nu intrau în compoziția hîrtiei decît țesăturile scoase din întrebuințare, iar procedeul mecanic de fabricare a înlocuit pe cel manual. Întrebuințarea hîrtiei luînd proporții enorme, prin 1854, „Times“ oferî un premiu de 1000 lire sterline aceluia care ar indica o altă materie primă mai bună pentru fabricarea ei. S'a recurs atunci la paie, și prin 1860 se întrebuința un amestec de paie și țesături. Dar acest procedeu a fost părăsit repede după introducerea hîrtiei de alfa în 1861, care prin 1870 a fost înlocuită cu cea fabricată din pastă de lemn.

Astăzi posedăm mijloace suficiente nu numai pentru a distinge dacă hîrtia a fost preparată după metodă mecanică sau chimică, dar chiar pentru identificarea diferitelor feluri de paste obținute fie după metoda acidă, fie după cea alcalină, fapte care permit să se atribuie eșantioanelor examinate datele precise ale fabricației.

În ceiace privește hîrtia de bambu, ea poate fi considerată ca fiind posterioară anului 1930.

Afară de aceasta trebuie să se ia în considerație atît cleiul cit și încărcătura. Așa, pentru prima dată a fost întrebuințată în 1860 rășina, dar pînă în 1865 metoda n'a fost aplicată decît în Anglia. La început, încărcătura se întrebuința pentru a obține o hîrtie bună pentru ilustrațiuni și pentru a-i da o greutate mai mare în cazul cînd s'ar vinde la cîntar.

Recent, s'a introdus adăogarea bioxidului de titan sau a pigmentilor albi, care fiind foarte ușor indentificați prin analiză, prezența lor permite să se atribuie hîrtiei examinate o dată de fabricație care să nu treacă de anul 1930.

Deduceri analoage s'ar pute face și în ceiace privește hîrțiile colorate cu anilină, de exemplu.

(După Nouvelles de la chimie)

ELENA COZUBSCHI

Centenarul descoperirii Chinonei de chimistul rus A. A. Woskresensky.

În 1938 s'au împlinit o sută de ani de cînd chimistul rus A. A. Woskresensky,

le există abia de 29 de ani, a descoperit chinona, substanța care a jucat un rol extraordinar în dezvoltarea teoriilor asupra coloranților organici. Numele dat de Woskresensky acestui corp e în legătură cu acela al acidului chimic din care a fost preparat.

Formula propusă de A. A. Woskresensky a fost discutată mult de marii chimiști ai timpului, pînă cînd în sfîrșit în anul 1845 a fost recunoscută de Laurent și Wöhler.

Mai tîrziu, în 1868, chimistul Graebe a demonstrat că chinona este înrudită cu hidrochinona (revelator fotografic foarte mult răspîndit astăzi), din care se și poate prepara prin oxidare.

A fost un timp, cînd se căuta ca toți coloranții să fie exprimați prin formule care să conțină nucleu de chinonă, care era considerat ca un cromofor. Astăzi, deși foarte mulți chimiști încă mai ex-

primă un mare număr de coloranți prin formule derivate din chinonă, sînt totuși teorii noi, în care pare a se părăsi teoria chinoidă a coloranților.

Cu această ocazie amintim că A. A. Woskresensky a mai făcut și alte descoperiri: așa a determinat ponderea moleculară a naftalenului cu ajutorul densității de vapori, a extras theobromina din cacao și a studiat acidul sulfovinic, produs intermediar în formarea etilenului.

ELENA COZUBSCHI

PERSONALIA

D-l N. Macarovicci, șef de lucrări la Laboratorul de Geologie, și-a susținut teza de doctorat în științe naturale: „Cercetări geologice și paleontologice în sudul Basarabiei” în ziua de 19 Aprilie 1939.

Dări de samă

Petru Dumitrașcu: *Manual de turnătorie*. Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”, București 1939. 298 pag. 139 fig. Preț 70 lei.

Autorul, inginer la Uzinele Reșița, ne prezintă o vedere de ansamblu asupra tehnicii turnării metalelor. Capitolele tratate, care corespund cunoștințelor meșteșugului turnătorului, se referă la: cunoașterea metalelor ce se pot turna; cunoașterea aparatelor și uneltelor de care se servește turnătorul; prepararea formelor în care se toarnă metalele; toarea și fabricarea aliajelor; turnarea; curățirea și verificarea pieselor turnate. Turnătoriile sînt împărțite după natura metalelor ce toarnă și ordinea în care au apărut în cursul timpurilor, în: turnătorii de aramă, fontă, oțel, aluminiu și aliaje ușoare, și în sfîrșit turnătoriile speciale sub presiune și prin centrifugare.

Prin expunerea îngrijită clară și cu simț practic a chestiunilor, autorul își atinge scopul urmărit de a da lămuririle și îndrumările necesare turnătorilor pentru împiedea pricepere a operațiunilor ce se execută în turnătorii și pentru înlesnirea perfecționării practicei lor. În afară de aceasta prin atingerea și a celor mai importante din problemele ce se pun în metalurgie în general, manualul poate

servi ca îndrumător și celor care se interesează de aceste probleme. Este bine venit, umple un gol însemnat și aduce, fără îndoială, o folositoare contribuție în literatura tehnică romînească.

T. FARCAȘ.

Grigore Antipa: *Hommage a son oeuvre*. București, 1938. (728 pag.)

În anul 1938, domnul Dr. Gr. Antipa a împlinit frumoasa vîrstă de 70 ani, fiind sărbătorit de foarte mulți prieteni, fiind admiratori, din țară și din străinătate, ca om, savant, academician, întemeietor al Muzeului de Istorie Naturală și ca organizator al Pescăriilor Statului.

Cu acest prilej s'a tipărit volumul omagial „Grigore Antipa. Hommage à son oeuvre”. Pe prima pagină se găsesc cuvintele M. S. Regelui Carol II, de laudă și prețuire pentru această viață de muncă, închinată științei și binelui obștesc. Urmează articolul „Rara avis”, în care dl. C. Meissner arată aprecierea și simpatia de care dl. Dr. Gr. Antipa s'a bucurat în lungă și rodnică sa viață, din partea tuturor și care se datorește unei minți superioare, unită cu o inimă de copil. Sub titlul „Une page de souvenir.—L'oeuvre de Gregoire Antipa”, dl. Prof. L.

Mrazec arată că această operă a avut două scopuri principale: 1. fondarea și organizarea Muzeului de Istorie Naturală din București și 2. studiul hidrobiologic al cursului inferior al Dunării și al apelor Mării Negre, început într-o vreme când concepțiile despre structura și tehnica regiunilor inundabile și mecanismul producției peștelui, erau reduse și în parte eronate. Dl. Dr. Antipa a refăcut istoria Deltei, i-a stabilit origina și evoluția și a pus în evidență legătura dintre ritmul sezonier al revărsărilor și viața peștilor; de aici concluzia necesității de a combate orice stagnare a apelor, prin construirea unei rețele de canale, care să conducă apa proaspătă din Dunăre, în lacurile și bălțile învecinate. Aceste idei, puse în practică, au fost răsplătite cu o producție de pește, care a întrecut așteptările cele mai optimiste. Prin întemeierea Institutelor de Hidrobiologie dela Constanța, Tulcea și București, Dl. Dr. Antipa a reunit interesele științifice și practice ale școalei hidrobiologice din România.

Calitățile științifice, claritatea și metoda care îi caracterizează opera, sint larg apreciate și peste hotare; Dl. Dr. Antipa este, de zece ani, vice-președintele societății „Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée” și membru al Institutului Oceanografic din Paris (unde a fost ales ca urmaș al marelui oceanograf danez, lohannes Schmidt), și consilier expert în Comisiunea Europeană a Dunării.

Dl. G. Ionescu Sisești analizează în: „L'activité du Dr. Antipa dans le domaine de la sociologie”, un alt aspect al acestei prodigioase activități. Chemat în fruntea unor servicii publice și instituții de mare importanță, Dl. Antipa a avut ocazia să cunoască adînc oamenii dela noi și a meditat asupra destinului și evoluției poporului român, asupra vitalității și obstacolelor ce i se pun în cale. Cartea „Problemele evoluției Poporului român”, publicate în 1919, la sfîrșitul războiului, este și astăzi de o mare actualitate. Sub o formă clară, sobră și convingătoare, această carte, rezultată dintr-o vastă cultură multilaterală și o cunoaștere adîncă a stărilor sociale, economice și politice din țară, este un adevărat stimulent la muncă, ordine și înțelepciune pentru serviciul intereselor superioare ale țării.—Dl. C. S. Stoicescu, Administrator delegat al B. N. R., în: „Gr. Antipa, Economiste”. revelă opera economică și practică a D-lui Dr. Antipa, operă care constă în asanarea lacurilor

și bălților pentru piscicultură și pescărie rațională; în valorificarea terenurilor inundabile și a grindurilor, prin culturi rotative de agricultură și piscicultură (parcele comunicante, utilizabile alternativ) și indicarea mijloacelor de realizare, pentru a se evita apelul la capitalul străin.

D-na Victoria Iuga-Ganea, conservator la Muzeu, face descrierea plină de în-suflețire a operei minunate de știință, naționalism și propagandă, care este acest Muzeu (L'organisateur du Musée National d'Histoire Naturelle).—Intors în țară, la vîrsta de 25 ani, după opt ani de studii foarte serioase și călătorii în străinătate, Dl. Gr. Antipa a fost numit în 1893 Directorul Muzeului de Istorie Naturală din București și Administrator general al pescăriilor. Muzeul fusese fondat de Prințul Alex. Ghica, în 1833, și conținea în momentul preluării, în afara unui schelet de Dinotherium gigantissimum, abia cîteva colecții de zoologie, complet deteriorate. Urmează descrierea întocmirii noului Muzeu, etapă cu etapă, cu mijloace precare, însă cu mare competență și energie, pentru a se ajunge la Muzeul de astăzi, adevărată „Universitate populară” în care oricine se poate instrui gratuit și care atrage curiozitatea și admirația vizitatorilor de orice condiție socială și a tuturor străinilor în trecere prin București. Se numără pînă la 400.000 vizitatori anual și peste 10.000.000, în ultimii 29 de ani.

Articolele de omagiu personal se încheie cu o scrisoare a D-lui Al. Lăpedatu, Președintele Academiei Romîne.

Urmează o serie de 46 articole științifice, semnate de numeroși profesori și oameni de știință, romîni și străini, de mare autoritate. Volumul se termină cu cîteva adrese oficiale, scrisori și telegrame, primite în ziua aniversării și cu lista publicațiilor D-lui Dr. Antipa.

Volumul omagial, închinat operii D lui Gr. Antipa, constituie o prețioasă operă de morală și de știință, care face multă cinste celor ce au alcătuit-o și țării întregi.

A. A. MURGOCI

Prof. Dr. V. Meruțiu: *Harta entonografică a Romîniei.* 1:1.000.000.

Această hartă, decurînd apărută, înfățișează o sinteză catografică a rezultatele entografice ale recensămîntului din 1930. Autorul a urmărit, evident, să dea o prezentare geografică mai ales a elementului românesc din cuprinsul statului nostru, dar nu trece cu vederea nici prezența petelor de așezări romînești

din afara României, pe care le trasează după Langhans (1915) și Emm. de Martonne (1918), izvoare bune.

Apariția acestei hărți are și însemnătatea unui document în genere, dar și pe aceia de a face cât mai clar înțeleasă în momentul de față valoarea noastră etnică din punct de vedere spațial. Grijă principală a geografului dela Universitatea din Cluj este de a prezenta—conform cu realitatea—caracterul masiv al răspîndirii elementului românesc pe cea mai mare întindere a teritoriului nostru național.—Cca. 60% din acest teritoriu este arătat ca fiind ocupat de Români într-o proporție covârșitoare de 76%—98,4%. Faptul interesant este că aici intră nu numai totalitatea județelor din vechiul regat (afară de Dobrogea), dar și o ramă de județe transilvane (Someș, Torda, Alba Hunedora, Severin, Făgăraș) și basarabene (Lăpușna și Orhei). Nu cunoaștem materialele recensămîntului din 1930; ne miră însă întrucîtva faptul că printre județele cu proporția de mai sus a Romînilor nu figurează, bunăoară, și Soroca, a cărei populație romînească se ridică, după cunoștințele noastre, fără îndoielă la 76%—80% eroarea este, firește, a recensămîntului, care—lucru paradoxal—a greșit uneori la rubrica „etniciități” în defavoarea numerică Romînilor.

Credem deasemeni că este o exagerată tendință de obiectivitate din partea autorului de a înfățișa principalele noastre masive muntoase cu o tentă identică cu acela care reprezintă proporția Romînilor sub 20%: oricît de rară ar fi pînza de populație romînească din aceste masive; *„se le ocupă și le folosește în mod aproape exclusiv față de alte grupuri de munteni (Huțuli, Săcui)”. Ar fi fost deci mai nimerit, după noi, ca aceste masive să fie colorate cu tenta de maximă proporție a Romînilor.*

Județele în care Romîni au 51%—75%, 20%—50% și sub 20% reprezintă ca 40% din teritoriul țării.

Imaginea geografică—pe care ne-o dă harta a predominării absolute a Romînilor concordă astfel în mod obiectiv cu procentul de 71,9% ce rezultă din recensămîntul 1930. Că acest % trebuie să fie foarte aproape de adevăr, e de ajuns să amintim faptul că pentru Basarabia toți autorii Ruși dinainte de război au atribuit Romînilor proporția de $\frac{2}{3}$ nu chiar 70% din populația totală a provinciei.

Dintre elementele alogene harta Prof. Martoniu scoate bine în relief prezența blocului săcuesc, situat în centrul Romî-

niei,—precum și dîra de numeroase așezări ungurești, în scopul de a lega Săcuimea cu masa ungurească depe Someșul inferior și Tisa. Ungurii și cu Săcuii formează inclusiunea alogenă cea mai numeroasă din țara noastră: 7,9%. Numai evreii se apropie de ea (7,4%). Celelalte grupuri etnice variază între 4% (germanii) și 0,9% (Turci—mai exact Turcii și Tatarii).

Risipirea celorlalte elemente alogene printre Romîni reese din hartă cu destulă claritate. Poate ar fi fost, însă, mai nimerită reprezentarea unui bloc ucrainian în Bucovina de Nord și pe Podișul Hotinului, unde acest element formează o pînză compactă de cca. 500.000 suflete. E drept că unitățile teritoriale—județele—după care s'a făcut pe harta, cu datele recensămîntului, calculul procentual nu se pretează bine pentru aceasta; ar fi fost nevoie de calcule după plăși și chiar comune.

Harta e clar desenată și nu-i încărcată deloc cu detalii topografice și inscripții de prisos. Legenda marginală (în limbele franceză, germană și italiană) aduc completări și lămuriri utile.

GH. I. NASTASE

Mihai D. David: *Omagiu profesorului Simion Mehedinți la despărțirea sa de catedră.* Iași, 1939, „Lucr. Soc. Geogr. D. Cantemir” vol. II.

Această broșură, care cuprinde 27 pagini, cu fotografiile din viața de geograf a profesorului Mehedinți, a fost prezentată la Congresul Profesorilor de geografie dela Bazargic (29 Maiu 1939) drept omagiu pentru întemeietorul geografiei romînești. Simion Mehedinți ridicat dintr-o familie de cărturari sătești din ținutul Vrancei, își desăvîrșește studiile universitare în Franța și Germania. Intors în țară ocupă prima catedră de geografie la Universitatea din București la anul 1900.

El are de luptat foarte mult cu învățămîntul istoric care în vremea aceea era condus de Onciul, Hașdeu, Odobescu, Xenopol. Totuși el reușește să ridice geografia la nivelul științelor de sine stătătoare.

Activitatea profesorului Mehedinți, poate fi împărțită în cel puțin 3 direcții: didactică, științifică și cultural națională.

Autorul cărții face o detaliată analiză a celor trei activități, ajungînd la concluzia că, profesorul Mehedinți „a fost unul din cei mai străluciți dascăli ai întregului neam românesc”.

C. MARTINIUC

Gh. I. Nastase: *Itinerarii și popasuri basarabene*. Buc. 1939, Bul. Soc. R. R. de Geogr. T. LVII. 16 pagini și 16 fotografii.

Orice cercetător sau turist care va dori să viziteze brațul Chilia, Bugeacul, valea Nistrului sau codrii Basarabiei, va găsi în această broșură, o prețioasă îndrumare cu popasuri și itinerarii basarabene.

M.

I. Rick: *Mișcarea aerului în Cîmpia Română*. Buc. 1939, Bul. Soc. R. R. de G. T. LVII. Broșura cuprinde 10 pagini de text, roze a vînturilor, rezumat francez.

Autorul ajunge la concluzia că, în ținutul dintre riurile Olt și Argeș, există doi curenți aerieni: unul de Vest (*mediteranian*) cu precipitații bogate și altul de Est (*continental*) secetos, avînd o frecvență și o direcție bine definită. Acest ținut face parte dintr-o zonă climaterică de tranziție; unde lupta dintre curenții de Est și West, se pune mai bine în evidență. Este o reală contribuție în domeniul geografiei fizice.

M.

N. Lupu: *Contribuțiuni la studiul fizic și antropogeografic a regiunii subcarpatice din Bucovina, cunoscută în literatura geografică sub denumirea de „Bazinul Rădăușului”*. Iași 1938. Lucr. Soc. Geogr. „D. Cantemir” vol. I. Lucrarea cuprinde 77 pagini, 3 hărți, 14 fotografii, schițe panoramice, profile, rezumat francez.

Pînă acum un an, după studiile geografice existente, regiunea subcarpatică se întindea spre Nord pînă la Cacica (Bucovina). Prin lucrarea de față, autorul dovedește prin argumente foarte plauzibile că, regiunea subcarpatică se pre-

lungeste și la Nord de Cacica, ajungînd pînă la frontiera polonă. În adevăr, formațiunea saliferă, trădată de numeroase izvoare sărate, în care este săpat ulucul subcarpatic, se continuă pe la poalele Obcinelor, pe o lățime de 2-3 km. Contactul între podișul sarmatic al Bucovinei și zona saliferă, se face prin intermediul unor cute diapire (Horodnic, 480 m).

Bazinul intracolar al Rădăușului este săpat în formațiuni sarmatice (podîșul Bucovinei cu strate aproape orizontale). Ulucul subcarpatic dela Horodnic, sculptat în salifer, apare ca o depresiune net subcarpatică, fiind despărțită de bazinul intracolar al Rădăușului, prin cute diapiră dela Horodnicul de jos.

Autorul, după ce studiază în amănunt bazinul Rădăușului, urmărește pe teren depresiunile subcarpatice Solca—Solonet—Cacica—Poiana Bălții—Păltinoasa, dezvoltate pe seama saliferului, dublate la exterior de o serie de bazine intracolare ca, Arbora—Botușana—Pârtești—Iliești—Stupca—Drăgoești.

Cei 82.293 locuitori (1934), din bazinul Rădăuș, reprezintă o puternică impopulare a acestor meleaguri (123 loc. la km²). Biserica lui Dragoș Vodă dela Volovăț ca și vechea reședință episcopală dela Rădăuș, sunt indicii de stăpînire românească, din cele mai îndepărtate zări ale istoriei. Antropogeografia regiunii este studiată pînă în cele mai mici amănunte ajungîndu-se la concluzii îmbucurătoare despre starea materială și culturală a țăranilor bucovineni.

Meritul deosebit al autorului, este acela de a fi primul geograf care a îndrăznit să atace o nouă problemă geografică: „regiunea subcarpatică bucovineană”.

C. M.

Literatură științifică română

REVISTE:

Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic, dela Universitatea din Cluj, vol. XVIII, 1938, Nr. 1-4.

Idem, Appendix I. Catalogul de semințe.

Idem, Appendix II. Dare de seamă despre activitatea Muzeului Botanic și a Grădinii Botanice.

Gazeta Matematică, București, Calea Griviței, 158; Anul XLIV, Nr. 8, Aprilie; Nr. 9, Mai; Nr. 10, Iunie 1939.

Revista Matematică din Timișoara, Școala Politehnică, Anul XIX, nr. 2, Aprilie; nr. 3, Mai; nr. 4 Iunie 1939.

Pitagora, Liceul Moise Nicoară, Arad, prof. N. N. Mihăileanu; Anul IV, nr. 7, Aprilie 1939.

Natura, Revistă pentru răspîndirea științei, Buc. Anul XXVIII, nr. 5, Mai; nr. 6, Iunie 1939.

Știință și Progres, Liceul Militar din Tirgul Mureșului, Anul V, nr. 9-10, Mai-Iunie 1939.

Revista Științelor Medicale, București, Institutul Dr. I. Cantacuzino, Anul XXVIII, nr. 4, Aprilie; nr. 5, Mai; nr. 6, Iunie 1939.

Viața Forestieră, București, B-dul. Tache Ionescu 31, Anul VII, nr. 4, Aprilie 1939.

Conferența, București, Calea Griviței 112, Anul III, nr. 4, 1939.

Revista Pădurilor, București, B-dul Tache Ionescu, 131, Anul 51, nr. 5, Mai 1939.

Marș Basarabiei, Chișinău, Anul VIII, nr. 5,
Anul 1939.

Transilvania, Buletin de tehnică a culturii.
Anul VII, nr. 70, Martie, Aprilie 1939.

Scoala Basarabească, Chișinău. Anul VII,
nr. 1, Martie; nr. 4, Aprilie; nr. 5, Mai 1939.

Întreaga Română, București, B-dul Schitu
Mănească. Anul LVII, nr. 8, Aprilie; nr. 9,
Anul LVIII, nr. 10, Iunie 1939.

Scoala Plugarilor, Facultatea de Agronomie
Chișinău. Anul XIII, nr. 1-2, Ianuarie, Februarie;
nr. 3-4, Martie, Aprilie; nr. 5-6, Mai-Iunie 1939.

Scoala Cărților, Ploiești. Anul VIII, nr. 15-16,
Martie; nr. 17-18, Aprilie 1939.

Capet Moldovenesc, Bălți. Anul VIII, nr. 3-4,
Martie-Aprilie; nr. 5-7, Mai-Iunie 1939.

LUCRĂRI PRIMITE 1):

Constantin D. Bușilă.—Învățămintul tehnic su-
perior, II. București, 1939, 252 pag.

— O sută de ani dela nașterea Regelui
Carol, I. București, 1939, 11 pag.

**Raport asupra activității Institutului de seruri și
vaccinuri „Dr. I. Cantacuzino”, pe anii
1938-1939**, București, 1939, 36 pag.

V. Gh. Radu.—Isopodes terestres de Roumanie,
I. Isopodes des environs de Sinaia.
Extrait des Ann. Sc. de l'Univ. Iassy.
Tome XXV, Fasc. 2, 1939, p. 447-463.

1) În ordinea primirii.

A APĂRUT:

România balenară și turistică

de

E. TEPOSU și VAL. PUȘCARIU

cu o prefață de Prof. I. Iacobovici
cu numeroase fotografii și schițe.

Edit. Cartea Românească.

Prețul 250 lei

A APĂRUT:

Cursul de Mecanică

Partea I-a

Noțiuni elementare asupra vectorilor

Calcul algebric, diferențial și integral.
Teoria potențialelor. Teoria câmpuri-
lor. Noțiuni asupra tensorilor. Exerciții

DE

Dr. IOAN I. PLĂCINȚEANU

Profesor de mecanică la Universitatea din Iași

EDITURA LAB. DE MECANICĂ IAȘI — 1939

140 pag. Prețul 100 lei, pt. studenți 50 lei

A apărut:

Călăuza Ceahlăului

Se poate comanda la Soc. de Gimnastică, Sport și Muzică, str. Șc. de Arte, IAȘI **Lei 30**

A APĂRUT:

INTRODUCERE

IN

ELECTRICITATE ȘI MAGNETISM

Inducția. — Curentul alternativ. — Unde și oscilații electromagnetice. — T. F. S. —
Electroni, raze pozitive, raze X. — Radioactivitatea. — Electricitatea atmosferică.

DE

ȘT. PROCOPIU

Profesor la Universitatea din Iași

EDITURA LABORATORULUI DE ELECTRICITATE

Vol. II, 336 pag., 214 figuri.

Prețul 250 lei

A APĂRUT:

INTRODUCERE ÎN ELECTROCHIMIE

DE

P. B O G D A N

La autor

Profesor la Universitatea din Iași

Lei 80

A APĂRUT:

CĂLĂUZA EXCURSIONISTULUI LA MAREA NEAGRĂ

DE

A. POPOVICI-BÂNZOȘANU

ȘI

M. A. IONESCU

Ed. Cartea Românească, Buc.

Lei 90

A APĂRUT:

FAUNA ROMÂNIEI

DE

Prof. I. SIMIONESCU

Membru al Academiei Române

Editura Fundației pentru Literatură și
Artă „Regele Carol II”, București

Lei 200

LES ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE JASSY

Organe de la Société Scientifique de Jassy

apare în fascicule, unite câte patru într'un volum.

Prețul volumului 400 lei.

Pentru orice privește redacția și administrația, a se adresa D-lor Profesori
OCTAV MAYER sau C. MOTĂȘ (Universitatea Iași).

A APĂRUT:

ȚARA NOASTRĂ

Oameni—locuri—lucruri

de **I. SIMIONESCU**

Profesor la Universitatea din București

Cu 249 figuri, 4 hărți și 24 planșe

Prețul lei 200.

Se poate comanda prin
CARTEA ROMÂNEASCĂ

A APĂRUT:

PLANTE VASCULARE

cuprinzând și chei dichotomice pentru de-
terminarea până la genuri a Briofitelor din
împrejurimile orașului Iași

DE

CONSTANTIN PAPP

Profesor de Botanică la Facultatea de Științe
din Iași

ȘI

MIHAI RĂVĂRUȚ

Asistent al Laboratorului de Botanică
al Facultății de Științe din Iași

1938 — Editura Laborat. de Botanică din Iași

Prețul 20 lei

CEL MAI MODERN

INSTITUT DE ARTE
GRAFICE ȘI EDITURA

BRAWO


CONST. BRAHĂ & EM. WOLOTZKY

IAȘI, STRADA ARCU No. 9

execută ori-ce lucrări tipografice cu prețurile cele mai avantajoase

Revista Științifică

« V. ADAMACHI »



S U M A R

C. V. Gheorghiu. — Profesorul Neculai Costăchescu (cu portret).

Ing. George Mastacan. — Fabricarea cărămizilor (cu 3 figuri).

N. Al. Florescu. — Orizonturile unei invenții (cu 14 figuri).

Mihai Răvăruț. — Cîteva cuvinte despre finețele și pășunile din munții Bistriței.

Eugen A. Pora. — Migrațiile peștilor euryhalini (Catadromi sau Thallasotoci) (cu 7 figuri).

NOTE ȘI INFORMAȚIUNI

Prof. C. Moțaș: Organizarea muncii științifice în România; **I. V. Huzum:** Nume de plante; **Const. I. Martiniuc:** Cîteva informații asupra numelui «Huțul»; **V. Arventiev:** Un cîmîtir de păsări în apropiere de Jurilovca; **N. Al. Florescu:** Un chimist român uitat: Neculae Teclu; **N. Al. Florescu:** Aniversarea unei izbînzii aviatice. **Personalia.**

DĂRI DE SAMĂ

Prof. G. Ionescu-Sisești: Cultura grîului (*N. Zamfirescu*); **Armand de Gramont:** Problèmes de la vision (*N. Al. Florescu*); **Agenda chimistului,** Editată de Cartea Romînească (*Ing. N. Al. Florescu*); **N. T. Leontescu:** Biografiile oamenilor iluștri (*N. Al. Florescu*); **Lecomte du Noüy:** L'homme devant la science (*N. Al. Florescu*).

LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ ROMÂNĂ

Prețul 50 Lei

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ «V. ADAMACHI»

APARE TRIMESTRIAL SUB ÎNGRIJIREA UNUI COMITET COMPUS DIN D-NII:

I. Simionescu (Profesor Univ. București), **Petru Bogdan**, **Const. Motăș**,
I. G. Botez, **Radu Cernătescu**, **Șt. Procopiu**, **T. Ionescu**, **I. I. Plă-
cințeanu**, **V. Zăhărescu**, **C. V. Gheorghiu** și **Const. Papp**
(Profesori la Universitatea Iași)

Tot ce privește redacția (articole, reviste, publicații) a se adresa D-lui
Prof. Petru Bogdan sau D-lui **Prof. C. Motăș**.

Tot ce privește administrația (mandate, subvențiuni) să se trimeată
D-lui **Prof. P. Bogdan** (Laboratorul de Fizică, Universitatea Iași).

ABONAMENTUL

Un an: 150 lei.

Pentru foștii bursieri ai Academiei din fondul V. Adamachi: 180 lei.

Pentru instituțiuni (laboratoare etc.): 200 lei.

Pentru studenți, preoți, învățători: 60 lei.

Abonamente de încurajare, pentru Instituții și Intreprinderi Indus-
triale mari, **lei 2000.**

Abonamentele se plătesc înainte, după primirea primului număr.

Cei ce nu vor să se aboneze, sunt rugați cu insistență a face cunos-
cut prin o carte poștală sau a refuza primul număr.

Domnii colaboratori sînt rugați a ține în samă cele ce urmează:

a) Nu se pot tipări articole mai lungi de șase pagini de tipar, nici
cu „urmăre”; pentru fiecare notă și dare de samă, spațiul rezervat este cel
mult 2 coloane.

b) Articolele să fie scrise de preferință la mașină, pe o singură pa-
gină iar figurile definitiv desemnate, separat de text.

c) Colaboratorilor li se trimite numai înția corectură, dacă doresc.

d) Costul separatelor privește pe autori, care le comandă direct la
tipografie.

Ele nu vor putea fi ridicate înainte de apariția revistei și vor purta
subtitlul: „Extras din Revista științifică V. Adamachi”. Autorii care do-
resc separate sînt rugați să indice pe manuscris numărul lor.

e) Manuscrisele se publică în ordinea sosirii; cele nepublicate nu se
înapoiază.

Pentru numerele neprimite, ad-ția nu răspunde; cei care doresc, pot
căpăta revista recomandat, adăugînd la prețul abonamentului încă 34 lei.

Pentru orice schimbare sau complectare de adresă, rugăm a fi vestiți.

Laboratorul de Geologie al Universității posedă colecția revistei
noastre dela vol. IX — pînă la ultimul volum. Deasemeni există vol. VII;
din care au apărut numai n-rele 1 și 2 din cauza războiului. Vol. I — VI
inclusiv sînt complect epuizate, iar din vol. VIII ne lipsește nr. 1.

Prețul unui număr vechi, începînd dela vol. X înainte, este de 50 lei, iar
acel al unui număr din vol. VII-IX, de 80 lei.

N. R.—Facem cunoscut cetitorilor noștri că subvenția acestei reviste a fost
suprimată. Dacă dorește ca ea să mai apară, rugăm stăruitor să plătească a-
bonamentele.

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ

«V. ADAMACHI»

Vol. XXV.—Nr. 3.

Iulie—Septembrie 1939.

Profesorul Neculai Costăchescu

(1876—1939)

de

C. V. GHEORGHIU

Profesor la Universitatea din Iași

La 14 Iulie 1939 s'a stins din viață profesorul Neculai Costăchescu, una din cele mai reprezentative figuri ale Universității din Iași.



Prof. Neculai Costăchescu (1876—1939)

N. Costăchescu s'a născut în orașul Huși la anul 1876. După ce a absolvit liceul „Național”, trece bacalaureatul la Universitatea din Iași și apoi se înscrie la Facultatea de Științe, secția fizico-chimică.

Prin anul școlar 1895—96, Costăchescu urmează Școala Normală Superioară, care în acel timp era condusă de regretatul profesor Anastasie Obregia. Sub îndemnul acestuia, el ține la această școală o serie de conferințe strălucite din specialitatea sa de mai târziu, dintre care amintim: Metale alcalino-terose, Teoria atomică, Dispersiunea luminei, Polarizare, Elemente din grupa azotului. Este imediat remarcat de profesorul Petru Poni, care-l ia asistent la Laboratorul de Chimie minerală, unde începe să lucreze, chiar înainte de a fi licențiat, un studiu asupra petrolului românesc. În anul 1901, Costăchescu trece licența în fizico-chimice și pentru meritele sale deosebite. Poni îl numește, la 1 Aprilie 1901, șef de lucrări. În anul 1905 este proclamat doctor în chimie, avînd ca teză, importanta lucrare: *Gazurile cuprinse în sare și în vulcanii de glod din România*. Amintim că N. Costăchescu este primul doctor al Facultății de Științe din Iași. După trecerea examenului de doctorat, în Septembrie 1906, obține, prin concurs, o bursă a Academiei, fondul Adamachi, pentru străinătate, și se înscrie la Universitatea din Zürich, unde lucrează patru semestre, împreună cu profesorul Alfred Werner, care fusese coleg de politehnică cu profesorul An. Obregia. În acest timp urmează cursul de chimie anorganică, un curs de chimie analitică și unul de specializare în chimia anorganică. În colaborare cu profesorul Werner face două lucrări asupra stărilor complexe.

Intors în țară, la 1908, a fost recomandat suplinitor al catedrei de chimie minerală, în locul profesorului Poni, funcționînd în această calitate pînă la numirea sa ca titular. În 1911, trece examenul de docență cu specialitatea Chimie minerală și în anul următor este numit profesor titular la catedra de Chimie minerală în locul profesorului Poni, care trecuse ca profesor onorar. În anul 1928 este numit ministru de instrucție în cabinetul Maniu, unde funcționează pînă la 30 Aprilie 1931. În mai multe rînduri a reprezentat Universitatea din Iași ca senator. Academia Romînă, ca un omagiu pentru activitatea sa, l-a ales membru de onoare.

Ca profesor, N. Costăchescu făcea lecțiuni strălucite. Totdeauna la curent cu ultimele progrese ale chimiei, chestiunile cele mai grele le expunea cu o claritate și un talent didactic impresionant. Toate lecțiile sale erau însoțite de numeroase experiențe din cele mai grele, conduse cu o mîină de maestru. Admiram la el siguranța gîndirii, precizia ideilor și claritatea și eleganța vorbirii.

În laborator a dezvoltat o activitate bogată în domeniul chimiei minerale, inițiind în țara noastră cercetările asupra sărilor complexe, preparînd o serie de complecși noi, formînd serie de chimiști distinși, care au făcut cinste Universității din Iași. Dintre numeroșii săi elevi amintim: Profesorul Gh. Spacu, d-na conferențiară R. Rîșcanu, Timotei Cosciug, A. Ablov, d-na Petrescu, d-ra A. Burada, d-na Triandaf.

Ca coleg avea totdeauna un spirit împăciuitoare, iar în consiliile de facultate punea un tact deosebit în rezolvarea chestiunilor celor mai grele.

A iubit mult Universitatea din Iași, pe care a ajutat-o ori de cîte ori a avut posibilitate. În timpul cînd era ministru de instrucție, a continuat opera începută de profesorul Petrovici dînd fonduri însemnate pentru începerea noului palat al Universității, în care s'au instalat Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și o serie de laboratoare ale Facultății de Științe și ale Politehnicei. Deasemenea a stăruit în ultimul timp pentru realizarea împrumutului necesar Facultății de Medicină pentru construcția noiei aripi.

A luptat mult pentru menținerea învățămîntului tehnic aplicat de pe lângă Facultatea de Științe din Iași și cînd acest învățămînt s'a transformat în Școala Politehnica „Gheorghe Asachi“, el a fost ales în unanimitate primul decan al Facultății de Chimie Industrială. Deși bolnav, a ținut o minunată lecție de deschidere, fiind dealtfel ultima, căci din cauza boalei nu a mai putut ține în anul școlar 1938-39 nici o prelegere.

Prin lucrările sale, prin devotamentul și credința în Știință, prin dragostea față de Univesitatea ieșană are dreptul la recunoștința noastră și cu emoție salutăm numele profesorului, pe care o moarte prematură l-a răpit așa de timpuriu din mijlocul nostru.

Lista principalelor lucrări științifice ale profesorului N. Costăchescu

1. *Gazurile cuprinse în sare și în vulcanii de glod din România.* (Teză de doctorat, 1905).
2. *Action de l'acide azotique de différentes concentrations, sous pression, sur l'pentane.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 2, pg. 119, 1903; Chem. Centralblatt 1903, I, 624).
3. *Sur les isohexanes contenus dans les pétroles roumains.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 3, pg. 95, 1904; Chem. Centralblatt 1905, I, 217).
4. *Über die Hydrate des Chromfluorids und einen Fall von koordinationspolymerie bei Hydraten.* (Berichte deutsch. Chem. Ges. XXXXI, Chem. Zentralblatt, 1909, I, 132).
5. *Sur un heptane secondaire contenu dans le pétrole roumain.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 6, p. 294, 1909; Chem. Zentralblatt 1911, I, 628).
6. *Fluosels de Vanadium.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 6, pg. 117, 1910; Chem. Zentralblatt, 1910, II, 1283).
7. *Fluorures de Cobalt et de Nickel.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 7, pg. 5, 1911; Chem. Zentralblatt 1911, II, 747).
8. *Fluorures complexes de chrome.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 7, pg. 87, 1911).
9. *Sur la formation des combinaisons complexes en dissolution (en commun avec Th. Apostoi).* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 7, pg. 101, 1911).
10. *Sels complexes de fer (en commun avec Gh. Spacu).* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 7, pg. 134, 1911).
11. *Fluorures complexes de chrome, II.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 8, pg. 16, 1914).
12. *Influence des substituants dans les bases et les anions sur l'indice de coordination d'un métal, (en collaboration avec A. Ablov).* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 17, pg. 515, 1929).
13. *Idem, II-e Communication.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 17, pg. 149, 1931.)
14. *Idem, VIII-e Communication.* (Ann. Sc. Univ. Jassy, T. 25, pg. 385, 1939).

Teze de doctorat executate sub direcția Profesorului N. Costăchescu.

1. *Gheorghe Spacu, Combinațiuni complexe de fer. Feramine.*
2. *D-na R. Râșcanu, Aminele Uraniului.*
3. *Timotei Cosciug, Compoziția chimică a petrolului românesc.*
4. *Anton Ablov, Influența substituenților în baze și în anioni asupra numărului de coordinație al unui metal (1932).*

Conferințe și articole publicate.

1. *Teoria coordinației.* Revista științifică „V. Adamachi“ Vol. I, pg. 99.
2. *Substanțele coloidale* „ „ „ Vol. II, pg. 23,
3. *Intrebuințarea azotului din aer.* Revista științifică „V. Adamachi“ Vol. II, p. 343,

Fabricarea cărămizilor

de

Ing. GEORGE MASTACAN

Asistent la Laboratorul de Mineralogie, Universitatea Iași

Fabricarea produselor argiloase aparține timpurilor celor mai vechi. Insuși omul primitiv a observat că lutul își păstrează o anumită formă.

Grecii și Romanii au luat arta fabricării produselor argiloase dela Asirieni, Babilonieni, Persi și Egipteni. Aceștia din urmă obișnuiau a însemna pe argilă nu numai evenimentele istorice ci și cunoștințele lor din domeniul matematicii și astronomiei. Mai mult chiar, smălțuirea în culori le era cunoscută.

Deasemeni cărămizile mozaicate în diferite culori s'au păstrat dela dinșii. Egiptenii prelucrau pământurile argiloase într'un mod asemănător sistemului rudimentar de astăzi. Ei frământau cu picioarele lutul și îl fasonau în forme speciale. Cărămizile erau băgate în cuptoare aproape similare cu cele întrebuințate de strămoșii noștri, pînă la introducerea mașinilor proprii fabricației.

Maurii fabricau cărămizile cele mai bogate în decorații, care sînt astăzi cunoscute sub numele de „Majolică“ după numele insulei Majorca unde era centrul acestor produse.

Reprezentanții cei mai însemnați ai acestei arte sînt cunoscutul florentin Luca dela Robbia (1400—1481), care a introdus smălțuirea cu staniu și ceva mai târziu Giorgio Andrioli, care a fabricat produse cu luciu metalic și cu irizații deosebite. Deatunci au rămas în Italia localități al căror renume se păstrează și astăzi: Pesaro, Veneția, Neapoli și Faenza de unde vine și numele de faianță întrebuințat și astăzi pentru anumite produse de argilă.

În secolul al XVI-lea această industrie a pătruns în Franța unde a excelat prin Bernard Palissy și în Germania prin maestrul Augustin Hirschvogel din Nürnberg.

La baza fabricării cărămizilor sînt silicații a căror constituție și proprietăți le vom vedea pe rînd.

Silicea — bioxidul de siliciu, SiO_2 — se găsește în natură sub trei forme: anhidru, hidratat și un amestec de anhidru și hidratat. Silicea anhidră este abundentă în natură, sub numele de cuarț. Cristalizată și transparentă poartă numele cuarț hialin. Se topește la 1880° sub formă de sticlă de cuarț și are un coeficient de dilatație neînsemnat. Cuarțul încălzit la 1600° își scoboară densitatea la 2,3 și își schimbă sistemul cristalin transformîndu-se în Tridimit.

Silicea amorfă încălzită în aceleași condițiuni se transformă și ea în Tridimit, care este forma stabilă la temperatura înaltă, în timp ce cuarțul este forma stabilă la temperatura joasă. Aceasta este de o importanță capitală în prepararea produselor refractare extra silicioase și a cărămizilor emailate.

Silicea hidratată în natură constă Opalul cu 3—15% apă.

Tot în natură se mai găsește un amestec de silice hidratată și de silice anhidră conținînd 1—3% apă. Acestea sînt Calcedoniile.

Se mai găsește, deasemeni, silicea amorfă hidratată, întovărășind silicea cristalizată anhidră sau invers.

Varietatea cea mai importantă pentru noi este silexul pyromac sau cremene, unde o silice anhidră și microcristalizată este înglobată de silicea hidratată. Silexul conține 98% SiO_2 . Foarte adesea găsim mase de silex ca o rea impuritate în argila de cărămizi și de teracote ceiace necesită eliminarea sau mărgirea lor.

Silicatul de calciu poate să fie agentul de vitrificație al cărămizilor și al teracotelor. El provine atunci din mai multe roci alcaline (cu feldspat, mica) conținând în argilă.

Cea mai mare parte din silicații metalici colorați sau necolorați nu au importanță pentru fabricarea cărămizilor decât o importanță accesorie, ei putând să întreacă diverși coloranți în glasura cărămizilor sau a țiglelor.

Cei care interesează în particular sînt silicații de aluminiu, de calciu și de fier.

Silicatul de calciu va fi necesar în cantitate mai mare sau mai mică în fabricarea cărămizilor și a țiglelor. El se topește la 1440° , este cu mult mai ușor fuzibil în prezența silicaților de fer. Ar putea să existe în stare de silicat natural în materialul pentru cărămizi și țigle sau să rezulte din coacere, prin reacțiunea silicei asupra carbonatului de calciu din materiile prime.

În doze mici silicatul de calciu nu poate să facă altă ceva decât să dea compactitate și soliditate produsului de copt. În doză mare, el joacă un rol puternic de fondant.

Din acest punct de vedere el prezintă un fapt caracteristic față de silicatul de sodiu. În timp ce fuziunea acestuia din urmă este precedată de o fază lentă, fuziunea silicatlui de calciu este rapidă și cu o scurtă fază pastuoasă. Din cauza aici necesitatea de coacere a cărămizilor și țiglelor între două limite stricte de temperatură cînd compoziția lor este în mare parte calcaroasă.

Silicatul de fer există deasemeni în toate produsele nerefractare nu pentru prezența sa este indispensabilă ci mai ales pentru faptul că nu împiedică în nimic fabricația, și apoi interesul este ca totdeauna să se utilizeze materiile prime așa cum le oferă natura. Colorația sa este roșie, se topește către 1100° . În cele mai multe cazuri silicatul de fer nu se găsește în masa materiilor prime ci se introduce adesea sub formă de oxid de fer hidratat sau anhidru sau carbonat de fer și silicatul ia naștere prin coacere.

Silicații de aluminiu sînt cei mai importanți pentru fabricarea cărămizilor și în special unul din ei bisilicatul de aluminiu hidratat: $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, sub forma sa chimic pură constituie caolinul. Mai mult sau mai puțin amestecat cu impurități și în particule mai mult sau mai puțin fine constituie materialul prim cel mai principal, pentru fabricarea cărămizilor și al teracotelor; este argila sub formele cele mai variate, dela argila pură foarte plastică, pînă la nisipul argilos abia cu greu plastic.

Argila pură plastică este rezervată în special pentru fabricarea produselor nerefractare, pentru că se topește în preajma lui 1830° . Nisipul argilo-calcaros și teriginos se topește cam la 1200° .

Alți silicați, care servesc drept fondanți și pot să existe ca impurități în argile sînt: Feldspatul Ortoz ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{K}_2\text{O} \cdot 6\text{SiO}_2$), Feldspatul Albit ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Na}_2\text{O} \cdot 6\text{SiO}_2$), Feldspatul Anortit ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2$).

Aceste materii argiloase se găsesc în toate pămînturile sedimentare și cu diferite grade de proprietăți comune, care sînt: Plasticitatea, coeziunea la uscare, rezistența mecanică după coacere. Aceste proprietăți stau la baza fabricației. Cea dintâi, plasticitatea, este fără îndoială cea mai importantă proprietate fizică, pe ea bazîndu-se crearea industriei cărămizilor.

Se înțelege, sub numele de plasticitate, proprietatea pe care o posedă argilele, de a se îmbiba cu apă și de a o conserva formînd o pastă căreia i se poate da, prin întărire și presiune, formele dorite și care se păstrează după uscare și chiar după coacere.

Materia, eminent plastică, conținută în argile, este caolinitul, care trebuie să se prezinte în particule foarte fine. Plasticitatea argilei se poate puternic modifica cînd apa care se întrebuințează pentru a o muia este slab alcalină sau ușor acidă. O apă alcalină menține particulele în suspensie și scade plasticitatea, iar o apă acidă precipită așa fel în cît mărește plasticitatea. Seger a supus argilele la o îndelungată putrezire și explică plasticitatea admițînd că apa sub această acțiune devine acidă prin fermentarea materiilor organice cuprinse în argile.

Dacă se admite acest fel de a interpreta plasticitatea, se explică atunci ușor de ce reacțiunea acidă, alcalină sau neutră a apei care se interpune între lamele, poate să modifice suficient aderența capilară care este provocată între ele. Vogt crede că argile nu se pot bucura de această proprietate decît dacă resturile fin pulverizate sînt formate din lamele foarte subțiri, care pătrund unele în altele ca solzii unui pește și se rețin între ele prin apa care formează




Fig. 1.

legătura mobilă, permițînd pasteii astfel făcută de a se mula, a se turna și ași păstra formele ce i se dau. Cantitatea de apă, care corespunde maximului de plasticitate este numită apă de fasonaj normal, corespunzînd consistenței de fasonaj normal. Plasticitatea este proprietatea inversă elasticității și se poate măsura provocînd o deformare. Incercarea trebuie să se facă asupra argilei cu consecvență normală. Se fac niște tubușoare de 8—10 mm. diametru și de 10 cm. lungime se curbează pînă la apariția fisurilor pe linia exterioară a curburei și se măsoară unghiul α care este invers proporțional cu elasticitatea (fig. 1).

A doua proprietate caracteristă a argilelor și a materiilor argiloase este coheziunea. Argila uscată a pierdut, prin natura ei, plasticitatea, dar a cîștigat mai mult sau mai puțin o coheziune mai mare. Această coheziune dă produselor uscate o rezistență mecanică suficientă pentru a permite manipularea lor, uscarea în cuptoare, etc. Pe măsură ce se face uscarea, plasticitatea scade, coheziunea ia naștere și continuă să crească. Se apreciază coheziunea prin măsurarea rezistenței la rupătură în kg./cm.². Pentru aceasta se întrebuințează balanța lui Michaëlis cu pîrghie simplă sau metoda Bischof.

Argila supusă la calcinare pierde cele două molecule de apă ale sale între 400° și 770° revenind în acest moment la Al_2O_3 și SiO_2 fără a fi un compus definit. Aceste două elemente se găsesc sau într'un amestec omogen sau într'un echilibru de disociație. Produsul are o mare porozitate, ce rezultă din golurile create prin îndepărtarea apei. Temperatura trebuie să fie cu mult crescută pentru a obține o combinație care concretizează masa și îi dă o foarte mare rezistență mecanică. Această rezistență mecanică, este mărită în aceleași condițiuni de coacere, prin adăugare de degresanți și fondanți care scoboară temperatura de combinare. Aceasta este a treia proprietate caracteristică a materiilor argiloase aceia care dă produselor calitățile pietrelor dure naturale: rezistența mecanică și inalterabilitatea față de agenții atmosferici.

Prin urmare materiile prime care interesează direct fabricarea cărămizilor sînt : *Argilele* cu timpul cel mai curat Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$, conținînd :

SiO_2	.	.	.	46.64
Al_2O_3	.	.	.	39.46
H_2O	.	.	.	13.90
				100.00

Sub această formă ele pot să servească mai mult la fabricarea produselor refractare. Apoi argilele silicioase care se îndepărtează de tipul cel dintîi prin creșterea silicei dar care cer o temperatură mai înaltă de coacere pentru a cîștiga proprietățile necesare ; ele se întrebuintează și pentru alte scopuri adăugîndu-li-se fondanți.

Argilele alcaline se întrebuintează singure pentru a da cărămizi de prima calitate, extra dure, cu condiția de a fi coapte destul de bine.

Totuși mai căutate argile de cărămizi sînt în primul rînd cele mai calcaroase atît pentru faptul că permit să se realizeze proprietățile cerute cu mai puțină cheltuială de combustibil, cît și pentru faptul că corijează proprietățile foarte refractare a argilelor pure și silicioase.

În al doilea rînd se caută cele mai feruginoase pentru fabricarea cărămizilor frumoase de ornament, cu o colorație roză, cît și pentru fabricarea țiglelor.

Tot aici ca făcînd parte din materiile prime se pot cita :

Degresanții : nisipul, pămîntul de infuzorii pentru cărămizile ușoare sau izolante pentru sunet, sgura de cărbune, praful de cocs, rumegătura de lemn, etc., și

Fondanții care în afară de cei care se găsesc în mod natural în argile și nisipuri se mai poate face apel la oarecare reziduiuri industriale, pilituri, sgură, scorie etc.

După ce am văzut care sînt materiile prime și care sînt proprietățile lor să vedem acum în ce constau operațiile de preparare.

Extracția. Ea poate fi mecanică sau manuală depinzînd de gradul de consumare și de condițiile de întrebuintare. Cînd fabricarea se face manual și prin urmare consumul de materii prime relativ mic, fabricarea este în general situată în acelaș loc cu extracția, ea făcîndu-se în acest caz prin mijloace simple, cu lopata, sapa, hîrlețul.

Argila extrasă este transportată cu roaba, Pentru extracțiile mari se întrebuintează un excavator, care poate să extragă 250 m^3 pe zi și transportul pînă la locul de fabricare se face cu vagonete.

Sfărîmarea. Cînd argilele sînt uscate trebuiesc sfărîmate pentru a obține o ușoară umectare și o mai bună omogeneizare cu nisipul sau cu alte argile care intră în compoziție. Se mai obișnuiește de asemeni o hibernare a materialului, adică se extrage argila umedă din toamnă și se lasă în timpul ernoii să înghețe. Datorită acestui fapt se produce o sfărîmare. Această operație are desavantajul că face să depindă lucrul de condițiile atmosferice și de cantitatea de argilă care a fost pusă la iernare. Odată extrasă argila este supusă la operația de sfărîmare, în aparate speciale. Aceasta are de scop de a termina sfărîmarea argilei în fragmente ușor umectabile și eventual de a reduce pietrele ce le poate conține (pietre calcaroase, pirite, șisturi, silexuri etc.). Cîteodată aceste pietre în loc să fie sfărîmate sînt eliminate.

Aparatele de sfărîmare întrebuintate în cărămidărie și țiglărie sînt acelea de mare rendement, de întreținere și conducere ușoară, și de uzură minimă. Ele se pot reduce la trei tipuri : 1. Mori cu bile ; 2. Sfărîmătorul cu pietre de moară ; și 3. Sfărîmătorul cu cilindri.

Ciuruirea. Operația care urmează după sfărîmarea argilei este ciuruirea. Ea se face cu ajutorul sitelor. Este tot atît de importantă ca și sfărîmarea materialului. Sitele trebuiesc astfel alese încît pe deoparte să permită trecerea rapidă a particulelor de dimensiuni admisibile, iar pe de altă parte să le îndepărteze pe cele mari, care trebuiesc să fie duse din nou la aparatele de sfărîmare. Ciuruirea se poate face printr'o sită cu o mișcare liniară alternativă, înclinată de un oarecare număr de grade, sau printr'o sită cilindru, care are o mișcare de rotație.

Dacă însă se urmărește separarea numai a particulelor foarte fine de argilă se face atunci să circule un curent de aer puternic în moara de sfărîmare,

Dosajul este operația care pentru micile industrii se face sau cu roaba sau cu vagonetul. Un exemplu de dosaj este următorul:

Argilă nisipoasă . . .	16 roabe
Marnă argiloasă . . .	3 „
Nisip calcaros . . .	3 „
	22 „

Pentru marile producțiuni însă, în vederea suprimării mîinei de lucru, dosajul se face în mod cu totul automat. Pentru aceasta se întrebuintează distribuitorul dozator, care poate fi de două feluri:

Distribuitorul circular, care are forma unui tambur prevăzut cu o serie de compartimente. Este pus în mișcare cu ajutorul unui motor și servește pentru a doza sau o singură materie sau două în acelaș timp.

Distribuitorul liniar al lui Pellerin, are forma unui paralelipiped cu baza rectangulară. Aparatul conține un număr de compartimente, prevăzut fiecare cu cîte un orificiu de eșire a cărui mărime este reglabilă. Prin greutatea sa și prin mișcarea care-i este imprimată materia argiloasă tinde către orificiu, unde o mică paletă reglează ieșirea sa. Amestecul materiei dozate cade pe o pînză fără sfîrșit, care o duce spre utilizare.

Amestecul. Cînd dosajul se face cu roaba se obține deja un prim amestec aducînd materia dosată într'o stare de amestec cu lopata sau cu sapa aproape gata de malaxare. În general amestecul se face în acelaș timp cu umectajul într'un aparat special numit amestecător stropitor, sau în acelaș timp cu sfărîmarea materialului în koller-ganguri speciale.

Omogeneizarea are de scop să îmbunătățească amestecul și să facă să rezulte o pastă intimă, chiar pentru particule mari care constituiesc pasta. Aparatul întrebuintat este un malaxor compus dintr'un cilindru gol avînd în interior un ax prevăzut cu palete.

Dacă materia primă nu a suferit vreun amestec și pe de altă parte ea este extrasă într'o stare de umiditate suficientă și fără a conține granule de silex, atunci ea se poate trata direct la malaxor căruia i se adaugă o pereche sau două de cilindre prin care trece argila înainte de malaxaj. Acești cilindri asigură sfărîmarea granulelor calcaroase, care eventual ar exista în masa materialului și prepară condițiile de omogeneizare a pastei.

După ce materia primă a fost adusă prin procedeele deja indicate, într'o stare de umiditate convenabilă și la o omogeneizare perfectă se poate proceda la fabricarea manuală sau mecanică a cărămizilor. Din acest punct de vedere se pot distinge:

Mulage manuale și mulage cu filiera ce se completează cu un tăietor. Mulajul manual se face într'un cadru de forma unei cărămizi. Mulajul cu filiera se face într'un aparat ce are un orificiu cu două dimensiuni ale cărămizii. Pasta fiind turnată în filieră ese cu un paralelipiped pe care printr'o o-

operație ulterioară, cupajul, îl taie după cea de a treia dimensiune. Mulajul cu filiera necesită încă un aparat de propulziune și un aparat de tăiat, care trebuie să fie astfel aranjat ca fiecare cărămidă în parte să capete lungimea cuvenită, sau dacă sînt tăiate de a latul să aibă aceeași grosime.

În afară de aceste două procedee de mular se mai obișnuiește însă pe o scară mai puțin întinsă și mularul cu presa, mai ales cînd e vorba de forme variate, care comportă diferite plane.

Din punct de vedere al condițiilor de fabricație cît și acela al aspectului și al calității produselor se pot distinge:

Cărămizi de țară, fabricate pe loc cu mîna și coapte prin procedee primitive; rezultatul este că se obțin cărămizi de temelie cu un mare deșeu de fabricație și cărămizi mecanice fabricate în uzine, mecanic, și în general coapte în cuptoare cu foc continuu.

Cele dintîi, cărămidile de țară, se așează în niște banchete pe o suprafață bine curățată și ușor înclinată pentru ca apa să se poată scurge ușor. Principiul aranjării materialului în cuptor constă în a ridica succesiv rînduri de cărămizi, separîndu-le printr-o pătură de combustibil subțire și lăsînd loc gol pentru trecerea gazului de combustie. Primele rînduri trebuie să conțină focarele de aprindere.




Fig. 2.

Pereții sînt tencuiți atît pentru a evita răcirea prin aerul din afară, cît și pentru a putea menaja unele orificii prin care să intre aerul în vederea regulării combustiei. În timpul unei campanii de lucru, din Martie pînă în Septembrie, se ard în general cam 500.000 de cărămizi, consumîndu-se cam 160 kgr. carbuni slabi pentru 1000 cărămizi. Cînd coacerea se face cu surcele nu se mai

poate alterna combustibilul cu cărămidile; atunci trebuie să se facă focare permanente în pereți. Cărămidile mecanice sînt fabricate în uzine și prin urmare fabricarea lor cere întrebuințarea în întregime a progresului tehnicii și mecanicii. Cărămidile tăiate sînt puse pe cărucioare și transportate pe o arie plană și nisipoasă, unde se lasă să se usuce. În marile producții uscarea lor se face în uscătorii speciale,




Fig. 3.

facute cu ajutorul unor montanți verticali, pe care se așează la distanțe corespunzătoare șipci orizontale pe care se pun cărămidile. Acestea se pot acoperi formînd adevărate șoproane în care schelele se așează perpendicular pe lungimea șopronului astfel ca vîntul să atingă pe cît posibil toate cărămidile în lungimea lor. (Fig. 2).

Sînt deasemeni uscătorii așezate deasupra cuptoarelor de ardere pe unde aerul vine lateral. (Fig. 3).

Coacerea se face după importanța producției fie în cuptoare intermitente, fie în cuptoare continui. Aceste din urmă sînt de două tipuri și se deosebesc prin două caracteristice opuse: Foc fix și produse mobile; Produse fixe și foc mobil.

Acesta a fost generalizat în arderea cărămizilor prin 1867 sub numele de

cuptorul Hoffman și Licht. Se compune dintr'o galerie circulară limitată în zidărie. Către exterior sînt amenajate un număr de guri, care sînt zidite și corespund cu zona de încălzire.

În timpul coacerii sau răcirii ele se deschid pentru a permite încărcarea sau descărcarea.

Forma circulară a cuptorului Hoffman și Licht reprezintă un volum mare de zidărie și pe dealtă parte construcția unei uscătorii circulare deasupra cuptorului este foarte costisitoare. Aceste inconveniente s'au remediat prin construcția cuptorului Hoffman-Simon construit din două galerii paralele, comunicînd prin extremitățile lor. Acestea pot fi subterane sau deasupra solului, ambele avînd aceeași formă și aceleași caracteristice.

Cărămizile scoase din cuptor sînt supuse la încercări de rezistență la spargere, gelivitate și prozitate. Prețul cît și utilizarea lor poate astfel fi determinată.

Orizonturile unei invenții

de

N. AL. FLORESCU

Asistent la Facultatea de Științe din Iași

Există creații omenești care au pornit din imaginația unor neprofesioniști în domeniul științei — dar înobilăți de soartă cu un foc sacru — creații care au putut ajunge la o importanță cutremurătoare în ridicarea culturii noastre. Realizările acestea se nasc dintr'un amestec de visuri și spirit științific, tero-rizează viața acelor însetați de necunoscut, pentruca apoi, tîrziu de tot, să le ridice trofee eterne ca o supremă și naivă recunoștință. Printre aceste mari invenții care predomină civilizația actuală, este și *fotografia*.

Prin ceiace a contribuit fotografia în evoluția științei, este legitim a o situa printre cele mai de samă cuceriri ale minții omenești. Căci nu a jucat rolul important numai simpla posibilitate de a reproduce imaginile, ci mai ales ajutorul pe care l-a adus fotografia ca instrument de cercetare într'un număr mare de domenii de activitate.

Fotografia a fost ținută multă vreme departe de preocupările științifice, deaceia primele sale evoluții sînt datorite amatorilor, iar nu oamenilor de știință. Veacul trecut, de altfel, ne-a dat multe exemple de inventatori geniali ale căror contribuții au fost decisive în evoluția spiritualității umane. Franța, țara de origine acestei minunate invenții, a serbat, la începutul acestui an, un veac de cînd fotografia a putut fi considerată ca definitiv realizată.

Lăsînd la o parte imensele contribuții de amănunt — unele destul de importante, altele mai puțin — pe care istoria fotografiei ni le reamintește ca pe un mozaic de încercări, cu speranțe și decepții, voi nota în paginile ce urmează primii pași ai acestei invenții și rezultatele ce le avem astăzi.

Istorie. Ca și o țară sau un popor, o invenție are istoria ei, care e cu atît mai bogată și mai întinsă în trecut, cu cît manifestările ei cuprind preocupările de orice natură cu mai multă intensitate. Apariția fotografiei ascunde o serie de fapte și observații, care s'au strîns dealungul veacurilor. Primul pas în afirmarea acestei invenții, datează din clipa cînd camera obscură — cunoscută de multă vreme — a putut avea o utilizare practică. Camera obscură a

fost imaginată de către *J. B. Porta*, un napolitan pe care îl preocupa știința, pe la mijlocul veacului al XVI-lea. Cu această cameră, o simplă cutie cu o mică gaură circulară pe unul din pereți, se putea obține imaginea fidelă a obiectelor exterioare pe peretele opus. Mai târziu, *Porta* a pus în dreptul găurii o lentilă, obținând astfel imagini mai luminoase și mai clare.

Prima aplicație a acestei ingenioase invenții a făcut-o un pictor venețian, *Canaletto*, întrebuițind-o ca un auxiliar în desemnarea tablourilor sale.

Un alt șir de fapte care au dus spre invenția fotografiei, sînt observațiile, destul de vechi, ale influenței razelor solare asupra unor substanțe chimice. Fenicienii recunoscuseră că, razele soarelui fac mai strălucitoare purpura. *Vitruvius* — cu vreo sută de ani înainte de nașterea lui Isus — menționează că soarele modifică colorile, și deaceia dă sfatul, de a se așeza tablourile spre nord. Aceiași remarcă o face și *Plinius*, ceva mai târziu. Cu timpul, acest gen de observații se mărește. Astfel, alchimistul *Fabricius*, prin 1565, menționează că clorura de argint capătă diferite nuanțe atunci cînd este atinsă de lumina zilei; dar aceasta a rămas multă vreme ca o observație izolată. Aici avem un exemplu, ca multe altele, că orice idee mare trebuie să dospească în mintea oamenilor, pînă în momentul cînd apare ființa care să-i dea viață. Mai târziu, în 1727, un medic german, *Schulze*, constată mai îndeaproape aceleași fapte, însă fără a li se da vreo importanță deosebită. Puțin mai târziu, *Scheele*, prin 1777, începe a studia metodic proprietățile luminii în legătură cu acțiunea diverselor radiații colorate asupra clorurii de argint, iar *Senebier*, prin 1782, face măsuri cantitative asupra intensității de colorare a aceleiași substanțe, sub acțiunea diferitelor radiații solare, și găsește că lumina violetă are acțiunea cea mai rapidă, venind apoi cea galbenă și la sfîrșit cea roșie. Mai târziu *Bérard*, în 1812, reia aceste experiențe și probează cu mai multă exactitate distincția între razele actinice și antiactinice, adică radiațiile albastre, violete și ultraviolete — acestea din urmă descoperite cu cîțiva ani mai înainte, în 1801, de către *Ritter* — înegresc repede clorura de argint, pe cînd sub acțiunea razelor galbene, portocalii și roșii substanța rămîne nealterată chiar mai multe ore.

Toate aceste rezultate, în aparență neînsemnate, duc pe fizicianul francez *Charles*, pe la 1780, să obțină prima impresiune fotografică, proiectînd silueta unei persoane pe o hîrtie albă impregnată cu clorură de argint. În locurile atinse de lumină, hîrtia se înegrea, conturînd astfel imaginea ce rămînea albă, dar care nu putea fi păstrată multă vreme la lumină. Efectele acestui fenomen helio-chimic dădea speranțe multor spirite ingenioase de a ajunge la invenția fotografiei. Astfel încercările lui *Charles* sînt repetate în Anglia de către *Wedgwood*, *James Watt* și *Humphry Davy* (1802), dar imposibilitatea de a păstra, fără să se întunece, imaginile obținute aduseră încercările în fața unui obstacol dezarmant. Iată dar că împrejurările cereau să se ivească acea ființă dotată cu ingeniozitate și perseverență, care să ajungă la realizarea invenției fotografiei.


Joseph-Nicéphore Niepce, născut la 1765, era un ofițer în retragere. Ducea o viață modestă la țară, aproape de Chalon-sur-Saône. Fie datorită firei înăscute, fie constituției fizice nu tocmai solidă, *Niepce* avea aparența unui om tăcut, timid chiar. Discreția și liniștea cu care își depăna existența, nu indicau deloc că, în ființa aceia plăpîndă, destinul ascunsese o imaginație care avea să producă fapte neperitoare. Acolo, în singurătatea vieții de țară, *Niepce* își liniștea setea nepotolită de necunoscut imaginînd diverse invenții. Prin 1814, ideea reproducerii mecanice a imaginilor începe al pasiona. Spiritul său inventiv întreprinde că problema fizării imaginii din camera neagră ar fi o realizare de

mare importanță. *Niepce* începe prin a repeta faptele lăsate de predecesorii săi, și apoi a încerca pe rînd toate substanțele cunoscute pe vremea aceia, ca sensibile față de lumină. Zece ani i-au trebuit pentru a ajunge să obțină rezultate mulțumitoare. În adevăr, în 1824, *Niepce* obține primele reproduceri, evident imperfecte, dar care indicau un pas spre reușită. Materia sensibilă pe care o întrebuințează este bitumul de Iudeia, substanță care se alterează, și în același timp devine insolubilă, sub influența luminii. Imaginile obținute se puteau conserva, ne mai fiind impresionate de lumină. Calea către marea invenție era găsită. Sforțările trebuiau însă duse mai departe.

În timpul acesta, la Paris trăia un pictor decorator, *Louis Daguerre* — născut la 1789 — om de acțiune, ambițios și cu imaginație. Spiritul său inventiv — mai mult decît talentul — îl făcuse celebru prin realizarea unui joc de optică,



JOSEPH-NICÉPHORE NIEPCE
1765—1833



LOUIS DAGUERRE
1789—1851

tablourile dioramice. *Daguerre* aflase de rezultatele lui *Niepce* și căuta să se asocieze cu acesta, pentru a continua problema fotografiei. La 14 Decembrie 1829, la Paris, *Niepce* și *Daguerre* încheiară un act oficial, în scopul de a lucra la perfecționarea fixării imaginilor primite în camera neagră, prin metoda descoperită de *Niepce*, și de a trage toate foloasele acestui nou gen de industrie.

Tovărășia aceasta bizară n'a durat mult. La 15 Iulie 1833, *Nicéphore Niepce* ia calea veșniciei, tot așa de discret precum i-au fost căile vieții, pentru a arăta că pe pămînt eternul se naște în umbra a tot ce este efemer. După mai bine de o jumătate de veac — la 21 Iunie 1885 — i s'a ridicat o statuie la Chalon-sur-Saône.

Daguerre a rămas singur, ca să marcheze a doua fază a invenției fotografiei. Mai activ și, mai ales, situat în mai bune condiții la Paris, decît cum fusese *Niepce* la Chalon, capătă imediat (1835) rezultate remarcabile. Constată că o placă de argint iodurată — prin expunerea la vaporii de iod — este impresionată de către lumină. Alterarea aceasta helio-chimică poate fi pusă în

evidență prin expunerea la vaporii de mercur. Iodura nealterată este dizolvată cu cianură de potasiu, și astfel imaginea devine vizibilă și rămâne stabilă.

Cîțiva ani mai tîrziu, *Daguerre* comunică fizicianului *François Arago* întregul lui procedeu de fotografiere pus complect la punct și numit ulterior *daguerreo-tipie*. *Arago* expune acest procedeu în fața Parlamentului și a Academiei de Științe. Din inițiativa acestui savant, Camera deputaților alcătuește o lege, în ședințele dela 3 și 30 Iulie 1839, prin care se acordă drept recompensă națională inventatorilor fotografiei, o pensie viageră de 6000 franci lui *Daguerre* și alta de 4000 franci lui *Isidore Niepce*, fiul lui *Nicéphore Niepce*. În ședința dela 10 August a aceluiași an, la Academia de Științe, *Arago* expune în detaliu procedeul noiei invenții. În expunerea sa, *Arago*, a prevăzut cea mai mare parte din importanțele aplicații ale fotografiei, arătîndu-și, totuși, scepticismul în ceiace privește utilizarea fotografiei în cercetările cerești. Se știe însă, că în această direcție fotografia a atins cuceriri uimitoare.

Istoria fotografiei nu este însă atît de simplă precum am expus-o. În aceeași perioadă de timp au fost și alții care au atacat problema fotografiei, iar dacă *Daguerre* a cules laurii, nu înseamnă că ceilalți rămași în umbră nu au pentru posteritate același merit și aceleași drepturi în cartea recunoștinței omenesci. Cu cîțiva ani înainte de 1839, un funcționar din ministerul finanțelor, *Bayard*, utilizînd faptul că lumina are proprietatea de a separa iodul din compoziții săi, izbuteste să obție, cu ajutorul camerei obscure, imagini destul de reușite. Deși în 1839, *Bayard* expune publicului rezultatele fotografice la care muncise cîțiva ani, partea lui de contribuție a rămas totuși neobservată. Același soartă a avut-o englezul *Fox Talbot*, care după ce obținuse rezultate tocmai din 1834, comunică Societății regale engleze în același an cu *Daguerre*, cercetările sale asupra sensibilității clorurei de argint față de razele solare și fixajul imaginilor cu ajutorul hiposulfidului de sodiu. Dar invenția capitală a lui *Fox Talbot*, dată la iveală în Septembrie 1840, este utilizarea imaginilor negative, cu ajutorul cărora se elimină acea inversare a părților clare și obscure față de imaginea naturală, așa cum se obținea pînă atunci. *Talbot*, prin această invenție, marchează al treilea punct principal în evoluția fotografiei și deschide calea nouilor perfecționări, care au dus la procedeele actuale.

Aproape zece ani procedeul lui *Daguerre*, de a obține imagini stabile pe metal, a avut o întrebuințare exclusivă, deși prezenta grave inconveniente. Astfel, nu aveau o durată prea mare, căci se alterau, și nu puteau fi obținute decît copii unice. În special, datorită acestui din urmă desavantaj, invenția lui *F. Talbot* — numită de el *calotipie* — începe a cîștiga teren, așa că procedeul acesta, mai simplificat, este introdus, spre 1847, în Franța de către *Blanquard Evard*. Un an mai tîrziu, copia negativă de hîrtie întrebuințată pînă atunci, este înlocuită cu sticlă. Această perfecționare datorită lui *Niepce de Saint-Victor* (1805-1870) — nepotul lui *Nicéphore Niepce* — dăinuiește și astăzi. Urmează apoi o serie de perfecționări importante în scopul de a se obține fineță în reproducerea imaginilor, sensibilitate mare și o bună conservare. Probele negative — datorită numeroșilor cercetători — au ajuns astăzi să dea rezultate uimitoare cu gelatina impregnată cu bromura de argint, iar cele pozitive putîndu-se obține în toate colorile, au o durabilitate, căreia nu i se poate aduce niciun reproș. Avînd la bază un principiu din fizică și utilizînd o proprietate chimică, fotografia a împărțit binefacerile ei în toate ramurile științei și ale industriei.

Fotografia în știință și în tehnică. O descoperire sau o invenție este mare prin întinderea orizonturilor sale. Fotografia — chiar dela începuturile ei — a arătat o extensie mai întinsă decît oricare altă invenție în mai toate dome-


niile de activitate omenească. Nelimitîndu-se în cadrul unei singure specialități, fotografia a adus un aport necontestat, deopotrivă în știință, în industrie și în artă. Ca instrument al progresului științific, fotografia are o valoare de netăgăduit.

Fenomenele științei sînt fortărețe, care se lasă cu greu a fi cucerite. Armele întrebuintate în aceste cuceriri sînt numeroase, dar se pare că fotografia are o eficacitate unică. Cu drept cuvînt fizicianul *Janssen* a spus : „Placa fotografică este retina savantului“.

În știință, fotografia servește în primul rînd ca metodă de înregistrare a fenomenelor. Prin calitățile ei de a fi sensibilă și fidelă, fotografia a clarificat numeroase chestiuni obscure, care ar fi rămas departe de a putea fi observate cu simțurile noastre, din cauza evoluției lor în timp.

Ca metodă de analiză a fenomenelor complexe, fotografia s'a arătat a fi de un mare ajutor. În adevăr, problemelor care întîmpină greutăți în rezolvarea lor, fotografia, prin diversele sale aplicații, le-a dat posibilitatea unei analize în timp și în spațiu. S'a putut astfel mări sau micșora scara timpului și a spațiului, și prin asta să se dea posibilitatea, ca un fenomen să nu mai apară instantaneu sau cu dimensiuni prea disproporționate.

Înregistrarea mișcărilor extrem de repezi constituie o necesitate în multe ramuri de activitate. Modul cum se comportă diversele piese supuse la rotații



Fotografia unui glonte de pușcă (Lebel) ce trece prin o placă de oțel de 5 mm.

de mii de ture pe minut, sau poziții instantanee ale corpurilor ce au iuțeli de zeci sau sute de metri pe secundă, au servit să se verifice exactitatea multor construcții sau să descopere fapte nebănuite. Primii pași spre realizarea fotografiei rapide — a cronofotografiei — au fost făcuți, după ce s'a izbutit a se obține plăci fotografice extrem de sensibile. Fotografii pînă la 1 : 500 din secundă se realizează în mod obișnuit. Pentru a se ajunge la fracțiuni și mai mai mici de timp — pînă la 10^{-7} din secundă — a fost necesar să se construiască obiective speciale și să se opereze la luminări puternice cu scînteii electrice. Astăzi, în special cu ajutorul cinematografiei, se pot urmări mișcările ritmice și reflexe la animale, drumul unui glonte și diverse alte fenomene. În ceiace privește mișcările rapide de rotație, cu ajutorul stroboscopiei s'a ajuns să se obțină fotografii la a milioana parte din secundă. Fotografierea unei elice ce are o rotație de cîteva mii de turații, a unui motor în mers, a injectării combustibilului într'un motor, au adus foloase imense în industrie.

În special ca instrument în explorarea infinitului mic și a radiațiilor invizibile, fotografia s'a impus ca un prețios auxiliar al omului de știință. Placa fotografică s'a arătat dela început a fi un înregistrator al unui domeniu de radiații mai restrîns decît al ochiului omenesc, în special spre radiațiile roșii, care nu impresioneau substanțele chimice întrebuintate. Cercetările asupra spectrelor hidrogenului pentru a se verifica teoria lui *Bohr*, au condus la obținerea fotografiilor în extremul ultraviolet. În această direcție, primele lucrări le-a efectuat *Helmholtz*, substituind plăcii fotografice un ecran fluorescent și întrebuintînd lentile de cuarț.

Un al domeniu unde fotografia a înregistrat succese, este domeniul razelor X. Ea a fost legată dela început de aceste misterioase raze, inaugurînd o serie

bogată de aplicații. Razele X și chiar radioactivitatea sînt două mari descoperiri care au fost îndeplinite datorite fotografiei. Am dat numai acest exemplu și, desigur, este suficient să se arate că, înregistrarea fotografică are o valoare de netăgăduit în cercetările de laborator. Și tocmai de aceea este o invenție de valoare, pentru că a putut fi una din cele mai prețioase colaboratoare în cercetările științifice.

Radiografiile — fotografiile cu razele X — în Medicină, în Fizică și în Tehnică au nesfîrșite și minunate întrebuințări. În Medicină, radiografiile servesc astăzi în mod curent ca mijloc de a diagnostica numeroase maladii. Prin fotografierea organelor ce nu se pot vedea și nici atinge, medicina s-a adîncit și s-a întărit poziția acolo unde era fără puteri. În metalurgie, fotografiile cu raze X au ajuns la o necesitate care le încorporează în însăși metodele de fabricație.



Radiografia unei mîni
obținută chiar în primii ani (1897)
după descoperirea razelor X.



Fotografie cu raze infra-roșii. (Clișeu Calzavara).

Cunoașterea mărimii cristalilor unei piese metalice este de primă importanță. În afară de această problemă se fac studii sistematice pentru a se determina tensiunile interne, genul structurii metalului, cunoștințe necesare fără de care astăzi nu se mai poate trece la directa utilizare. Prin ajutorul dat de către fotografie, aviația și-a putut construi motoare de o precizie și de o siguranță perfectă.

Dificultăți mari s'au ivit în rezolvarea fotografiei cu radiațiile roșii și infra-roșii. Aceste radiații de lungimi mari de undă au o putere foto-chimică ce se înregistrează la alte substanțe, ceea ce împiedecă rezolvirea acestei probleme în același timp cu a ultra-violetului. Sensibili pentru radiația roșie, s'au găsit a fi unii coloranți din familia cianinelor. Plăcile obținute cu această substanță sînt sensibile pentru întreg spectrul vizibil. Continuîndu-se cercetările în aceeași direcție a coloranților s'a putut obține fotografii în infra-roșul cel mai înaintat. Plăcile sensibile pentru acest domeniu de radiații sînt preparate numai la cerere, deoarece proprietățile lor nu se păstrează decît cîteva zile și numai la temperaturi joase. Pentru a se fotografia cu aceste plăci, se așează în fața obiectivului aparatului un filtru, care nu lasă să treacă decît radiația infra-roșie. Aplicațiile fotografiei în infra-roș sînt pe cît de utile, pe atît de in-

teresante. În Fizică cît și în Astrofizică, studiul spectrelor a putut fi extins, iar unele nebuloase gazoase au putut fi descoperite numai cu astfel de fotografii. Medicina și Biologia s'au îmbogățit cu noi mijloace de cercetări, pe baza fotografiilor în infra-roșii. Pielea, clorofila, chitina sînt transparente la infra-roș, proprietate ce n'a rămas inutilă în cercetările științifice. Arheologia a apelat și dînsa la aceeași metodă, iar tehnica motoarelor cu combustie internă, în studiul distribuției temperaturilor în diverse piese, a primit ajutoare de necontestat. În special, în fotografia aeriană întrebuințarea radiațiilor infra-roșii a început de cîțiva ani, a avea o mare desvoltare. Plăcile sensibile pentru infra-roș pot prinde imaginele dela mare distanță, căci vîlul atmosferic format din minusculele particule din aer, ce se întilnește în fotografia normală împiedecînd astfel să se obțină fotografii clare dela depărtare, nu există pentru infra-roș. În această situație, izvorul luminos îndepărtat este împiedecat să emită altfel de radiații, decît cele de lungimi mari de undă. Obiectele luminate în infra-roș, deși invizibile pot fi fotografiate. Acest fapt poate servi în unele transmisii de televiziune și mai ales în unele trucaje cinematografice.

În cercetarea bolții cerești, fotografia a avut un rol fundamental în crearea



Fotografia lunii.
(Observatorul din Paris).



Fotografia cursului unui rîu.
(Isar, Bavaria).

unei noi ramuri, a Astrofizicei. Ridicarea hărții fotografice a cerului poate fi considerată ca unul din rezultatele cele mai demne ale activității astronomice.

Geodezia și Topografia au întrebuințat din plin fotografia. Locurile puțin accesibile au putut fi determinate cu exactitate prin fotografieri aeriene. În studiul proceselor fizice ale scoarței pămîntești — eroziunile ghețurilor, cursurile de apă, încrețiturile — fotografia aeriană, fotogram-metria, a tras concluzii definitive; deasemenea Mecanica, care a izbutit prin metoda fotografică, să studieze unele mișcări esențiale. Optica, dar mai ales Fizica nouă, sînt, fără exagerare, mari beneficiare ale metodei fotografice. Studiul spectrelor, ultimele descoperiri cu ajutorul camerei lui Wilson — a neutronului și pozitronului — sînt exemple care ne scutesc de a mai adăuga vreun comentariu.

Studiul luminii invizibile, a microbilor, a țesuturilor, a structurilor crista-

...au suferit evoluții esențiale datorită aceleiași metode, Microfotografiile — obținute cu ajutorul microscopului și a aparatului de fotografiat — au atît pentru cercetătorii Biologiei, cît și pentru metalografii, o valoare fundamentală, cîci fotografia are posibilitatea să verifice și să descopere acolo unde ochiul omenesc este deformat.


Aplicații importante ale fotografiei. Una din aplicațiile fotografiei de cea mai mare importanță, care a cucerit lumea întreagă, este cinematograful. Prin istoria ei, ne spune cît dăruiește fotografiei această invenție atît de seducătoare. Marey — în urma diverselor încercări ale multor persoane — a avut ideea, pe la 1882, să descompue, prin fotografiere, mișcările prea repezi ale ființelor vii, pentru ca ochiul să le poată urmări. Metoda aceasta numită *cronofotografie* a dus cîțiva ani mai tîrziu, în 1895, datorită fraților *Lumière*, la crearea cinematografului. Cinematograful, ca și radiofonia, a pătruns în sufletul și în preocupările oamenilor, așa încît astăzi cinematograful constituie fermentul unei mari industrii și a unei delectări fără seamăn. El este un organ de informații pentru cele mai variate știri și un instrument de documentare mai sugestiv decît o carte. Priveliștile din țările îndepărtate, tot felul de fenomene ale naturii, întîmplări demne de atenție sînt aduse să se desfășoare în fața ochilor noștri, cu aceeași fidelitate, ca și cum o putere magică le-ar repeta aievea. Istorii și cronici din trecut pot fi actualizate



Fotografia drumului electronilor în camera Wilson.



Studiul foto-elastic al corpurilor



Fotografia infinitului mic.
(Tripanozoma boalei somnului în sînge de șoarece).

cu cea mai perfectă verosimilitate. Faptelor mărețe, cum sînt neînfrișatele ascensiuni sau expediții în părțile puțin cunoscute ale globului, le putem fi martori, simțind aceleași emoții ca 'n fața realității. Iar tot ceace poate imagina spiritul omenesc — călătorii interplanetare, fapte temerare sau invenții irealizabile — cinematograful ni le reconstitue și ne minunează.

Cinematograful, pe lîngă importanța sa socială și economică, constituie un

remarcabil instrument în cercetările științifice. Analiza diverselor fenomene care ar fi rămas în umbră încă multă vreme, a adus un progres vădit în domeniul cunoștințelor umane. Microscopul ne dă imaginea lumii invizibile. Cu ajutorul



Studiul rocilor prin fotografie.
Cupru nativ în limonită.

cinematografului s'a izbutit să se urmărească numeroase probleme, și să se înregistreze, din lumea microorganismelor. Ideia aceasta datorită lui Comandon, nu numai că relevă fenomenul, dar — înregistrarea putînd fi accelerată sau încetinită — această microcinematografie dă posibilitatea de a avea desfășurarea fenomenului în timp, după o iuțeală voită, oricare ar fi durata lui. Cinematograful lui Comandon permite să se urmărească creșterea unei plante, evoluția unei culturi microbiene, distrugerea microbilor de către leucocite, dezvoltarea oului, indiferent dacă timpul de dezvoltare a fenomenului este mic sau mare, căci dispozitivul lui poate servi de microscop sau telescop al timpului, prin variația de înregistrare a aceluia fenomen.

Aceiași utilizare de înregistrare cu cinematograful s'a folosit cu mare succes în studiul păturilor superioare ale atmosferei solare. Grație unui ingenios aranjament, Lyot,

prin 1930, a putut masca discul solar, și astfel să fotografieze și să urmărească fenomenele cromosferice. Ce impresionant este acest fapt, dacă ne gîndim că fotografia a făcut posibil studiul unor fenomene la imensa distanță de 150 milioane de kilometri.

Nu numai filmul, dar și sonorizarea lui a putut fi posibilă tot cu ajutorul fotografiei. În adevăr, înregistrarea sunetului a fost readusă la înregistrarea pe film a unei raze de lumină, a cărei intensitate variază proporțional cu înălțimea sunetului corespunzător. Evident că această fotografiere a imaginilor sonore a întîmpinat greutăți mai mari decît la imaginile luminoase obișnuite. La aceste imagini sonore contrastul între diversele tonuri ce corespund nuanțelor de sunet, joacă un mare rol în fidelitatea reproducerii sonore, căci urechea este cu mult mai exigentă. Cu toate acestea, eforturile științei în materie de cinematografie n'au fost zadarnice, iar tehnica avansată de astăzi a dus la construirea unor aparate înregistratoare cît se poate de perfecte.

O altă aplicație impresionantă a fotografiei este aceea a obținerii imaginilor în culori naturale. Incercările de a se obține fotografii colorate, reproducînd astfel cu mai multă fidelitate natura, au pornit din entuziasm. Pînă la începutul acestui veac, fotografia pasionase multe spirite inventive, încît am putea spune că, între 1869 și 1910 a fost perioada eroică a fotografiei. În această vreme s'au realizat cele mai mari succese. Fotografia în culori este și ea una din problemele desbătute multă vreme. Putem spune că a fost rezol-



Fotografia unui fulger.

ată pe deplin, dar n'a căpătat orizonturi largi, pentru că nu este accesibilă în aceeași măsură ca fotografia unicromă.

Prima încercare datează dela 1848, când *Edmond Becquerel* obține pe o placă de argint acoperită cu subclorură de argint, toate culorile spectrului prin expunerea la lumină. Imaginele colorate căpătate prin acest procedeu, se alterează cu ușurință la lumină. Aceleași încercări le face *Niepcé de Saint-Victor* și *A. Poitevin* care obține colorații pe hirtie. În 1868, *Charles Cros* și *Ducas du Ronron*, independent unul de altul, au ajuns la o soluție multumitoare cu procedeul numit *tricolorie*, și care a rămas pînă astăzi soluția industrială. Acești autori admit că, culorile spectrului se readuc la trei culori fundamentale—roșu, galben și albastru—din a căror combinație se obține albul. Combinate două câte două aceste culori se obțin trei nuanțe complementare: portocaliu, verde și violet. Imaginea de reprodus este fotografiată pe trei clișee separate, fiecare clișeu fiind impresionat de una din culorile fundamentale, fără însă a fi colorat. Astfel unul din clișee va fi impresionat numai în părțile din care imaginea emite radiații roșii, al doilea va reproduce părțile ce trimit spre clișeu radiații galbene și al treilea albastre. Proba pozitivă colorată se poate obține în două moduri: se proiectează aceste trei clișee astfel ca să se suprapună imaginile, fiecare fiind luminat de radiația care l-a impresionat. Pe ecranul de proiecție se va obține imaginea sintetică colorată în toate culorile, ținându-se seamă că vor apărea și culorile complementare. În al doilea procedeu, se realizează cu hirtii sensibile speciale, trei copii monocromatice, respectiv roșie, galbenă și albastră, cu cele trei clișee. Prin suprapunerea acestor imagini pozitive, se obține prin transparență imaginea colorată.

Profesorul *Gabriel Lippmann* a pus la punct, în 1891, o altă metodă pentru obținerea fotografiilor colorate—bazată pe principiul interferențelor—care s'a dovedit a fi remarcabilă atât prin rapiditate cît și prin finețea tentelor. Se realizează în modul următor: pătura sensibilă a clișeeilor este din colodion. Când se impresionează, radiațiile traversează sticla și pătura sensibilă și se reflectă pe o suprafață de mercur în contact cu pătura sensibilă. Razele reflectate interferează cu cele directe în interiorul păturii, producînd o serie de puncte luminoase și întunecoase, a căror repartitie depinde de lungimea de undă a radiației care a impresionat. Placa, dezvoltată în modul obișnuit, este privită în anumite condiții de iluminare dînd senzația de colorare.

Metoda care pare să fie aplicată cu mai multă ușurință, a fost imaginată de frații *Lumière*, în 1907. Plăcile preparate de acești inventatori, numite *autochrome*, se pot utiliza ca și cele obișnuite, cu aceleași aparate fotografice, ci iese a fi ca această metodă să fie cea mai răspîdită. Plăcile sînt preparate în felul următor: pe o placă de sticlă, acoperită cu un vernis cleios, se presară grăunțe foarte mici de amidon, colorate unele în roșu, altele în violet și altele în verde. Acest mozaic microscopic este acoperit cu emulsia sensibilă. Expunerea se face astfel ca lumina să traverseze mai întâi granulele colorate și apoi să ajungă la pătura sensibilă. Fenomenele se petrec astfel: presupunem că placa este impresionată de o rază verde; aceasta va fi absorbită de grăunțele colorate complementare—violet și portocalii—și lăsată să treacă prin cele verzi, unde va impresiona emulsia. După ce se dizolvă cu un reactiv argintul redus din fața granulelor verzi, se expune la lumină; de astădată placa va fi impresionată sub granulele violet și portocalii, unde emulsia și-a păstrat sensibilitatea. Rezultatul este că s'a obținut o imagine pozitivă colorată în verde. În același mod lucrează și celelalte culori. Astăzi metoda a căpătat suficientă simplificare în aplicații, ca și o mare sensibilizare, astfel ca să se obțină o nuanță cît mai fidelă a culorilor naturale.

Fotografia a găsit atît de multe aplicații și în atîtea domenii, încît este imposibil a le cita, decît doar pe cele mai caracteristice.

Astfel cu așa numitul *cilindrograf*, imaginat de *Moëssard*, se poate obține dintr'o singură operație fotografierea unui orizont întreg. Cilindrografele aduc servicii imense în obținerea fotografiilor aeriene, de mare utilitate în aviație, mai ales în timp de război.

În materie judiciară, începînd de pe la 1882, fotografia este un auxiliar prețios. În deslegarea crimelor sau accidentelor, în reproducerea documentelor de expertiză, cît și în confecționarea fișelor antropometrice, fotografia are o valoare indiscutabilă.

Fotografiile la mare distanță — *telefotografiile* — luate cu ajutorul unei lu-



Fotografia amprentelor digitale

nete la ocularul căreia se fixează o cameră fotografică — dispozitiv imaginat de colonelul *Laussedat* în 1860 — sînt de o întrebuințare curentă în astronomie și în operațiile de război. Pentru acest gen de fotografii, plăcile sensibile la infraroș dau rezultate de mare valoare.

Ca mijloc de ilustrare a cărților, fotografia nu are un rol mai puțin important decît tiparul însuși. Arta cărții a fost desăvîrșită tocmai prin fotografie. Cartea a ajuns astfel să fie mai atrăgătoare și mai comprehensibilă.

Marile cotidiene — cum sînt *Petit Parisien* sau *Excelsior* deoparte și *Daily Mail* de altă parte — sînt legate prin circuite telefonice pîna care se pot schimba fotografii. Reportajele de actualitate capătă în felul acesta un mai mare interes. Dacă textul este transmis din Franța în Anglia, sau invers, cu cea mai mare grabă datorită rețelei telefonice, fotografia a isbutit să transmită imaginea în același sbor.

Nu se poate vorbi astăzi de înregistrările de imagini, fără a ne gîndi la fotografie. Se pot obține fotografii pe sticlă, pe metale, pe porțelan, a căror tehnică este atît de perfecționată, încît devin podoabe demne de toată admirația.

În afară de nenumăratele aplicații ale fotografiei, dar chiar industria fotografică ocupă un loc important în economia multor țări. Vastele laboratoare de produse fotochimice, uzinele mărețe din care iese aparatura de fotografiat, și în special de cinematograf, ocupă în activitatea unei națiuni poziții asemănătoare cu ale industriilor metalurgice.

Fotografia este un auxiliar prețios al artistului și agreabil al amatorului. Și într'o fotografie vom găsi, în afară de elementul vizibil, un element invizibil pe care îl simțim că apare din formele, liniile și nuanțele ce le privim. Aparatul fotografic — lipsit evident de personalitate estetică — dă imaginile de un realism exact, rece, cu detalii, adesea fără interes și inutile. Totuși, fotografia poate fi un instrument admirabil de înregistrare fidelă a colțurilor artistice ale naturii, atunci cînd acel care operează poate alege pitorescul, și poate



O fotografie poate fi tot așa de plăcută ca și o pictură.

înțelege și simți armoniile ce ne inconjoară. Fie un peisaj, fie o scenă, fie un portret, fotografia le poate înregistra cu măiestrie, fără de nici o alterare, atunci cînd cel care alege este și artist și psiholog.

Din cele expuse se poate vedea cu ușurință, că ansamblul metodelor fotografice — care se leagă de toate ramurile cunoștințelor omenești — constituie și o știință, și o industrie și o artă. Paginile acestea retrospective au, prin urmare, deplina legitimitate.

Cîteva cuvinte despre fînețele și pășunile din munții Bistriței¹⁾

de

MIHAI RĂVĂRUȚ

Asistent la Facultatea de Științe din Iași.

Este știut faptul că 80% din populația României o formează pătura țărănească, care în marea ei majoritate se ocupă cu agricultura și creșterea vitei. Astfel stînd lucrurile produsele agricole și cele animale, reprezintă unul din cele mai importante capitole din economia noastră națională. Se impune deci ca acestor ramuri de activitate să li se dea atenția cuvenită și mai ales să se purceadă cît mai de vreme la organizarea lor, avînd în vedere că orice întârziere aduce pentru stat pagube incalculabile. Dacă pentru îmbunătățirea agriculturii se lucrează intens în ultima vreme, nu putem spune același lucru și despre creșterea vitelor. Din punctul acesta de vedere sîntem foarte înapoiți și dovezi avem la fiecare pas.

Putem spune cu toată siguranța, fără teamă de a greși, că la noi în țară animalele sînt cît se poate de prost îngrijite, atît din punct de vedere al alimentației cît și din punctul de vedere al adăpostului.

Pentru ca animalele să fie bine alimentate se cere neapărat ca fînețele și pășunile să fie de cea mai bună calitate posibilă. Fînețele procură hrana pentru iarnă sub formă de fin, iar pășunile alimentează animalele în timpul verii. În cele ce urmează voi spune cîteva cuvinte despre modul cum se prezintă fînețele și pășunile din Munții Bistriței și cam ce s'ar putea face pentru ameliorarea lor. Despre fînețe și pășuni s'a scris mult în ultima vreme. Alarma în celeace privește degradarea completă a pășunelor noastre, au dat-o inginerii silvici. Lucrurile s'au petrecut astfel. După război „creșterea vitelor“ a luat o dezvoltare mare și crescînd numărul animalelor, pășunea a devenit insuficientă. Țăranii, în loc să îngrijească și să amelioreze pășunea existentă, au cerut desfrînarea pădurilor pentru a se mări suprafața de pășunat. Rezultatul a fost că s-au pierdut zeci de mii de hectare de pădure, fără ca prin aceasta să se aducă vre-o îmbunătățire la hrana vitelor. Din această cauză silvicultorii și o parte din agronomii noștri, care au văzut dezastrul ce ne amenința, au dat alarma arătînd că trebuie ameliorate pășunile pentru ca pădurea să fie salvată. Ca urmare a marei greșeli ce s'a făcut prin tăierea pădurilor pentru pășune, vedem și azi și vom mai vedea încă multă vreme, munți întregi goi, care nu

1) Conferință ținută la una din ședințele Soc. Geografice „D. Cantemir“ din Iași în cursul anului 1939.

mai au nici copaci, dar nici pășune nu se pot numi, ci mai curînd o aglomereare de rîpi, formate de torenții ce au spălat tot solul productiv. Din această cauză reîmpăduririle se fac cu foarte mare greutate,

Populația ce trăiește la poalele M-ților Bistriței, în cea mai mare parte se ocupă cu creșterea vitelor, deoarece pămînt pentru cultură este foarte puțin. O mică parte din ei trăiesc din plutărit.

Vitele țaranilor din această regiune sînt crescute pe munte. Golurile de munte mai sus de limita superioară a pădurii formează pășunile, iar poenile din interiorul pădurii, precum și golurile dela limita inferioară a acesteia, constituie finețele, care primăvara sînt păscute cam pînă la Sf. Gheorghe.

Aceste finețe acopăr suprafețe destul de mari. Astfel pe *M-tele Ceahlău* se găsesc finețe pe *Obcina Verdelui*, *Chica Baicului*, *Isvorul Muntelui*, *Obcina Clucanilor*, a *Didionului*, pe *Boiște*, pe *Făgețel* etc. Cu toate acestea cantitatea de fin recoltată de pe finețele de mai sus, este cu mult mai mică decît ar trebui și nu tocmai de calitate superioară.

Cauzele sînt următoarele: în primul rînd nimeni dintre proprietari nu s'a gîndit vre-odată că aceste finețe de munte au nevoie de îngrășăminte.

În fiecare an solului acestor finețe i se iau o mulțime de substanțe, fără ca în loc să i se dea ceva. În felul acesta solul a sărăcit și nu mai poate da o producție superioară de fin. Dacă li s'ar da îngrășămintele necesare finețelor, ele ar produce incomparabil mai mult, mai ales că aicea la munte nu se pune problema secetei.

Sînt unele din aceste finețe unde predomină plante care nu sînt din cele mai bune specii furajere. De dorit ar fi ca pe aceste locuri să se formeze finețe artificiale alcătuite din specii ce dau un fin de calitate superioară.

Dealtfel problema finețelor artificiale preocupă în deaproape pe unii dintre agronomii noștrii. Mai pe toate finețele dela munte, la suprafața solului, există o pătură fină formată din diferiți mușchi, mai ales specii de ale genului *Hylocomium*. Această pătură de mușchi nu permite regenerarea normală a plantelor și nici aerisirea solului nu se poate face în condiții bune. O bună parte din micile plante sînt asfixiate de această pătură de mușchi. De aici nevoia ca finețele să fie grăpate spre a fi îndepărtați acești mușchi. Grăparea trebuie să se facă cu multă prudență, căci se poate ca în timpul acestei operații, să se distrugă și rădăcinile plantelor existente. E recomandabil ca după grăpare, să se arunce pe finăț semințe de diferite plante furajere ce cresc pe el.

Grăparea trebuie să se facă primăvara sau toamna tîrziu.

Pe foarte multe finețe se găsesc suprafețe mocirloase unde crește o floră specială, care constituie nutrețul de cea mai inferioară calitate și care adeseori este refuzat de animale. Pe aceste porțiuni umede cresc *Carexuri*, *Juncus*, *Eriophorum*, *Scirpus* etc., formînd adeseori asociații tipice.

Toate aceste suprafețe trebuiesc drenate și în felul acesta cu timpul acolo vor crește plante cu adevărat furagere. Finețe umede se găsesc numeroase pe *M-ții Bistriței*, dintre care unele de sute de metri patrați, cum sînt cele de pe *Slopăț*, *Chica Baicului* și mai ales *Isvorul Muntelui*. Sînt suprafețe de acestea, care ar putea fi uscate printr'un simplu șanț dînd astfel apei posibilitatea de a se scurge. Din cauza apei de infiltrare pe unele finețe există adevărate alunecări. Așa de exemplu pe *Isvorul Muntelui* (*Ceahlău*) se găsesc anumite porțiuni care lunecă către pîriul cu acelaș nume. Din cauza lipsei de șanțuri pe vremea ploilor torențiale, finețele de pe *Isvorul Muntelui* adeseori sînt inundate, astfel că nu se mai poate recolta aproape nimic, mai ales dacă inundarea s'a produs cînd iarba era ajunsă la maturitate.

Calitatea finului este foarte mult micșorată din cauza numeroaselor burueni și plante toxice ce cresc pe finețe. Astfel pe cea mai mare parte din finețele dela munte se găsesc diferite specii de *Cirsium*, *Carduus*, *Veratrum*, apoi cantități enorme de *Colchicum autumnale* etc. Sînt finețe unde această din urmă specie ajunge dominantă, așa cum se poate vedea pe finețele umede de lingă schitul *Rarău și Durău*. Contra tuturor buruenilor și plantelor toxice de pe finețe, trebuie dusă cea mai aprigă luptă. În primul rînd aceste specii trebuie tăiate atunci cînd sînt în plină floare, înainte de a fructifica. Se vor usca și apoi li se va da foc. Procedînd în modul acesta în cîțiva ani buruenile anuale și bisanuale dispar. Deasemenea și prin îngrășarea finețelor dispar multe plante nefurajere.

Lupta este ceva mai grea cu plantele perene, care nu pot fi stîrpite chiar așa de ușor, mai ales pe finețele degradate, unde acestea s'au instalat în cantități mari. În asemenea cazuri, se recomandă pășunatul finațului cel puțin 2-3 ani. Una din greșelile cele mai mari ce se face la recoltarea finului de munte, greșală ce scade enorm de mult calitatea lui, este cositul tîrziu. Am văzut adesea la munte finețe necosite prin a doua jumătate a lunii August. Finul recoltat la această dată are o valoare nutritivă foarte scăzută. Un finaț trebuie cosit atunci cînd a ajuns în plină floare specia dominantă, adică specia care are cel mai mare grad de acoperire. Orice întîrziere nu face altceva decît să micșoreze foarte mult substanțele albuminoide din fin, substanțe de care vitele au atîta nevoie. Frunzele la o bună parte din plantele faragere, în asemenea întîrzieri sînt aproape dispărute și nu rămîn decît tulpinele uscate cu o valoare nutritivă foarte mică.

Finul cosit tîrziu, nici nu poate fi uscat cum se cade, din cauză că nu mai sînt căldurile din toiu verii și apoi la munte către toamnă încep acele ploii interminabile.

În multe locuri finețele sînt pășunate primăvara în mustul omătului, cînd abia a dat colțul ierbii. Este un procedeu greșit căci, pe deoparte pămîntul fiind moale rădăcinile plantelor sînt distruse prin călcare, iar pe de altă, iarba nu trebuie păscută atunci cînd abia a început a încolți. Datorită celor spuse mai sus mai toate finețele din *M-ții Bistriței*, ca de altfel o bună parte din finețele de munte, nu dau maximum de producție pe care l-ar putea da în cazul cînd ar fi îngrijite. Din această cauză se simte lipsa acelui aliment așa de valoros—finul. Și atunci se recurge la un aliment inferior—paiele—care pe alocuri formează baza alimentației animalelor. Cu un asemenea aliment nu putem avea pretenția ca animalele noastre precum și produsele lor să fie de calitate superioară.

În ceiace privește pășunile, acestea ocupă suprafețe foarte întinse pe vîrfurile munților înalți, începînd dela limita superioară a pădurii, deci cam dela 1650 m. în sus. Asemenea pășuni se găsesc pe *M-ții Ceahlău, Budacu, Intre Borci, Bușmeiul, Grințieșu, Hălăuca, Pietrosul Broștenilor, Rarău, Giumalău, Călimani* etc. Din punct de vedere nutritiv, aceste pășuni sînt de calitate cu totul inferioară din cauzele ce le voi arăta în cele ce urmează.

În primul rînd pe întinderea acestor pășuni, cresc foarte numeroase plante care nu au absolut nici un rol nutritiv, ele fiind refuzate de animale. Unele din aceste plante sînt chiar otrăvitoare și deci periculoase.

E drept că se pot observa cîteodată animale care mănîncă frunzele și inflorescența dela *Veratrum album* (Sterigoaie), o plantă foarte rea la gust și otrăvitoare, dar aceasta o fac din cauza foamei atunci cînd nu au la îndemînă alte plante de nutreț. Stîrpirea tuturor buruenilor nefolositoare și a celor to-

xice ar trebui făcută chiar de către păstorii ce păzesc animalele pe munte. Operația este foarte ușoară și aceste plante trebuie distruse înainte de a fructifica. În modul acesta în locul lor se vor instala cu timpul plante bune de păscut.

Distrugerea plantelor ca *Veratrum*, *Cirsium*, *Gentiana Aconitum*, *Doronicum*, *Telekia*, *Adenostyles* etc. trebuie făcută cât mai neîntârziat, căci ele pe alocuri ocupă suprafețe destul de mari. Aproape pe toți munții citați mai sus, există câteva plante cari ocupă o bună parte din pășuni, reducând considerabil valoarea nutritivă a acestora. Aceste plante sînt, *Juniperus nana* (Jenuper), *Pinus pumilio* (Jneapăn, Cățun) diferite specii de *Vaccinium* (Afin, Merișor) precum și diferite specii de mușchi aparținînd genurilor *Polytrichum* și *Sphagnum*. La acestea se mai adaogă și cîțiva licheni ca *Cetraria* și *Cladonia*. Acolo unde cresc plantele acestea, nu e posibil să mai crească și plante de nutreț și valoarea pășunii pe alocurea este redusă la zero.

Juniperus nana și *Pinus pumilio* în creșterea lor se întind pe suprafața solului formînd o încilcitură de ramuri sub care nu pot rezista decît *Vaccinium myrtillus*, *Homogine alpina*, *Adenostyles*, *Doronicum*, toate plante fără vre-o valoare nutritivă. *Juniperus* ocupă suprafețe destul de mari pe Ceahlău la Ocolașul mic și în spre Turnul Butului. În cantitate mai mică se găsește și pe Pietrosul Broștenilor, Giumalău și Călimani.

Cît despre *Pinus pumilio* el ocupă suprafețe mult mai mari. Astfel la Ceahlău se găsește între Piatra Lată și Panaghia, pe partea de Est a Lespezilor, apoi spre Detunata, Ocolașul Mare și Gardul Stănilor. Suprafețe enorm de întinse ocupă această plantă pe munții Călimani, în special pe Călimani Izvor și Cerebuc. Pentru extirparea completă a lui *Juniperus* și *Pinus* atît de dăunătoare pășunii, nu e suficientă numai munca păstorilor, ci aici trebuie să intervie și locuitorii satelor cărora aparține pășunatul acestor munți. Procedul cel mai nimerit este tăerea lor dela suprafața pămîntului, adunarea în grămezi mari și apoi să le dea foc. Focul trebuie supravegheat îndeaproape spre a nu se întinde asupra pădurii. Pe alocuri s'a încercat extirparea acestor plante, dîndu-li-se foc fără a mai fi tăiate. Rezultatele nu sînt mulțumitoare pentru că nu ard decît ramurile cu frunze.

Lupta este și mai grea cu speciile de *Vaccinium*, de mușchi și de licheni. Ele formează o țesătură foarte deasă la suprafața solului, țesătură care este greu de distrus. Unde se instalează aceste plante, din cauza umezei și a lipsei de aer, substanțele organice nu se pot descompune în mod normal și complet și de aici rezultă o pătură de humus acid care nu prieste altor plante.

Speciile de *Vaccinium*, precum și mușchii și lichenii de care am amintit mai sus, ocupă suprafețe foarte mari aproape pe toți munții Bistriței.

La Ceahlău ocupă mai tot Ocolașul Mare, o bună parte dintre Ocolașul Mare și Turnul Cracii, versantul de sud al Jghiabului lui Vodă precum și o parte din Pictorul Șchiop. Pe muntele Budacu, Giumalău și Călimani pe alocuri aceste plante ocupă peste 50% din suprafața pășunii. Cu toate că stîrpirea lor cere multă muncă, totuși lupta trebuie începută, avînd în vedere că prin îndepărtarea lor s'ar reda pășunatului suprafețe foarte mari.

Pe pășuni ca și pe finețe se găsesc anumite porțiuni mocirloase unde se instalează o floră fără valoare nutritivă. Aceste porțiuni trebuie să fie drenate pentru ca scurgîndu-se apa, cu timpul să se transforme în pășune bună. Dease-menea ar fi bine ca acolo unde este posibil pășunea să fie grapată pentru ca să fie îndepărtați mușchii dela suprafața solului. Mai pe toate pășunile munților noștri vedem, din loc în loc, niște pîlcuri unde cresc, în cantitate mare, diferite

buruieni ca : *Urtica dioica*, specii de *Rumex*, de *Sisymbrium*, *Cirsium*, etc. Acestea sînt niște porțiuni de pășune degradată prin faptul că acolo au fost strungile într-un timp îndelungat.

Este o mare greșală ca strungile să stea mai mult timp în acelaș loc. În primul rînd, toată iarba este arsă și după mutarea strungilor nu vor crește decît buruienile amintite mai sus.

Strungile ținute mult timp în același loc, devin adevărate focare de murdărie, care adesea îmbolnăvesc oile. O strungă nu trebuie să stea în acelaș loc mai mult de 2-3 zile. În felul acesta, pe deoparte se evită murdăria și degradarea pășunii, iar pe de altă parte locul unde stă strunga numai 2-3 zile devine suficient îngrășat pentru ca acolo să crească o floră cu adevărat furageră, dispărînd o bună parte din burueni.

Porțiuni de pășune degradate prin strungi de lungă durată se pot vedea mai pe toți munții. La *Ceahlău* se găsesc la *Dochia*, *Varatec*, *Stănila*, *Piatra cu Iod*, *Valea Bistrei*, etc. Ar fi bine ca aceste porțiuni degradate să fie cîțiva ani sămănate cu cartofi sau diferite legume necesare păstorilor, iar după asta să se însămînțate specii de plante furajere.

Dealtfel n'ar fi rău ca să se sămenează seminte de plante furajere și în alte porțiuni de pășune, unde iarba este slabă și de proastă calitate. Procedul este simplu. Se alege o porțiune de pășune bună, formată de plante furagere de primul ordin, se lasă să fructifice și apoi se cosește. Finul acesta ce conține și semințele mature ale speciilor ce voim a le însămînța, îl împrăștiem pe porțiunile care trebuiesc ameliorate.

O altă mare greșală care se face în modul de pășunare, greșală de pe urma căreia scade valoarea pășunii, este aceea că se păște deodată toată suprafața ei. Păscîndu-se deodată toată pășunea, o mare parte din iarba este mâncată și murdărită de animale, iarba care mai tîrziu este refuzată la păscut. Pentru a se evita acest lucru, e bine ca să se împartă pășunea în mai multe porțiuni, care să fie păscute pe rînd. Este așa numitul pășunat în „tarlale“. În felul acesta se dă ierbii posibilitatea de a se reface. Deaseamenea nu este recomandabil ca o pășune să fie păscută numai cu oi. Acestea lasă anumite porțiuni de iarba lungă nepăscute, care formează niște ridicături, ce pe alocuri poartă numele de „tîrsoc“. Trebuie să se facă o rotație, în ceiace privește pășunatul, oile urmînd după bovine.

Tot în ameliorarea pășunilor de munte ar mai intra și îndepărtarea pietrelor și grohotișurilor ce se găsesc în anumite locuri. Numai pe *Ceahlău*, în timpul verii, zeci de oi sînt ucise sau rănite de pietrele rostogolite în vale de mare oile ce se găsesc în fruntea turmei. Cu aceste pietre, acolo unde este posibil, s'ar putea reface potecile, atît de necesare pe munte.

Aproape pentru toate ameliorările pășunilor, se cere ca ele să fie străbătute de o rețea de drumuri și poteci practicabile. Ori, din acest punct de vedere, munții noștri stau cît se poate de prost. *Ceahlăul*, regele munților Moldovei și unul din cei mai pitorești munți din România, are drumuri și poteci foarte rele, deși în fiecare vară este vizitat de mii de turiști Romîni și mai ales străini. Sperăm că într'un viitor cît se poate de apropiat, Oficiul Național de Turism va rezolva această problemă, aducînd în felul acesta venituri neamprite.


Munții *Călimani*, *Giumalăul* și *Pietrosul Broștenilor* sînt aproape lipsiți de asemenea poteci. Ceva mai bine stă masivul *Budacu* și munții din jur, căci acolo s'au făcut multe drumuri de către armatele rusești în timpul războiului.

Dar, în cei douăzeci de ani dela război, nimeni n'a mai contribuit cu nimic la întreținerea acestor drumuri, care în multe locuri au fost distruse de torenți.

Tot în cadrul ameliorării pășunilor intră și îngrijirea izvoarelor. Cea mai mare parte din izvoarele dela munte sînt lăsate în voia soartei. Nefiind uluce din care să bea animalele, acestea fac în jurul izvorului noroi și murdărie, ce infectează adeseori și apa de băut. Ulucele sînt necesare și prin aceea că apa stînd în ele se mai încălzește puțin și în felul acesta e mai ușor băută de animale. Se știe că o apă rece sub 10°C poate îmbolnăvi vitele. Ca tip de izvor neîngrijit, citez pe cel dela *Ocolașul Mic* și dela *Polița cu crini* (Ceahlău).

Din cele spuse pînă aici, reese cred destul de clar, că toate pășunile din Munții Bistriței, sînt de calitate inferioară și aceasta din cauză că nu sînt deloc îngrijite. Cît despre viața pastorală din această regiune, putem spune că lasă mult de dorit. Pretutindeni stîni murdare și neîngrijite, unde principiile de igienă sînt neexistente, atît în ceea ce privește modul de trai al ciobanilor, cît și fabricarea brînzei. Sînt foarte puține acele stîni unde să existe un personal priceput și cîtuși de puțin specializat în fabricarea brînzei și din această cauză produsele acestor stîni sînt de calitate inferioară. Trebuie să lăsăm la o parte latura romantică a vieții pastorale și să privim lucrurile în față. Pretutindenea animalele sufăr de foame din cauza lipsei de pășuni bune, sufăr de frig din cauza lipsei totale de adăposturi, iar păstorii duc cea mai mizerabilă viață ce și-o poate închipui cineva. Trebuie să se purceadă cît mai neîntîrziat la organizarea vieții noastre pastorale. Să se facă stîni cum se cade, să se selecționeze și specializeze personalul, să se clădească adăposturi pentru animale unde să fie ținute și hrănite pe vremuri rele. Aceste adăposturi sînt necesare și pentru vitele bolnave, care în situația actuală sînt nevoite să parcurgă kilometri pe munte, pentru adunarea cîtorva fire de iarbă, cu care să-și astîmpere foamea.

Ca încheiere țin să spun că cea mai mare parte din pășunile de munte sînt supraincărcate de animale, față de coeficientul lor de productivitate. Ar trebui să se calculeze cîte animale pot fi nutrite pe pășunea unui munte, ținînd samă de calitatea ei și să nu se mai trimită la pășunat în număr așa de mare de animale, atîta timp cît mai bine de 50% din suprafața pășunii, nu poate fi utilizată ca atare, din cauzele arătate mai sus. Avem credința că în ritmul nou de viață din țara noastră, organele competente și însărcinate cu studiul acestor probleme, vor stabili pe teren ce trebuie făcut pentru ameliorarea ființelor și a pășunilor, care în faza actuală reprezintă pentru noi o rușine, iar pentru economia națională, pagube de miliarde.



Migrațiile peștilor euryhalini

Catadromi sau Thallasotoci

de

EUGEN A. PORA

Doctor în științe naturale. Asistent universitar

Dintre peștii catadromi, al căror număr este mult mai restrâns decât al celor anadromi, exemplul cel mai cunoscut este țiparul (*Anguilla*). Se mai pot adăuga aici și unele Mugilide, care în mod normal sînt locuitori ai estuarelor, limanurilor sau altor ape îndulcite din apropierea țărmului. În timpul perioadei de reproducere acestea emigrează în spre mare pentru a-și depune ouăle. Astfel sînt genurile: *Mugil*, *Chrysophrys*, *Labrax*.

E curios că raportul dintre anadromi față de catadromi este foarte mare. Peștii dulcicoli (adaptați secundar acestui mediu) s'au adaptat în mai mare număr vieții marine, decât animalele marine vieții dulcicole. Și trebuie să facem anumite considerații în analiza acestor fenomene.

Țiparul (fig. 7) a fost unul dintre cei mai misterioși pești pînă la începutul secolului actual. El nu se găsea decât adult în regiunile continentale. Nimeni nu a văzut ouă sau pui de țipari. Se cunoștea de altfel din vechime drumul descendent al adulților și pierderea lor în mare, dar nimeni nu știa unde se duc aceștia și ce fac acolo. Diferitele observații științifice ce încep încă din sec. al 17-lea, nu fac decât să ascundă în fapte concrete și mai complicate, viața acestui animal.



Fig. 7.
Țiparul (*Anguilla vulgaris* L.)
(d. Joubin și Robin)

Misterul țiparului a dăinuit aproape în întregime pînă în veacul actual, cînd nu mai începe a se ridica vîlul ce-l ascundea și pe care *J. Schmidt* îl înlătură aproape complet. Acest mare oceanograf danez, își consacră întreaga viață lămuririi acestei probleme dificile, pe care la urmă ajunge să o cunoască în întregime și să o arăte lumii în toată simplitatea ei, mai de necrezut chiar decât misterul de pînă atunci.

Iată viața acestui pește apod, așa cum se cunoaște astăzi (5).

Adulții trăesc în rîurile europene, americane sau asiatice (după spițe). Ajunși în desvoltarea lor aproape de epoca maturității genitale, animalele își îmbracă haina de nuntă, numită de *Schmidt* „livrée de migration”. Din gălbui-negricioase cum erau înainte, ele devin argintii, de culoarea metalului și se numesc țipari argintii („anguilles argentées”).

În nopțile întunecate ale primăverii țiparii scoboară rîurile, fac un anumit sta-giu de aclimatizare în gurile de vărsare ale acestora, apoi se tirăsc pe fundul Oc. Atlantic, sau la adîncimi destul de mari unde lipsește lumina (*Anguilla vulgaris*-europeană și *A. rostrata* americană), pînă în regiunea occidentală a Mării Sargasselor 22°—30° lat. N. și 48°—65° long. W); cele pacifice (*A. japonica*, *A. australis*, *A. auklandii*) se adună în apropierea coastelor Japoniei (unde Kuro-Siwo joacă același rol în diseminarea larvelor ca și Golf-Stream-ul atlantic) sau în apropierea coastelor australiene.

În această orientare se pare că e vorba și de un termotropism și de un rheo-

tropism pozitiv, dacă considerăm curentul Golfului ca un rîu cu temperatura tot mai crescîndă cu cît ne urcăm pe el în sus. Țiparul ar urca în contra curentului de apă din ce în ce mai caldă.

Vom analiza, pentru o mai ușoară înțelegere a faptelor, numai cazul țiparului european (*Anguilla vulgaris*), toate celelalte spițe comportîndu-se aidoma în ceia ce ne privește pe noi aici.

La adîncimi de peste 1000 m., în regiunea occidentală a Mării Sargasselor (în apropierea insulelor Bermude), și la temperaturi de peste 20° C., are loc fenomenul nupțial, în urma căruia adulții probabil că mor (vezi fig. 8). Aici este deci și leagă-nul și cimitirul țiparilor.

Din ouă ies niște larve de cîțiva milimetri, numite leptocefali. Pînă la *J. Schmidt* se credea că leptocefalii sînt o spiță sistematică cu totul diferită de țipar, de unde și numele lor deosebit (*Leptocephalus brevirostris*). Astăzi acest nume s'a păstrat, cu toate că identitatea sistematică este stabilită. Leptocefalii ce se găsesc în regiunea




Fig. 8.

Migrația leptocefalilor de *Anguilla vulgaris* spre coastele europene.

(d. Schmidt din Bertin)

vestică a Mării Sargasselor, aparțin la 2 spițe de țipari: *A. vulgaris*-europeană și *A. rostrata*-americană. Leptocefalii de *A. vulgaris* se îndreaptă spre Est, ajungînd în 2 ani la coastele europene. În acest drum ei se folosesc și de curentul golfului. Leptocefalii de *A. rostrata* se îndreaptă spre Vest, ajungînd într'un an la coastele Americii de Nord. Durata acestor drumuri este proporțională cu distanța centrului de depunere a ouălor față de coastele europene sau americane.

În decursul acestui drum leptocefalii sufăr anumite modificări chimice interne, însoțite de ușoare modificări morfologice, care le permit aclimați-

zarea în ape dulci. Tot drumul leptocefalii nu se hrănesc, astfel că ajunși la gurile rîurilor ei sînt foarte scăzuți ca greutate. Acest proces transformă leptocefalul în tineri țipari, numiți pui („civelles“). Și pe cînd erau suficienți 700 leptocefali pentru a da 1 kg., trebuiesc 3000 de pui pentru aceeași greutate.

Se întîmplă uneori ca leptocefalii de *A. vulgaris* să ia drumul spre Vest, spre America, dar ajungînd la coasta cu ape dulci într'un an, și transformarea lor nefiind încă atît de avansată ca să permită viața în ape îndulcite, mor. Invers leptocefali de *A. rostrata* ce iau din greșală drumul estic, în spre Europa, neajungînd într'un an — adică în timpul cînd metamorfoza lor a ajuns la stadiul de a necesita prezența apei îndulcite — la coasta, mor pe drum.

Aceste observații ale lui *Joubin* (29) arată cit de necesară este trecerea dintr'un mediu salin într'unul dulce, atunci cînd dezvoltarea individului a ajuns la un anumit stadiu.

Numărul leptocefalilor ce ajung la coastele europene desfide orice cifră. Nici înmulțirea extraordinară a unor insecte, nu se apropie de enorma abundență de pui de țipar, care invadează apele continentale. Dintr'o singură localitate a Franței s'au expedit într'o singură primăvară, peste 150 de milioane de indivizi pentru scopuri alimentare. Cîți vor fi cei care nu au putut fi prinși, cei consumați pe loc și mai ales cei veniți în alte locuri ale țărîmului european?

Odată ajunși la coastele europene, leptocefalii de *A. vulgaris* rămîn destul de multă vreme în apropierea țărîmului și în special în gurile de vărsare ale rîurilor. În

acest timp suferă cele mai însemnate modificări morfologice. Propriu zis aici larvele (leptocefalii) se transformă în pui (civelles) (vezi fig. 9).

Fontaine și Raffy (19) au studiat o serie de însușiri a puilor de țipari, când aceștia trec din apă de mare în apă dulce și au văzut că fenomenul este în funcție de importanță de integritatea păturei mucoase tegumentare și că nici pH-ul, nici cantitatea de oxigen extern nu sînt factori principali, ci salinitatea este schimbarea contra căreia animalul e chemat să se adapteze prin toată seria de mecanisme de care dispune.

Tot în timpul trecerii din larvă în pui, apar și solzii în pielea animalului. Aceștia însă rămîn toată viața închiși în piele și nu se exteriorizează, astfel că țiparul nu are un înveliș extern solzos. Prin acești solzi intradermici, țiparul se deosebește de celălalt pește apod, numit *Conger vulgaris*. După zonele concentrice de creștere a solzilor, se poate evalua și vîrsta indivizilor, tot așa ca și la somon.

Puii încep apoi a urca rîurile. Urcarea e un fenomen foarte curios. Puil de țipar au un fototropism negativ foarte accentuat. Ziua se împrăștie pe fundul apelor, în miluri, crăpături, printre plante. Noaptea însă se adună într'un cordon compact ce poate avea 1 m. lățime, $\frac{1}{2}$ m. grosime și cîțiva km. lungime. [*Roule* (42)]. Cordonul acesta trece peste tot felul de obstacole, cascade, baraje, ecluze, etc., și folosindu-se de cadavrele celor căzuți ca de niște trepte, puil de țipari ajung astfel să invadeze aproape toate apele continentale. Fenomenul de urcare al rîurilor începe primăvara.

Unii din pui rămîn toată viața în apele salmastre dela gurile de vărsare, sau în anumite mlaștini în legătură cu marea, aceștia vor da masculii; alții urcă rîurile pînă la maximum și vor da femelele. Trebuie notat că este o acțiune de mediu cea care determină sexele, care nu sînt preformate în pui. Probabil că acțiunea bromului — după părerea lui *Fontaine* — ar putea fi cauza acestui determinism.

Masculii din apele salmastre rămîn inferiori ca talie femelelor, astfel că putem spune că un țipar adult ce nu trece de 40 cm. lungime este sigur un mascul, pe cînd unul mai mare decît 50 cm. lungime este o femelă. Între 40—50 cm. lungime sînt atît masculi cît și femele.

În apele dulci ale rîurilor, sau în diferitele lacuri în legătură cu acestea, tinerii țipari devin adulți. Ei sînt animale care trec cu ușurință dintr'un lac în altul, chiar numai servindu-se de umezeala ierburilor din timpul nopții. Prin aceste mijloace ei se pot găsi chiar în ape care nu au nici o legătură cu rîurile, sau sînt izolate prin dealuri și munți, și ar părea inaccesibile acestor pești șerpi.

Trecerea din pui în adulți se face în decurs de cîțiva ani (5—7 ani) și în timpul acestei evoluții putem deosebi diferite studii de dezvoltare, care în apus au căpătat numiri diferite: „anguilles jaunes“, „anguilles argentées“ etc., după colorația pe care o ia animalul.

Larva adulții se înfundă în mîlul rîurilor sau al bălților, de unde nu ies decît primăvara următoare. În acest timp de hibernație metabolismul animalului este aproape suspendat și acest fapt se poate ceti și pe solzi (zonele hibernale de creștere).




Fig. 9.

Metamorfoza leptocefalului în pui de țipar. (civelle).

(d. o fotografie a lui Schmidt din Bertin)

Femelele odată ajunse la maturitatea genitală, se îndreaptă spre mare, urmînd noaptea cursul descendent al rîurilor și ciclul lor vital reîncepe.

Iată pe scurt diferitele stadii din dezvoltarea țiparilor (după Bertin):

1. Nașterea în Marea Sargasselor, în stare de larve transparente și pelagice, numite leptocefali; 2. Migrația și creșterea leptocefalilor din Marea Sargasselor pînă la țărmurile europene; 3. Metamorfoza leptocefalilor în pui (civelles) sau țipari transparenti, la gurile de vărsare a rîurilor; 4. Invaziunea apelor continentale; 5. Metamorfoza puilor în țipari gălbui; 6. Creșterea țiparilor gălbui în apele continentale; 7. Metamorfoza țiparilor gălbui în țipari argintii; 8. Migrația de reproducere a țiparilor argintii pînă la Marea Sargasselor și depunerea ouălor.

Cercetările d-nei Boucher-Firly și ale d-lui Fontaine (9) asupra mediului intern la aceste animale, au dovedit că trecerea din apă de mare în apă dulce nu se face deodată, și este însoțită de anumite modificări chimice interne. Mediul intern al animalului capătă o independență cu atît mai mare, față de mediul exterior, cu cît dezvoltarea individului este mai apropiată de maturitatea genitală.

	Apă dulce Δ mediului intern după 12 zile	Apă de mare	Diferența
țipari tineri din mlaștinile dela Brière . .	—0°62	—0°92	—0°30 (50%)
masculi argintii din mlaștinile dela Brière .	—0°59	—0°69	—0°10 (17%)
țipari mici gălbui din mlaștinile dela Sarthe,	—0°55	—0°70	—0°15 (27%)
țipari adulți, gălbui.	—0°57	—0°64	—0°07 (12%)
țipari adulți ce coboară rîurile	—0°64	—0°65	—0°01 (1%)

Deci pe măsură ce animalul se apropie de perioada de maturitate genitală, mediul său interior capătă o stabilitate osmotică și o independență remarcabilă față de variațiile mediului exterior.

„La plus ou moins grande résistance d'un poisson aux variations de salinité,




Fig. 10.

Independența mediului intern a peștilor euryhalini migratori în funcție de variația salină a mediului ambiant.

„semble donc bien liée à l'indépendance plus ou moins marquée de son milieu intérieur vis-à-vis du milieu extérieur” [Fontaine (17)].

Independența mediului exterior la țipar este menținută și de pătura mucoasă a corpului, după cum a arătat Portier și Duval (38) (vezi fig. 10).

Se întâmplă uneori ca adulții, din anumite cauze fizice (baraje, îngheț, etc.), să nu poată coborî rîurile atunci cînd momentul maturității genitale a venit. Forțați să-și continue

viața continentală, ei devin niște castrați fiziologici, deoarece nu își pot depune ouăle în mediul dulcicol. Ca o urmare a acestui fapt femelele astfel rămase, se îngrășe enorm, cresc peste măsură, ajungînd dimensiuni exagerate. În vivarii s'au putut păstra astfel de țipari pînă la 20 de ani, fără să moară și fără ca vreodată să depună ouăle. În schimb au devenit giganți, ajungînd aproape cît grosimea piciorului și lungi de 1,5 m.

Comparînd migrația catadromilor cu cea a anadromilor, constatăm că în fond avem deaface cu un același fenomen dar orientat invers.

Pe cînd somonul venea în ape dulci să și depună ouăle, fapt ce denotă originea lui dulcicolă, țiparul pleacă din ape dulci în mare pentru actul reproducător, dovedind prin aceasta originea lui marină.

Dar de ce tocmai Marea Sargasselor este locul călătoriei nupțiale? S'ar părea că e factorul temperatură ce determină acest loc, căci în aceste meleaguri (ca și în cele corespunzătoare din Pacific) temperatura apei nu scade niciodată sub 20°C. Unii autori pun deslegarea acestei probleme chiar în legătură cu vechiul continent al Atlantidei, care probabil se găsea cam în partea aceasta a globului terestru.

Mecanisme de adaptare la medii de salinitate diferită. Prin trecerea naturală sau experimentală a unui pește euryhalin din apă dulce în apă de mare, sau invers, se produc diferite modificări chimice, nu numai în ceea ce privește concentrația osmotică totală a mediului intern, ci și în alcătuirea celorlalți, componenți ai singelui.

Am văzut mai sus *independența osmotică a mediului intern față de variațiile saline ale mediului exterior la peștii euryhalini* (vezi fig. 10). Afirmațiile și rezultatele acestea sînt confirmate și de cercetările lui J. Loeb și Wastenev (31) care au lucrat pe un pește dulcicol foarte euryhalin: *Fundulus heteroclitus*, care pus în medii de salinitate diferită nu își modifică decît foarte puțin concentrația osmotică a mediului său intern (fig. 11).

D-na Boucher-Firly (8) a arătat că prin trecerea țiparului din apă de mare în apă dulce, *cantitatea de proteine din sînge crește*. Și acest fenomen trebuie pus în legătură cu rolul hidroregulator al coloidelor sanguine în menținerea unei hidremii constante a corpului.




Fig. 11.
Constanța mediului intern la *Fundulus heteroclitus* pus în medii de salinitate diferită.
(d. Loeb și Wastenev)

Hidratarea sanguină consecutivă acestei treceri din mare în apele râurilor, poate fi acuzată de scăderea presiunii osmotice a singelui somonilor, după cum a constatat Green (v. p. 6). Tot acestei hidratări i se datorește și *creșterea consumului de oxigen pe kg.—oră de animal*. Și acestui fenomen i se pot imputa observațiile lui Roule (40), care crede că e un tropism pozitiv pentru oxigen, cel care face ca unii pești marini să urce râurile pentru depunerea ouălor. Într-adevăr conținutul în oxigen al apelor dulci este mai mare decît cel al apelor marine (din cauza sărurilor solvate în acestea din urmă). Ori hidratarea unui țesut oarecare, mărește consumul acestuia în oxigen, astfel încît nu consumul crescut de oxigen este cauza migrațiilor anadrome, ci el este consecința creșterii cantității de apă din sînge, în urma trecerii animalului din mediu marin în mediu dulcicol. Contra creșterii excesive a hidremiei sanguine, animalul luptă printr-o mărire a coloidelor interne.

Un alt mecanism de adaptare la salinitate a peștilor dulcicoli, sau de adaptare la ape dulci a peștilor marini, constă în *modificarea coeficientului lipocitic a lui Mayer și Schaeffer*, care este un raport între cantitatea de colesterină și cea a acizilor grași ($\frac{\text{colesterină}}{\text{acizi grași}}$) (37 a).

Dș. Gueylard (24) a arătat la *Gasterosteus leiurus* că acest coeficient crește atunci cînd animalul trece dintr'un mediu dulcicol într'unul salin și scade în cazul invers. Este vorba de o variație a colestereinei care ar provoca aceste modificări. Prin creșterea coeficientului lipocitic (creștere de colesterină), puterea de inhibițiune a țesuturilor se mărește și prin acest fenomen se împiedică ridicarea valorilor presiunii osmotice interne. Un țesut cu un coeficient lipocitic ridicat se poate îmbiba cu apă,

chiar în soluții foarte concentrate. Scăderea coeficientului lipocitic, din contră, permite o pierdere de apă și o scădere a Δ intern.

Printre organele care ar juca un rol însemnat în aceste adaptări, ar fi *splina*, care la peștii euryhalini scade în greutate atunci când animalul trece într'un mediu mai salin. Și acest fenomen îl explicăm ușor, știind că splina este unul dintre organele cele mai importante în elaborarea rezervelor colesteroogene ale organismului.

Prin trecerea din apă dulce în apă salină *rezerva alcalină a sîngelui scade mult*, după cum a arătat *Fontaine* și *Boucher-Firly* (18), *Drilhon* și *Pora* (13). Fenomenul acesta este ușor de interpretat în legătură cu posibilitățile de variație ale pH-ului mediului exterior (vezi p. 5).

Dș. *Souillé* (44) a dovedit recent că trecerea din apă dulce în apă de mare a peștilor, este însoțită de o *creștere a glutathionului din branchii*. Acest fenomen trebuie deasemenea pus în legătură cu oxigenarea mai redusă a apei de mare față de apa dulce, cît și cu necesitățile de respirație mai mici în mare decît în rîuri, glutathionul fiind substanța oxido-reducătoare prin excelență.

Toate aceste variații presupun modificări serioase în alcătuirea cantitativă a diferiților componenți ai mediului intern, așa după cum împreună cu D-na *Drilhon* (13), am putut arăta la crap sau țipar. *Raporturile între diferitele elemente minerale ale sîngelui* (Cl, Na, K, Ca, Mg) *se schimbă*. Constantele fizico-chimice (Δ , Cond. electr., pH, rez. alc., hidremie, vîscozit.) variază. Toate aceste rezultate dovedesc deci că trecerea dintr'un mediu dulcicol într'unul salin, sau invers, este însoțită de adevărate furtuni ionice în interiorul animalului. Dacă individul poate rezista acestor modificări — prin mecanisme în parte descrise aici — și își restabilește un nou echilibru între mediul său intern și noul său mediu extern, atunci el are posibilitatea de a trăi normal în noul mediu cîștigat.

Recent d-l *G. Gavrilescu* (21) într-o lucrare asupra *rezistenței globulare a sîngelui* peștilor, în funcție de salinitate externă, constată că aceasta este cu atît mai mare cu cît animalul este mai euryhalin. Și rezultatele acestea trebuiesc apropiate de fenomenele de asfixie observate în decursul adaptației la salinitate, sau cu cele de hidratare generală, atunci cînd animalul trece din mare în ape dulci.

Cercetările experimentale ale d-nei *Drilhon* (11) făcute asupra crapului (animal stenohalin dar cu posibilități euryhaline însemnate) și a țiparului (euryhalin tipic), confirmă rezultatele de mai sus. Rezistența globulelor, a eritrocitelor peștilor euryhalini este invariabilă, adică nu se modifică atunci cînd animalul trece din medii dulcicole în medii saline, pe cînd rezistența globulară a stenohalinelor scade cu cît salinitatea externă crește. Paralel cu acest fenomen *viteza de sedimentare* a eritrocitelor peștilor euryhalini se mărește cu creșterea salinității externe, iar la stenohalini scade cu mărirea salinității externe. Acest fenomen foarte însemnat trebuie pus în legătură cu un echilibru electrostatic important, care în mod normal oprește aglutinarea globulelor roșii din sînge.

În fiordurile Norvegiei trăiește un pește, *Cottus bubalis*, neam cu zglăvoaca dela noi, la care d-l Prof. *Portier* (37) a găsit posibilități euryhaline pronunțate și la care a putut pune în evidență un nou mecanism de adaptare la salinități diferite, care constă în *existența unor legături labile* (de natură adsorbtivă) *între anumite complexe proteice sanguine și ionii minerali ai sîngelui*.

Am văzut mai sus că aceste modificări interne se pot manifesta uneori prin anumite schimbări morfologice, dar că nu există întotdeauna această legătură între forma animalului și chimismul său intern.

Dat fiind că altele sînt influențele unui mediu dulcicol și altele cele ale unui mediu salin, înțelegem cum aclimatizarea la un nou mediu acvatic, cu salinitate diferită de cea avută, poate produce modificări morfologice și fiziologice în structura animalului, care astfel poate constitui un început, o ramificație de o nouă spiță.

E demn de remarcat în această privință cazul unui Crustaceu Phyllopod, *Artemia salina*, care poate suferi modificări morfologice însemnate prin trecerea lui dintr-un mediu dulcicol într'unul salin sau invers. Experimental s'a dovedit că sub influența crescîndă a salinității externe, lamelele caudale dela *Artemia salina* se reduc pînă la dispariție (fig. 12). În ape aproape dulci animalul are aceste apendice foarte dezvoltate; în ape suprasaturate ele lipsesc complet. Între aceste extreme se întîlnesc toate trecerile. Sistematicienii au și făcut spițe diferite din acest gen, după lungimea apendicelor. Dar dacă luăm ouă de *A. salina* — care au lamelele caudale mari și ciliate și trăesc obișnuit în ape foarte puțin sărate — și le punem în apă suprasaturată, ele se dezvoltă în *A. Köppeniana*, fără apendice codale și caracteristică în natură apelor puternic salinizate (28).

Chiar la somon dealtfel s'a observat că indivizii din ape dulci au de foarte multe ori cele 2 maxilare încovoiate unul spre altul și se pot chiar pătrunde. Să ne amintim apoi că *Oncorhynchus* ce trecea din mare în ape dulci, suferea o modificare importantă în linia de sudură a corpului cu capul (vezi fig. 3), pe lingă schimbarea psihicului animalului.

Astfel este destul de evident faptul că salinitatea externă poate influența caracterele morfologice.

Trebue spus aici că problema adaptației animalelor marine la medii mai salină — care are o foarte strînsă legătură cu fenomenele de euryhalinitate și explicarea lor — nu a fost decît încă foarte puțin cercetată. Ch. Richet și Oaxner (39) au supus indivizi de *Sargus Rondeletti* la supra-saturi față de Mediterană și au constatat că, în adaptații foarte lente, aceste animale pot trăi normal pînă la salinități externe de 53‰. Astfel încît putem admite că unii pești au posibilități euryhaline pînă la limite de salinitate destul de superioare, dar pe care noi încă nu le cunoaștem în detalii. Datorită probabil acestor însușiri de euryhalinie, unele Nevertebrate marine au invadat lacurile supra-saline continentale, putîndu-se dezvolta și reproduce în acestea.

O mențiune importantă în adaptarea la medii noi de viață, trebuie făcută în faptul că, trecerea din apă dulce în apă salină, sau invers, se face *numai într'un stadiu anumit al dezvoltării* și e posibilă mai ales în timpul maturității genitale (toți anadromii și catadromii). Această epocă din viața animalului este caracterizată printr-o serie de modificări morfologice (caractere secundare), dar și prin modificări chimice interne însemnate. Eu am putut arăta la animalele acvatice (33) că modificările chimice ale sîngelui, principal sînt aceleași atît la pești (Cyclostomi, Selacieni, Teleosteenii) cît și la Nevertebrate (Echinoderme, Cephalopode) sau restul Vertebrateelor. Acest fapt trebue pus în legătură cu secreția internă a glandelor genitale, cu hormonii genituali, care au acțiuni specifice și generale asupra tuturor organismelor. În această ordine de idei trecerea dintr'un mediu dulcicol în unul salin, sau invers, s'ar putea pune în legătură cu chimismul diferit al epocii din viața animalului în care se găsește în acel moment, chimism datorit unei acțiuni hormonale legate de acea perioadă. Prin aceasta hormonii ar juca un rol indirect în fenomenele de adaptare.

Numeroase experiențe au arătat că extractele hormonale ale glandelor genitale, sînt capabile să modifice puternic metabolismul mineral al animalelor. Extractul ovarian produce o scădere a calcemiei (32), o scădere a rezervei alcaline și deci o creștere a pH-ului, manifestată printr'o acidoză (27). În timpul menstruației sau a sârmei există variații puternice ale elementelor minerale ale sîngelui (Cl, Na, K, Ca, Mg) (45).




Fig. 12.

Dezvoltarea ultimului segment abdominal (telson) cu lamelele și perii caudali, la *Artemia salina* sub influența salinității externe.

a) *Artemia Köppeniana* (din ape suprasaturate); b, c) *Artemia Mühlhausenii* (ape salină); d, e) *A. artemia* din ape salmastre; f) *A. salina* (din ape ușor sărate).

(d. Schmankevitch din Przibrem, citat după Jeannel)

Legătura cauzală între aceste acțiuni este încă prea puțin cunoscută astăzi, astfel că rămâne viitorului sarcina de a o descoperi.

Migrațiile sezonare, fie ale peștilor, fie ale celorlalte animale migratorii (broaște țestoase, paseri etc.) trebuiesc însă puse în legătură cu acțiuni hormonale, după cum spune Cahn (1). „Migrațiile sînt efectul unei cauze hormonale“. El se referă numai la migrațiile provocate de cauze fiziologice de reproducere și constată că toate acestea se produc numai în momentul maturității genitale, adică atunci cînd hormonii sexuali produc atît de însemnate modificări în morfologia (caractere secundare externe), chimia (caractere secundare chimice) și psihicul animalului. Astfel e just să legăm migrațiile sezonare de o influență hormonală și să nu mai spunem că ele sînt datorite unui instinct, termen care e un fel de scuză a neștiinței noastre.

Cucerirea de medii noi. Din analiza acestor cazuri de anadromie și catadromie, cît și din considerațiile fizico-chimice pe care le-am putut face pentru a explica trecerea din apă dulce în apă marină, sau invers, reiese că euryhalinele sînt animale cu posibilități actuale de a cuceri medii noi. Ele sînt ramurile vii ale arborelui genealogic, care trăiesc și se pot divide. Stenohalinele formează vîrfurile uscate ale acestui arbore genealogic, care rămîn „in statu quo“, neputînd actualmente suferi nici o modificare externă salină care să nu le fie fatală. Euryhalinitatea apare astfel ca un caracter evolutiv superior stenohalinității. O putem compara cu homeotermia Mamiferelor și Paserilor, care a permis acestor grupe de animale să cucerască tot spațiul dintre poli și ecuator, fără a ține prea mult seama de factorul temperatură, pe care homeotermia l-a eliminat aproape complet dintre componenții mediului extern.

Euryhalinele cele mai perfecționate au eliminat și ele factorul de salinitate externă — prin mecanisme numai în parte cunoscute — putînd trăi atît în medii dulcicole (adică lipsite de săruri minerale), cît și în medii saline (de salinitatea normală din natură: apa de mare).

Prin posibilitatea euryhalinelor de a cuceri medii noi, ele se pot supune fenomenului de segregatie, adică de izolare, cel mai important factor în nașterea de spițe noi (28).

Putem da exemple destul de elocvente de astfel de realizări în natură, dacă luăm factorul timp după ceasul vremilor îndelungate.

Geologia ne dovedește că în anumite perioade ale evoluției pămîntului s'au produs transgresiuni sau regresiuni marine însemnate, adică uscatul, cu toate mediile lichide, dulcicole, a fost invadat cu încetul de ape marine, sau invers apele marine s'au retras depe uscat, lăsînd lacuri salmastre care cu timpul au fost apoi îndulcite de rîuri. Procesele acestea s'au făcut în epoci de foarte lungă durată, astfel că animalele prinse de o transgresiune sau rămase în urma unei regresiuni, dacă au avut însușiri euryhaline, s'au putut adapta nouilor condiții de salinitate create de salinizarea apei prin transgresiune, sau îndulcirea ei prin regresiune, și sub influența noului mediu au putut da forme noi de animale.

E deasemenea posibil ca prin regresiuni foarte vechi, animalele marine să fi dat forme dulcicole inițiale și că prin transgresiuni animalele deja dulcicole, să se fi readaptat vieții marine. E invederată aici o posibilitate care ar putea fi exemplificată de un paleontolog. Adaptarea la nouile condiții create de trans- sau regresiune, era posibilă numai dacă animalul avea anumite posibilități euryhaline, sau mai bine zis inclinații spre euryhalinie, căci formele tipic stenohaline au murit de îndată ce mediul lor chimic salin varia cît de ușor.

Dat fiind însă că proprietăți euryhaline au, într'un grad mai mare sau mai mic, majoritatea peștilor, o invazie lentă a unui alt mediu salin a putut păstra și adapta spițele deja existente nouilor condiții — cel puțin o parte din ele.

Astăzi știm că între euryhalinitate și stenohalinitate există toate trecerile (vezi fig. 13). Sînt foarte multe forme de pești care dacă nu pot trece chiar din mediu dulce în mediu salin, pot totuși suporta unele ape salmastre timp mai scurt sau mai îndelungat. Toată lumea cunoaște peștișorul *Gasterosteus*, care cu toate că trăiește în ape dulci, poate suporta cu ușurință ape saline, timp destul de îndelungat, fără ca prin aceasta animalul să sufere aparent.

Sînt foarte puține date experimentale în ce privește posibilitățile de a trăi în medii mai concentrate decît apa de mare, cu toate că experiențe sistematice asupra acestei chestiuni ar aduce rezultate interesante, deoarece e cunoscută legea că un organism acvatic (celular sau multi celular), suportă mai ușor salinizări ale mediului său extern, decît diluții ale acestuia. O mare parte din peștii marini pot suporta diluții ușoare ale mediului lor; ploile, curenții etc. produc variații mici de salinitate. Peștii de țarm, deși stenohalini, se aventurează în apropierea coastelor, sau chiar în unele limanuri sau estuare, pentru căutarea hranei. Vom vedea mai jos că unii pești marini se pot aventura pe rîuri în sus, pînă la sute de km. dela gurile de vărsare, fără să fie euryhalini tipici.

Peștii dulcicoli ies adesea în zonele sărate dela gurile de vărsare ale rîurilor, în apele sălcii din estuare, unde pot rămîine mai multă sau mai puțină vreme, după cum însușirile euryhaline sînt mai mari sau mai mici.

Crapul (*Cyprinus carpio* L.) e considerat ca un stenohalin. Dar dacă încercăm să-l aclimatizăm cu încetul la diferite medii saline, constatăm că el poate trăi pînă la anumite limite de salinitate externă. Mediul său intern (Δ) rămîine constant, sau aproape constant, pînă la o limită de salinitate externă egală cu $\Delta = -0^{\circ}65$, numită „punct izotonic” de către d-l Prof. P. Portier (36). Faptul denotă că, pînă la această valoare a salinității externe, animalul are posibilitatea de a-și regula concentrația osmotică internă. Dar sub masca invariabilității presiunii osmotice interne se ascund modificări calitative însemnate, mai ales în natura proteinelor și a constantelor hidremice. Lucrările D-nei *Drilhon* și a D-lui Prof. G. Florence (12) dovedesc că la salinități externe foarte mici ($\Delta = -0^{\circ}13$) se produce o modificare a punctului de stabilitate maximă a proteinelor (pHi) cît și o bruscă deshidratare (*Drilhon și Pora*) (13), dovadă că animalul dispune de anumite mecanisme reglatoare prin care luptă pentru a-și menține un mediu intern independent de cel extern. Dacă adaptarea crapului se face încet, atunci după ce „șoc”-ul inițial este trecut cu succes, animalul izbuteste să-și mențină mediul său intern aproape neschimbat pînă la punctul izotonic. Continuînd a-l ținea în medii de salinitate crescîndă, animalul își identifică contracția globală a mediului său intern, cu cea externă (vezi fig. 10). În adaptări bruște animalul e capabil să reziste la salinități mai superioare punctului izotonic, dar mediul său intern nu se egalizează cu cel extern, rămînînd în permanență hipotonic. În aceste adaptări indivizii ce au trecut de un Δ exterior mai mare decît $-0^{\circ}65$ mor și nu mai pot reveni la normal, chiar dacă îi repunem în apă dulce. Fenomenul acesta se poate atribui unei asfixii progresînde.

Vedem deci ce deosebire fundamentală există între o adaptație lentă și una bruscă. *Duval* (14) a putut menține în viață cîteva luni un crap într'un mediu salin extern de $\Delta = -0^{\circ}60$, adaptat cu încetul acestei ape, pe cînd într'o adaptație bruscă la același mediu, animalul nu trăiește mai mult de 20-24 de ore, fiind și atunci în-




Fig. 13.

Trecerea între eury- și stenohalinitate este continuă.

tr'o stare bolnăvicioasă, cu pierderea stabilității, încetinirea respirațiilor și final cu moartea.

Crapul are deci posibilități euryhaline, în cazul cînd adaptarea la medii saline se face cu încetul. Pentru a putea face experiența în natură și a avea rezultate concrete în obținerea unui crap ce ar trăi în apă sărată, în care s'ar putea și reproduce, este însă nevoie de timp în sens geologic.

Și tot ca și crapul se comportă o mulțime de alte forme dulcicole sau marine. Stenohaline absolute nu sînt atît de multe precum am putea crede. Și animalele pot cîștiga proprietăți euryhaline dezvoltate, atunci cînd modificările salinității externe se fac imperceptibil de încet (timpuri geologice), încît ca o concluzie eșalonată în timp, și nu statică, actuală, putem admite că, aproape toate formele de animale acvatice sînt sau pot deveni euryhaline, avînd deci posibilitatea de a se putea adapta nouilor condițiuni de mediu și putînd astfel să deie spițe noi, în urma influențelor chimice-morfologice ale noului mediu cîștigat, asupra animalului.

Celace astăzi nu se știe încă precis, este dacă animalele cu însușiri euryhaline, ce s'au adaptat lent unui mediu salin diferit de al lor, s'ar putea reproduce în acest nou mediu, sau ouăle și puii lor ar fi distruse de acțiunea nouilor condiții de mediu pe care filogenia nu le a cunoscut. E mai probabil că pentru depunerea ouălor, aceste animale trebuiesc la început să se reîntoarcă în mediul din care au venit, constituind prin aceasta o spiță nouă ana- sau catadromă.

Căci fixarea prin ereditate a însușirilor cîștigate prin adaptabilitate ar fi cheia care ar putea disemina spițele euryhaline în medii noi.

Baltica în Terțiar era încă un golf larg al Oc. Atlantic. Cu ridicarea Scandinaviei, el s'a închis treptat, iar apele astfel izolate de larg s'au îndulcit cu vremea, de oarece evaporația era mai mică decît cantitatea de ape dulci aduse de ploii și râuri. Unii pești marini cu însușiri euryhaline s'au putut astfel adapta nouilor condiții de salinitate. Și astăzi în Baltica se găsesc vreo 5 spițe de pești marini, care trăesc alături de crapi, știuci etc. și care nu diferă de frații lor oceanici decît printr'o talie mai mică.

În Caspica se găsește deasemenea un amestec de faună marină și dulcicolă. Chiar în Marea Neagră acest amestec este cunoscut de multă vreme. La Constanța se poate uneori prinde crap, somn sau cegă.

Dar amestecul cel mai evident al acestor 2 tipuri de animale, dulcicole și marine, este reprezentat mai ales în limanurile Mării Negre.

Analiza ichtiologică a lacului Razelm, i-a permis Profesorului Borcea (6) să identifice următorii conlocuitori :

1. *Forme tipice marine* : Harengula delicatula, Labrax lupus.
2. „ *salmastre* : Gobius cephalargus, G. batrachocephalus, Pleuronectes flessus.
3. „ *heterogene* : Gasterosteus aculeatus, Gobius marmoratus, G. fluviatilis, G. melanostomum, Syngnathus Agassizii.
4. *Forme de trecere* ; Accipenser stellatus, A. Guldenstädti, Huso huso, Alburnus chalcoides, Anguilla vulgaris, Alosa pontica, A. Nordmanni.
5. *Forme dulcicole cu predispoziție la ape sălcii* : Lucioperca sandra, L. volgensis, Silurus glanis, Esox lucius, Accipenser ruthenus, Cyprinus carpio, Leuciscus vulgaris, Abramis brama, Harengula cultiventris,
6. *Forme eminamente dulcicole* : Carassius vulgaris, Tinca vulgaris, Alburnus lucidus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia.

Amestecul acesta de forme, toate mai mult sau mai puțin euryhaline, nu trebuie să ne uimească prea mult. Nu e un caz unic și nu e nou. Syngnathus Agassizii, care se consideră ca o formă marină, cu mari facultăți euryhaline, a fost găsită de d-l Zăhărescu (46) în niște lacuri dulci basarabene, complet izolate de mare. Studiul biogeografic îl consideră ca un relict al faunei ponto-caspio-araliene, care as-

țazi este complet adaptat vieții dulcicole. Indivizii astfel capturați au o talie mult mai mică decât cei marini (85 mm. lungime față de 215 mm. lungime medie a indivizilor marini).

Günther (25) citează numeroase exemple de animale tipic marine, care au fost găsite la distanțe de sute de km. în susul râurilor. Astfel rechinul se poate găsi în Gange (*Carcharias gangensis*), în Zambez (*C. zambensis*), în apele Japoniei (*C. japonicus*). Raja clavata nu e rară în Amazon sau chiar în Mississipi. Trygon pastinaca se aventurează adesea pînă în nordul Balticeii sau chiar în părțile nordice ale Mării Negre, unde apa este aproape îndulcită, *Pleuronectes flossus* a fost găsită 200 km. în sus de Loire.

Caracteristic pentru indivizii marini adaptați unui mediu dulcicol este în primul rînd o talie mai redusă, datorită probabil unei alimentații mai scăzute. Această lege e generală atunci cînd este vorba de pești (*Atherina*, *Syngnathus*, etc.) dar poate suferi variații atunci cînd se aplică altor grupe de animale (7).

Trebue să amintesc aici și cazul unui crab mediteraneean, adaptat vieții îndulcite a M. Negre, care ne arată unele fenomene foarte interesante și generale, dar de altă natură decât cele de mai sus.

Crabul *Pachygrapsus marmoratus* Stimps, este un intrus recent în M. Neagră (34). El nu s'a putut încă adapta complet diluției din acest mediu, adică concentrația osmotică a mediului său intern nu este încă complet egală cu cea a M. Negre, dar nu mai este gală nici cu cea a Mediteranei de unde a venit, ci are o valoare intermediară între aceste ape. Dacă indivizii din M. Neagră se repun în ape de concentrația Mediteranei, mor. Acest fenomen denotă că și adaptabilitatea lor chimică internă urmează o evoluție ortogenetică, adică drumul adaptabilității pe care s'a angajat animalul, nu mai poate fi făcut în sens invers, iar un punct al acestui parcurs trecut, nu mai poate fi atins din nou.

Din cauza neegalității osmotice a celor două medii, *Pachygrapsus marmoratus* nu a putut să se ridice mai sus de Constanța.

În schimb *Carcinus moenas*, o rudenie ce se găsește în aceeași situație de hiperosmoză față de mediul exterior, avînd o concentrație cu 50% mai superioară decît a apei marine, a putut cuțeri tot spațiul chimic al M. Negre, trecînd peste curentul dulce al Dunării și răspîndindu-se în toată zona nordică, îndulcită, a bazinului pontic.

Un alt Brachiur, *Eryphia spinifrons*, nu se găsește decît pînă la Caliacra, neputînd trece mai la nord de golful Balicului.

Iată deci o succesiune curioasă în distribuția geografică a Crustaceilor Brachiuri ai M. Negre. *Eryphia* pînă la Caliacra, *Pachygrapsus* pînă la Constanța, *Carcinus* în tot bazinul pontic. Ori toate aceste trei forme sînt de origine mediteranee. Cel mai euryhalin și homeosmoric este *Carcinus moenas*, apoi *Pachygrapsus marmoratus* și în urmă *Eryphia spinifrons* (43 a). Deci ordinea aceasta de adaptare spre ape dulci e dată de anumite însușiri specifice animalului, ce constau în posibilitatea de ași păstra un mediu intern independent de cel extern, adică în homeosmoză (35 a).

În aceeași situație sînt și *Atherinele* din M. Neagră, care evident sînt de origine mediteranee, dar care s'au adaptat condițiilor de salinitate din M. Neagră și nu mai pot trăi în ape de salinitatea Mediteranei (35). Adaptarea acestor animale are o direcțiune evolutivă bine marcată, o tendință netă spre ape dulci. Este direcțiunea ortogenetică a evoluției chimismului intern.

Această direcție nu presupune pierderea însușirilor euryhaline. Animalele pot încă suporta medii de salinitate variabilă, dar limitele superioare nu mai ating valorile salinității mediului mediteraneean originar. În schimb limitele inferioare au scăzut foarte mult.

Se verifică prin aceste date o mare lege biologică: ortogeneza.

Omul a încercat de multă vreme aclimatizării artificiale de animale marine la ape dulci sau invers. Aceste încercări s'au făcut atât în natură, cu animale utile vieții omenești, cât și în laborator pentru studiul problemei de adaptabilitate.

Plinius (22) citează lacurile din jurul Romei, în care bogătașii acelor vremuri, încercau să păstreze Murena Helenica, un pește marin foarte căutat la mesele nobilimii romane. *Vidal* reușește să adapteze indivizi de *Labrax lupus* la medii dulci, în vivariul din Arcachon, *Caillaud* obține aceleași adaptări cu *Mugil cephalus* într'un bazin la 125 km. dela gura de vărsare a râului Loire, dar indivizii astfel adaptați nu se puteau înmulți. Pentru reproducere animalele trebuiau lăsate să se reîntoarcă în mare, devenind prin aceasta un fel de catadromi.

Țăranii suedezi păstrează somoni în lacurile dulci din apropierea mării, pe care îi împiedecă să reajungă în mare atunci când descind fluviile. Somonii aceștia în timpul maturității genitale urcă râurile pentru depunerea icrelor și se reîntorc apoi în lacul dulce de unde au plecat. Ei se comportă astfel ca și păstrăvul. Faptul acesta dovedește că nu e o acțiune de mediu, o atracție a apei dulci, care se manifestă în această perioadă (deoarece animalele se găsesc permanent în apă dulce), nu e nici un oxitropism după cum spune *Roule*, cel mult am putea spune că maturitatea genitală determină la aceste animale un rheotropism pozitiv, care se observă și la păstrăv, și care ar face ca urcarea râurilor să fie o consecință a acestui stadiu de dezvoltare individuală.

Reiese din toate aceste considerații că adaptarea peștilor la medii de salinitate diferită este posibilă numai atunci când animalele au anumite însușiri euryhaline și când această adaptare se face cu încetul. Trecerea dintr'un mediu dulcicol într'unul salin, sau invers, se poate face datorită unor serii de mecanisme, încă puțin cunoscute, dar foarte eficiente. Studiul acestor mecanisme este foarte puțin abordat, cu toate că el va fi cheia care va permite raționalizarea pisciculturii, mai ales la noi, unde anadromii formează una dintre marile surse de venit ale pescuitului.

Putem spune că asupra mecanismelor fizico-chimice, cât și a necesităților fiziologice ale acestor animale, știm foarte puțin și nesistematizat. Lipsa de fonduri blochează activitatea cercetătorilor în această direcție, care nu se poate face decât pe teren, având laboratorii utilitate și prevăzute cu tot confortul științific modern.

Problema în sine rămâne deschisă. Cîmpul de exploatare este foarte vast, iar cercetările ce eventual se vor întreprinde vor duce la rezultate interesante.

Incheiere. Studiul migrațiilor peștilor euryhalini deschide astfel o serie de probleme importante atât pentru economia unei țări, cât și pentru biologie.

Și aplicarea în practică a principiilor cîștigate din acest studiu, se face mai ales în America de Nord, care astăzi este țara în care peștii migratori dau cel mai mare randament economic. Faptul este datorit unui pescuit rațional și științific, care ține seama de toate necesitățile fiziologice ale animalelor și mai ales de asigurarea progenerurii. În râurile Americii de Nord somonii (*Oncorhynchus*) mișună în timpul urcării fluviilor. Atît sînt de numeroși în această vreme, încît toate animalele de uscat, erbivore, omnivore sau carnivore, se hrănesc acum numai cu pește, pe care e destul să bagi mîna în apă pentru a-l prinde. Marele urs grizzly e un desăvîrșit pescar în acest timp, cînd coboară din vîrfurile munților în vâlcelele izvoarelor pentru a se înfrupta cu o hrană succulentă și ușor de capturat. Vulpile, rîșii, puma etc. cu toții devin ichtiofagi.

Omul a așezat dealungul cursului râurilor, anumite instrumente care prind peștele ce urcă riul, dar pescuitul este permis numai în anumită vreme și numai pentru cantități determinate. Astfel că animalele ajung în număr suficient de mare și în zonele de ape clare pentruca să-și poată depune ouăle. În locurile acestea pescuitul este absolut interzis, iar ouăle și puii sînt chiar păzite pentru a nu fi atacate

de alte animale și cercetate de laboratorii speciale pentru a nu fi infectate de vreun parazit. Puii ieșiți din aceste ouă, după ce au ajuns stadiul cînd pot suporta apa sărată, sînt duși chiar artificial în mare pentru a asigura contingentul de adulți pentru anul următor. În multe locuri s-au construit apoi adevărate clocitori artificiale (CO), amenajate astfel că dau un randament de peste 95% în pui vii, pe cînd în natură — calculînd toate accidentele posibile — acest randament nu este mai mare de 50%. Aceste crescătorii științifice de somoni sînt subvenționate de Stat, cu personal select și bine pregătit, cu materiale de cercetare moderne și utilaje speciale. Prin ele se asigură popularea diferitelor cursuri de apă cu somoni și se priveghiază ca să nu se strice echilibrul între animalele ce urcă rîurile și cele ce le coboară, asigurînd prin aceasta sursa mare de venit plasat în industria conservelor, care aici este cea mai dezvoltată din întreaga lume.

Printr-o astfel de populare artificială a rîurilor cu pui, Noua Zelandă are astăzi somoni care formează una dintre cele mai ușoare surse de trai, locuitorilor acestei insule.

Și în Europa somonul a fost odată tot atît de frecvent, așa cum este actualmente în America. Figura lui se găsește pe unele deseme ale omului primitiv. În evul mediu el servia drept simbol heraldic al unor regiuni. În aceste vremuri servitorii din orașele fluviale, aveau specificat prin lege că nu pot primi mai mult de 3 ori pe săptămînă carne de somon, atît era aceasta de multă și la îndemîna oricui, încît consumarea ei a trebuit legiferată. Dar de atunci pescuitul neraționalizat și barbar, dorința mare de cîștig deodată, au împușinat somonul în Europa. El servește astăzi doar ca aliment proaspăt și se găsește numai în cîteva din rîurile atlantice (vezi harta dela fig. 6) servind doar vrea 2-3 uzini de conserve europene.

Dealtfel un lucru asemănător, dar mult mai evident, s'a întîmplat cu Accipenseridele din Atlantic. În evul mediu și mai înainte, Sturionizii erau un aliment obișnuit, și foarte căutat pentru gustul său excelent. Ei erau numeroși în regiunea Franței și nu lipseau dela nici o masă mare. Dar fiind prea vînați, fără a se gîndi la amenajarea unora dintre adulți pentru asigurarea perpetuării, animalele au fost pe încetul distruse, posibilitățile de înmulțire scăzute, astfel că astăzi Sturionizii sînt foarte rari pe coasta Franței și numai accidental se mai prinde vreunul în susul rîului.

Acestor cauze de vînat barbar, mai trebuesc adăugate și o mulțime de lucrări făcute pentru amenajarea cursului rîului, care nu au ținut seama de necesitățile animalelor în depunerea ouălor și care le-au închis drumul spre izvoare, locul de clocire. Așa sînt barajele făcute pentru uzini electrice, pentru regularea cursului și debitului de apă; apoi ecluzele pentru anihilarea diferențelor de nivel. Se mai pot adăuga aici și toate dejecțiunile industriilor actuale, a căror produși de multe ori sînt toxici pentru animalele acvatice, încît vecinătatea unei atari uzini depopulează apele învecinate de locuitorii lor obișnuiți.

La noi în M. Neagră avem o mare rezervă de pești migratori în cele vreo 5 ape de Accipenseride și Clupeide anadrome. Cu tot pescuitul modern care începe să se introducă cu încetul și la noi, încă nu am ajuns să epuizăm această mare rezervă. Dar trebuie dată o deosebită importanță reglementării acestui pescuit, trebuie raționalizat după necesitățile de reproducere a animalelor și a asigura întotdeauna urmași. Captura morunului adult ar trebui să se facă numai după depunerea ouălor, sau chiar dacă se caută pentru icre, să se reglementeze numărul capturilor și să se asigure artificial progenitura. Ce pierdere mare ar fi dacă 10% din icrele dintr'un morun s'ar cloci în clocitoare artificiale, cu un mare randament și puii astfel obținuți s'ar arunca în apa dulce din care a fost prinsă mama? Dece să secătuim noi o avuție care trebuie transmisă urmașilor, numai pentru că lucrăm nerațional, nu ținem seama de necesitățile fiziologice ale animalului și vrem deodată să „dăm lozura“.

Și trebuie subliniat faptul că peștii migratori nu cer nimic pentru creșterea lor, care se face în mare, nu trebuie să mergem în larg să-i prindem căci vin ei la noi și este suficientă o cheltuială foarte mică pentru ca să-i avem în cantitatea care ne trebuie.

Cît nu s'ar putea face la noi dacă s'ar executa fecundații artificiale de Sturionizi și puii astfel obținuți să fie lăsați liberi în cursul Dunării. În lacurile din lungul Dunării s'ar putea face chiar crescătorii sistematice de acești pești, care ar putea alimenta o industrie unică de conserve de Accipenseride, care ar deservi toată lumea.

Cît ar costa un laborator științific care să asigure țării un venit enorm și care să rezolve o problemă în suspensie?

Cînd vom ajunge să cunoaștem toate condițiile de mediu ale peștilor, cît și fiziologia lor complectă, cînd vom putea repera variația unei condiții de mediu în natură și în consecință cu aceasta să reglăm pescuitul, cînd vom putea înțelege că numai cu sacrificii mici se poate cîștiga o avuție mare, atunci și problema migrațiilor va fi rezolvată pentru economia națională și pescuitul va fi unul dintre veniturile cele mai însemnate ale Statului.

BIBLIOGRAFIE

1. ALEVIN R.—Amer. Natur. 59, 539, 1925.
2. ANTIPA GR.—*Pescăria și pescuitul în România*. 1 vol. Ed. Acad. Rom. București, 1916.
3. — *Fauna ichtiologică a României*. 1 vol. 294 p. Ed. Acad. Rom. București, 1909.
4. — Bull. Sect. Sc. Ac. Rom. 16, (4-5) 1933.
5. BERTIN L.—*Migrations et métamorphoses de l'anguille d'Europe*. 1 vol. 58 p. Act. sc. ind. Hermann, Paris, 1935.
6. BORCEA I.—Ann. Univ. Jassy, 12-13, 414, 1924.
7. — Ann. Univ. Jassy, 14, 140, 1926-27.
8. BOUCHER-FIRLY S. (Mad.).—C. R. Soc. Biol. 115, 952, 1934.
9. BOUCHER FIRLY S. et M. FONTAINE.—C. R. Soc. Biol. 112, 462, 1933.
10. CALDERWOOD. L. W.—*Salmon hatching and salmon migrations*. 1 vol. 95 p. Ed. Arnold, London, 1931.
11. DRILHON A.—C. R. Soc. Biol. 127, 900, 1928.
12. DRILHON A. et G. FLORENCE.—Arch. de Physique—biol. 12, 1, 1935.
13. DRILHON A. et E. A. PORA.—Ann. de Physiol. 12, 139, 1936.
14. DUVAL M.—Ann. Inst. Oceanogr. Paris, 2, 233, 1925.
15. FISCHER Ed.—Bull. Inst. Oceanogr. Monaco, No. 505, 1927.
16. FISCHER M. H.—Hbd. d. norm. u. pathol. Physiol. 15/1/1, 136, 1930.
17. FONTAINE M.—C. R. Ac. Sc. 191, 680, 736 și 796, 1930.
18. FONTAINE M. et S. BOUCHER-FIRLY.—Bull. Inst. Oceanogr. Monaco, No. 646, 1934.
19. FONTAINE M. et A. RAFFY.—Bull. Inst. Oceanogr. Monaco, No. 603, 1932.
20. — — Assoc. fr. p. avanc. d. Sc. Nantes, 1935.
21. GAVRILESCU G.—C. R. Ac. Sc. Roum. 2, 90, 1937.
22. GOBIN A. et G. GUÉNAUX.—*La Pisciculture en eaux douces*. 1 vol. 348 p. Ed. Baillière, Paris, 1907.
23. GREEN C. W.—Bull. U. S. Eur. Fish. 24, 431, 1904.
24. QUEYLARG Fr.—Arch. de Physique-biol. 3, 79, 1923/24.
25. GÜNTHER A. C.—*Handbuch der Ichthyologie*. 1 vol. 527 p. Ed. Gerold's Sohn. Wien. 1886.
26. HERTER K.—Hdb. d. norm. u. pathol. Physiol. 11, 80, 1966.
27. IMPERATO E.—C. R. Soc. Biol. 100, 165, 1929.
29. JEANNEL R.—*Curs de Biologie generală*. 1 vol. 200 p. Ed. Univ. Cluj, 1930.
29. JOUBIN L.—*Les métamorphoses des animaux marins*. 1 vol. 270 p. Bibl. Phil. sc. Flammarion, Paris, 1926.
30. LEGENDRE R.—C. R. Soc. Biol. 105, 264, 1930.
31. LOEB and WASTENEY.—Journ. of. biol. chem. 21, 222, 1915.
32. M.RVISH L. and L. P. BOSMAN.—Quarterly J. exp. Physiol. 18, 11 și 29, 1927.
33. PORA A. E.—An. de Physiol. 12, 206, 1936.
34. — Bul. Acad. Rom. 13, 145, 1937.
35. — Ann. Univ. Jassy, 24, (2), 319, 1938.
- 35a. — Ann. Univ. Jassy, 25, 283, 1938.

36. PORTIER P.—*Les milieux intérieures dans la série animale*. 1 vol. 190 p. Ctre. Dec. Sc. Paris, 1934.
37. — *Ann. de Physiol.* 13, 183, 1937.
- 37a. — *Physiologie des animaux marins*. 1 vol. 251 p. Bibl. Phil. sc. Flammarion, Paris 1939.
38. PORTIER P. et M. DUVAL.—C. R. Ac. Sc. 175, 1105, 1922.
39. RICHET Ch. et OEXNER.—C. R. Ac. Sc. 183 627, 1926.
40. ROULE L.—C. R. Ac. Sc. 158, 1914.
41. — *Les Poissons migrateurs, leur vie et leur pêche*. 1 vol. 175 p. Bibl. Cult. gén., Flammarion, Paris, 1922.
42. — *Les Poissons et le monde vivant des eaux*. 1 vol. T. III, 380 p. Delagrave, Paris, 1929.
43. SCHEURING L.—*Wanderung der Fische*, Ergebnisse der Biologie, 5-6, 1929-30.
- 43a. SCHWABE E.—*Ztschr. f. vergl. Physiol.* 19, 183, 1933.
44. SOUILLÉ M. (Mlle).—*Recherches sur la teneur en glutathion de la branchie des Poissons*. Thèse Fac. Sc. Paris, 1937.
45. UNDERHILL F. P.—*Journ. of biol. chem.* 58, 1923.
46. ZĂHĂRESCU V.—*Ann. Univ. Jassy*, 24, 151, 1926/27.

Note și informațiuni

Organizarea muncii științifice în România.—Este o problemă care ar trebui să ne preocupe în cel mai înalt grad, dacă dorim ca știința românească să fie pusă pe o cale bună, pe calea propășirii în adevăratul înțeles al cuvîntului. Altfel toate eforturile noastre vor rămînea zădărnice.

Dela un timp încoace piedicele și greutatea ce stau în calea acestei propășiri, sporesc neconținut în țară la noi.

Care este situația actuală ?

Institutele și laboratoarele universităților noastre, în cea mai mare a lor majoritate, sînt nesuficient utilizate, bibliotecile lor au rămas în urmă cu periodicele, colecțiile de reviste științifice sînt necomplete. Nu se mai poate interprinde nimic serios în domeniul științific din cauza acestor lipsuri, care devin din ce în ce mai mari, cu cît timpul trece. Nu mai sîntem siguri, din lipsă de informații științifice, dacă chestiunile propuse candidaților noștri la doctorat, n'au fost lucrate aiurea. Se știe că pentru astfel de chestiuni bibliografia este o necesitate primordială. Or, tocmai sub acest raport sîntem în urmă cu cel puțin zece ani. Fonduri pentru a ține la curent cu periodicele științifice bibliotecile noastre nu avem de nicăiri.)

Ce este de făcut ?

Cred că prima grijă a acelor care au interes ca știința românească să nu lincească, este aceea de a lua măsuri urgente, ca să se alcătuiască mai întîi un repertoriu pe specialități, de toate revistele care se găsesc la diferitele biblioteci, începînd cu cea a Academiei și sfîrșind cu bibliotecile laboratoarelor, clinicelor și seminarilor.

Cînd se va cunoaște exact, numărul periodicelor care există în țară, unde a-nume se găsesc și dela ce an pînă la ce an, atunci se va putea remedia răul care amenință să zugrume în fașă orice întreprindere științifică românească,

Odată alcătuit acest repertoriu, se va publica și trimite tuturor bibliotecilor din țară și mai ales acelor din centrele universitare.

Vom ști astfel precis unde se găsesc revistele de care avem nevoie și dacă sînt ele la curent.

Această inventariere absolut necesară ne va arăta lipsurile mari de care suferim și măsurile ce trebuiesc luate din timp. Dar, sînt sigur, că repertoriul făcut va dovedi că la diferite biblioteci există periodice care se găsesc și la altele.

Dacă unele reviste nu există nicăiri și sînt indispensabile pentru anumite cercetări, nu rămîne decît să fie cumpărate dela începutul colecțiilor, însă numai pentru o singură bibliotecă importantă, cum ar fi de exemplu biblioteca centrală a Universității din Cluj sau din Iași.

Dacă anumite reviste se află la mai multe biblioteci, atunci numai cea bibliotecă va avea dreptul a le ține la curent care posedă colecțiile cele mai complete.

Se vor realiza astfel economii însemnate, care să permită dobîndirea de reviste noi, utile cercetărilor.

Institutele sau laboratoarele care nu au revistele trebuitoare ce se găsesc totuși la alte instituții, să aibă dreptul de a împrumuta volumele necesare pe timp de o lună sau maximum o lună jumătate, după care să fie obligate a le restitui bibliotecii dela care le-a luat cu împrumut. Pentru cei ce nu și ar respecta această obligație, se pot găsi sancțiuni destule și în primul loc pierderea dreptului de a mai împrumuta ar fi cea mai usturătoare.

Nu este deci necesar ca orice bibliotecă să posede toate revistele care îi sînt trebuitoare, ci numai unele din ele și anume pe acele care nu se găsesc aiurea, în țară, păstrînd bineînțeles și colecțiile de reviste incomplete pe care le posedă.

Prin urmare pentru a pune pe o cale bună organizarea muncii științifice în România și a asigura astfel propășirea științei românești sînt în primul loc necesare stabilirea și publicarea repertoriului de reviste științifice aflătoare la toate bibliotecile.

Ministerului Educației Naționale i-ar putea reveni această sarcină, creînd un serviciu al bibliografiei științifice. Toate bibliotecile din țară ar fi obligate ca într'un termen oarecare, să înainteze acestui serviciu o listă de reviste ce posedă, pe specialități și ani, în vederea alcătuirii acestui repertoriu. Acest lucru este deja făcut de foarte mult timp în străinătate. De ce nu s'ar putea realiza și la noi?

Apoi se vor lua măsuri de completarea lipsurilor. Să se raționalizeze abonamentele pe centre universitare sau științifice (muzee, institute, independente de universități). Dar să nu se centralizeze colecțiile de publicații periodice numai la bibliotecii mari cum este cea a Academiei Romîne sau a Fundațiilor Carol.

Odată rezolvită această problemă a repertoriului bibliografic și odată umplute golurile, fiecare bibliotecă să fie obligată a împrumuta, contra recipisă semnată, aceste publicații periodice la cererea altei biblioteci, laborator, clinică sau seminar, pe timp de cel puțin o lună.

Adeseori acest schimb de bune oficii nu este posibil la noi în țară. Mai curînd obținem cu împrumut reviste dela bibliotecile din Viena, Leningrad sau Berlin, cum am avut eu însumi ocazia să constat, decît dela bibliotecile noastre.

Este evident că fără această osmoză, fără această circulație a publicațiilor, nu se poate face nimic serios la noi, afară de cazul cînd fiecare am avea în bibliotecile institutelor sau laboratoarelor noastre toate revistele de specialitate ținute la curent.

Se impune deci să rezolvim cît mai este vreme această spinoasă problemă, dacă nu voim să rămînem în urmă cu ani față de Occident și să nu mai putem ataca cu succes nici o problemă științifică. Căci timpul trece ireparabil, iar lacunele și greutățile se tot adîncesc și devin tot mai mari.

O altă grijă de căpetenie a acelor care au interes ca, știința romînească să nu stagneze și să nu se stingă prin inaniție, este înzestrarea laboratoarelor de diferite specialități cu echipamentul necesar cercetărilor, fiindcă din taxele impuse studenților nu se poate avea nici materialul didactic curent și nici chiar materialul necesar întreținerii curățeniei în laboratoare, necum reviste ori echipament de investigații!

Avem oameni de știință, conducători de institute științifice cu nimic mai prejos decît cei din Apus, însă fără aparate și unelte de investigație ei sînt ca soldații fără arme.

Focul sacru, pasiunea pentru știință, avîntul, sînt condiții necesare, dar nu suficiente pentru crearea de opere științifice. Este zădarnic atunci să cerem profesorilor și personalului lor științific ajutor lucrări științifice, fără rezolvirea problemei completării colecțiilor de periodice și fără echiparea laboratoarelor și institutelor științifice cu mijloace tehnice de investigație.

Este sigur că, din cauza împrejurărilor grele prin care trece țara soluționarea completă a acestor chestiuni și în timpul cel mai scurt nu este posibilă. Însă an cu an și în mod metodic s'ar putea îndrepta lucrurile, acordîndu-se fonduri pentru bibliotecă și fonduri pentru utilaj științific, întii laboratoarelor celor mai sărace și apoi celorlalte.

Fiecare laborator ar trebui deci să fie obligat a înainta Ministerului Educației Naționale, ori Ministerelor de care depinde, o listă de toate instrumentele de cercetări pe care le posedă și care pot fi utilizate în acel serviciu, precum și o listă de aparatura de care are absolută nevoie pentru buna sa funcționare, atît didactică cît și științifică.

Completîndu-se aceste lipsuri, randamentul științific și didactic al acestor instituții ar spori, studenții ar putea fi ocupați cu folos și pregătiți bine pentru cariera lor viitoare, știința romînească ar progresa vîzînd cu ochii.

Dacă din contra lucrurile vor merge pe panta pe care merg, atunci ne prăvălim în prăpastie. Și nu vom fi noi de vină.

Deaceia îmi fac datoria ca și pe această cale să atrag atenția celor care poartă grija și răspunderea dezvoltării și propășirii științei românești, a unei științe în legătură cu realitatea românească și aplicabilă la necesitățile vieții noastre, asupra problemei organizării muncii științifice la noi, fără rezolvirea căreia—ca în orice domeniu—nu se poate realiza nimic temeinic și sănătos.

C. MOTĂȘ

Profesor la Universitatea din Iași

Nume de plante.—Nume de plante și unele întrebuintări, adunate din comuna Corod județul Tecuci, care lipsesc din totul în Panțu „Plante cunoscute de poporul român“, București ed. 1929, ori care sînt citate numai pentru anumite localități.

1. *Bostan Moldovenesc (Cucurbita pepo)*. Întrebuintat pentru hrana vitelor, în special a porcilor. Se întrebuintează și de oameni, fiert cu lapte. Din semințe se scoate un ulei foarte bun.

2. *Bostan turcesc sau alb (Cucurbita melo-pepo)*. Are coaja subțire și de culoare albă. Este mai puțin dulce ca cel moldovenesc. Se întrebuintează fiert atît pentru oameni cît și pentru animale.

3. *Ceapă turcească (Allium ascalonicum)*. Are bulbul mare și nu este așa de iute ca ceapa bulgărească.

4. *Caba-ceapa de toamnă. (Allium roseum)*.

5. *Chirisor (Diaplysis carophyllus)*. Plantă ornamentală cu petalele colorate diferit. Cultivată prin grădini ca plantă ornamentală. Se zice chirisor după frunzele care seamănătoare cu a chirului (*Triticum repens*).

6. *Căpriță (Atriplex roseum)*. Această plantă crește prin locuri necultivate. Nu trebuie să fie mîncată de vite, mai ales atunci cînd este udă de ploaie sau de rouă, căci altfel vita se umflă și pleșnește. Se dezvoltă gaze prea multe, care au acțiune asupra tubului digestiv.

7. *Curul găinei (Hioscyamus niger)*. Crește pe marginea drumurilor și a locurilor necultivate. Nu e bine să fie adăscă acasă, căci mor găinile.

8. *Dughie (Panicum miliaceum)*. Plantă cultivată pentru nutreț la vite și pentru grînzile întrebuintate în loc de orez la găinile găluștelor și la prepararea brăncii la țară.

9. *Nebuneală (Datura stramonium)*. Plantă întrebuintată în această regiune a descîntatul viermilor ce se găsesc pe frunzele la vite. Tot cu frunze de nebuneală se fac oblojeli pentru umflături.

10. *Salcânci. (Robinia pseudocacia)*. Nume întrebuintat în comuna Matca, județul Tecuci, în loc de salcîm. Comună de d-l Crăiță, învățător în acea comună.

11. *Lăptugă (Lactuca perennis L.)* Plantă întrebuintată pentru legat snopi de orz. Nu este mîncată de nici un animal ierbivor, din cauza sucului alb care la gust este foarte amar.

12. *Mestecă (Lactuca perennis)*. Nume comunicat de elevul Toma, din comuna Vultur județul Constanța și din comuna Stăncuța jud. Brăila de elevul Rotaru.

I. V. HUZUM.

Cîteva informații asupra numelui „Huțul“.—Sub numele de *Huțuli, Huțul, Huțul, Huțani și Ruski* se ascunde una și aceeași populație, din Obcinele Bucovinei.

Întrebînd personal pe *Huțuli*, din diferite sate, despre originea numelui lor, mi s'au dat mai multe explicații. Cei mai mulți, care au încercat să mi dea vreo lămurire, susțin că numele de „*Huțul*“ vine dela cuvîntul „*hoț*“.

E foarte curios că cei ce mi-au dat astfel de explicații, n'au ezitat nici un moment de a-mi povesti, în continuare, de existența unor faimoși bandiți *Huțuli*, ce cutreerău munții, dînd lovituri pe la boerii Evrei și Poloni, stăpînii moșiiilor din timpul stăpînirii austriace.

Majoritatea acestor „*hoți*“ erau dezertori din fosta armată imperială (mulți dintre ei se refugiau încă înainte de a fi încorporați).

Chiar în colindele *huțule* se cîntă isprăvile unor bandiți, rămași nemuritori în memoria poporului. Sînt locuri din Munții Bucovinei care și-au immortalizat numele, datorită adăpostului pe care l-au oferit acestor *hoți*.

Proveniența numelui „*Huțul*“ dela cuvîntul „*huțcat*“ (a sălta, a se legăna), pare destul de interesantă. Cîțiva intelectuali *Huțuli*, care mi-au furnizat această informație, susțin că în regiunea de munte a Bucovinei *Huțuli* merg mereu călări, *săltînd (legănîndu-se) în șel*.

Deci, acest „*huțcat*“, adică a se legăna (a sălta), cu adaosul: *în șea*, ar fi după ei, adevărata explicație a originii numelui „*Huțul*“.

În prezent, băștinașii își zic „*Huțuli*“ sau „*Huțul*“, iar Romîinii le zic *Huțani*, mai rar *Huțuli* (fără nici o intonație).

În regiunea Brodinei, unii locuitori fac distincție între *Huțuli* și *Huțani*. *Huțanii* după ei, sînt „Romîni de limba rusască”, iar „*Huțulii*” sînt „venetici” din Galiția.

Cînd îi întrebî pe *Huțuli* ce limbă vorbesc, ei răspund că, rusește. Faptul acesta este foarte semnificativ dacă îl a-lăturăm la acela de „*Ruski*”, nume ce și-l atribuie de foarte multe ori.

Foarte rar întâlnești *Huțuli* care să-și zică „*Ruteni*” sau „*Ucraineni*”, de limbă ruteană. (Toți aceștia sînt influențați de spiritul național ucrainean).

Aceste date, culese personal din satele huțule ale Bucovinei, le dau cu titlu de informație, cu adaosul că, sînt absolut obiective, urmărind numai scopul științific.

CONST. I. MARTINIUC.

Un cimitir de păsări în apropiere de Jurilovca.—La 9 August 1938, între orele 10-12 a. m., într-o excursie făcută pe Golovița, am găsit într'un ghiol numit „*Peribiona Goloviței*”, situat în diagonală cu Jurilovca (jud. Tulcea), un număr neobicinuit de mare de păsări acvatice de diferite specii, moarte și muribunde.

Acest ghiol în formă de potcoavă, înconjurat de masive de trestii, avea o adîncime aproximativă dela 10-20 cm. și din loc în loc era presărat cu mici insulițe de mil uscat la suprafață. Pe stînga Periboiniei, mărginită de un cordon uscat fără nici o vegetație, se găseau un număr imens de păsări acvatice, printre care am putut distinge cu binoclul următoarele specii: *Anser anser* (L.), *Anas platyrhynchos* (L.), *Querquedula querquedula* (L.) ș. a. Anatinae, *Larus ridibundus* (L.), *Sterna hirundo* (L.), *Phalacrocorax carbo* (L.) și diferite specii de Charadriidae. În largul ghiolului se aflau solitari; *Egretta alba* (L.), *Egretta garzetta* (L.), *Abdea cinerea* (L.) și un grup de *Pelecanus onocrotalus* (L.) și *P. crispus* (Bruch.).

La apropierea mea această mulțime de păsări și-a luat sborul, rămînînd numai din loc în loc cîte o pasăre solitară, care cu toate eforturile disperate de a-și lua sborul nu reușea fiind foarte slăbită.

Cercetînd acest ghiol cu atenție, am descoperit pe cordonul de uscat și pe insulițele de mil o mulțime de păsări acvatice de diferite specii moarte, în putrefacție sau dela care au rămas numai scheletul și penele, dintre care am recunoscut următoarele specii: *Egretta alba* (L.), *Egretta garzetta* (L.), *Ardea cinerea* (L. ?), *Platalea leucorodia* (L. ?), *An-*

ser anser (L.), *Anas platyrhynchos* (L.), *Querquedula querquedula* (L.), *Larus ridibundus* (L.), *Sterna hirundo* (L.) (într'un număr foarte mare), *Tringa totanus* (L.), *T. glareola* (L.), *T. hypoleucus* (L.) ș. a. Charadriidae, aproape toate aceste păsări fiind adulte. Deasemeni am găsit și *I Sterna Hirundo* (L.) juv. sfîșiat, probabil de o pasăre de pradă.

Cauzele căror s'ar datora acest mare număr de păsări moarte și muribunde în acest loc, adevărat cimitir, sînt greu de precizat. Presupunerea unei molime n'ar putea fi acceptată, deoarece în acest caz numărul păsărilor moarte ar trebui să fie mult mai mare, ținînd samă de strînsa aglomerație în care se găseau în acest loc.

Părerea mea este că acest ghiol frecventat de asociațiile de păsări enumerate mai sus, ar servi ca loc de odihnă, aceste fiind într'un număr atît de mare, iar ghiolul lipsit de faună și floră acvatică, nu poate fi vorba de un loc pentru căutarea hranei, și atunci presupunerea că păsările ar muri aici din cauza bătrîneții sau altor accidente (?) ar fi cea mai plauzibilă. Ne putînd din aceste cauze zbura pentru a-și căuta hrană, fiind pe încetul părăsite de puteri din cauza inaniției, ele rămîn în acest loc printre semenii lor, unde-și dau sfîrșitul.


V. ARVENTIEV

Facultatea de Agron. Chișinău

Un chimist român uitat: Neculae Teclu.—Neculae Teclu a fost un mare chimist român, dar spre deosebire de alții, el și-a durat întreaga activitate pe alte meleaguri, la Viena, unde a avut norocul unui mediu științific, și astfel a putut să-și scrie numele în cartea nemuritorilor. Faptul că a fost cetățean al unei țări străine, Teclu fiind de origine romînească, nu aduce nici o stîrbire pretențiilor noastre naționaliste. Valabilitatea unui adevăr științific este aceeași în orice colț de pămînt. O idee mare, indiferent de locul unde a fost emisă și unde și-a imprimat cel dintăi pas, servește întregii umanități după scopul și amploarea ce i se dă, fără ca autorului s-o mai poată stăpîni. Dar ceiaze valorează în primul rînd în realizarea unei idei mari este factorul uman, care este generatorul acelei idei. El apare, în genere, ca un mare binefăcător, și tocmai deaceia naționalitatea lui este prețuită; căci oamenii mari formează elita națiunilor lor, elită care dă cheazășia unei existențe viitoare și mărturia unei justificări trecute. Un român, adică o ființă care

este produsul total al acestui pământ, va rămânea român, ori în ce colț al pământului își va desfășura activitatea creatoare. Avem, prin urmare, tot dreptul să ne amintim că anul acesta se împlinesc o sută de ani dela nașterea celui mare chimist român, care este Neculae Teclu.

Neculae Teclu a văzut lumina zilei la 13 Octombrie 1839 la poalele Carpaților, în Brașov. Tatăl său era un negustor înstărit, ceia ce i-a ajutat să ducă la bun sfârșit un întreg șir de studii superioare. Școala primară și cursul inferior al liceului sâsesc le urmează la Brașov. Trece apoi la Viena pentru a termina studiile



NECULAE TECLU
(1839—1916)

liceale și Politehnica. În dorința de a căpăta o specialitate cu care ar putea face carieră în țara noastră, trece la München pentru a începe studiul Arhitecturii. În acești ani, Teclu s-a arătat a fi un bun gimnastic, a introdus gimnastica în Bavaria ca o îndeletnicire sistematică și a obținut numeroase premii la concursurile de sport. Diploma de arhitect o obține însă la Berlin, de unde se întoarce acasă, cu intenția de a trece în Țara Românească pentru a începe o activitate în slujba neamului său. Pe vremea aceea însă în țara noastră, arhitectura era neînțeleasă, iar arhitecții aproape necunoscuți, așa că lui Teclu îi era dat să rupă unele tradiții și să împămîntenască idei noi. Desigur el s'a arătat a fi mai

puțin om de acțiune, căci nu după mult timp — pe la 1869 — revine la Viena cu intenția de a căuta altă specialitate. Se înscrie la Universitate unde urmează chimia generală, iar la Politehnică cursurile de Chimie tehnologică. Odată obținută licența în Chimie, pornește iarăși spre Vechiul Regat cu aceleași gânduri frumoase de a se pune în slujba neamului românesc. Teclu își face planul să înființeze o fabrică de hîrtie, însă ideile care animau industria pe atunci la noi, erau departe de a-i da vreo încurajare: nu găsește nici capital și nici vreun slab interes. Căile spre ideal fiindu-i închise în Țara Românească, ia din nou drumul Vienei, unde este numit, în 1880, profesor de Chimie la Academia de Comerț. Mai apoi obține ca docent și catedra de Chimia culorilor la Academia de Arte Frumoase, de unde demisionînd ajunge chimist al Atelierului de bancnote al Monetăriei Statului Austriac și al Imprimeriei Imperiale.

Îndeletnicirea de profesor a păstrat o timp de aproape 40 de ani. Astfel, Teclu a putut avea o activitate creatoare pe tărîmul științific. În liniștea laboratorului el și-a înțeles chemarea, și cu o discreție desăvîrșită, a fost stăpînit neîncetat de pasiunea pentru căutarea necunoscutului. Roadele muncii sale le-a așternut în peste șazeci de memorii răspîndite în diverse periodice de specialitate din Germania, în care se poate vedea ingeniozitatea rară și răbdarea cu care urmărea o problemă.

În special, Teclu a închinat un lung șir de articole — publicate într'un răstimp de aproape 20 de ani, 1891-1910, în *Journal für praktische Chemie* — studiilor asupra flăcării. Teclu a cercetat o serie de fenomene caracteristice flăcărilor. Interesantele rezultate obținute l'au condus la construirea unei lămpi de laborator — cu mult mai eficace decît lampa primitivă a lui Bunsen, dînd o temperatură mai ridicată — cu o întrebuințare generală în țară și chiar în străinătate, a unui radiometru pentru determinarea intensității radiațiilor și multe altele. O altă serie de cercetări se referă la inversarea flăcărilor — arătînd că nu există nici o deosebire între gazurile combustibile și cele comburente — și la flăcările explozibile. Imaginează aparate pentru prepararea ozonului, pentru solidificarea bioxidului de carbon, apoi un dispozitiv pentru sinteza apei din arderea gazelor și unul care dă posibilitatea de a observa diferențe de presiuni extrem de mici — 10^{-8} mm. — bazat pe observația că flă-

cările au o extraordinară sensibilitate la variația presiunii atmosferice ambiante. În legătură cu aceste cercetări, Teclu face o serie de constatări ajungând la rezultate pozitive în ce privește posibilitatea de a descifra scrierea de pe hîrțile carbonizate sau arse. Este ușor de înțeles cît de utile pot fi aceste rezultate în salvarea datelor importante de pe hîrțile de valoare distruse de foc. Mai tîrziu, într'un articol publicat în *Analele Academiei Romîne* din 1913, arată netemeinicia afirmațiilor despre existența arderilor fără flacără a amestecurilor de gaze. Rezultatele acestea importante, Neculae Teclu le-a rezumat într'un articol publicat în această revistă în 1913¹⁾.

Teclu, om de o imaginație bogată, avînd și cunoștințe solide în afară de domeniul chimiei, a încercat să rezolve zborul cu aparate mai grele decît aerul, la o epocă—1894—cînd ideile în această direcție deabia începeau să se realizeze cu destulă timiditate. După un document scos la iveală cu mult mai tîrziu²⁾, în care se confirmă, de către prof. George Karschulin dela catedra de Geografie și Istorie, și Karl Müller prof. de Matematici și Fizică, ambii colegi cu Teclu la Academia de Comerț, ideile marelui chimist, ne putem da seama de valoarea lui. Iată acest document:

Confirmare

Subsemnații confirmăm prin aceasta colegului lor, d-lui profesor Neculae Teclu că D-sa, relativ la principiile după care s'ar putea rezolva chestiunea navigației aeriene, a exprimat următoarele păreri:

1. Ridicarea și mișcările corpului plutitor în aer, în toate direcțiile se vor face prin aparate prevăzute cu aripi.

2. Ca forță motrice se va întrebuința forța de expansiune a gazelor, ce se produce din corpurile ușor explozibile, astfel regulate ca să se aprindă încetul cu încetul.

3. Aceste condiții se vor putea îndeplini întrebuințînd aripi cu elice, asemenea roților lui Segner, iar ca material motric se va folosi praf de pușcă ce produce puțin fum.

*Dr. George Karschulin.
Karl Müller.*

Wiena, 7 Iulie 1894.

Aceiași lipsă de înțelegere și de capital a împiedecat ducerea la îndeplinire a acestei importante chestiuni, care nu

după mult timp a putut deveni o realitate, datorită altor cu mai mult noroc.

Neculae Teclu a avut calitățile mari ale neamului românesc. Erudit în înțelesul adevărat al cuvîntului, de un incomparabil talent în realizările practice, și avînd o imaginație cu adevărat uimitoare, Teclu rămîne ca unul din marii noștri chimiști.

Teclu a fost un bun român, mai mult chiar decît mulți alții, și prin sentimentele sale patriotice. Faptul că și-a petrecut aproape toată viața în Austria, nu l-a împiedecat să simtă și să gîndească romînește. El nutrea, ca și alțiștea alți transilvăneni, dorința unică tuturor romînilor.

A fost ales membru al Academiei Romîne, în 1879, cînd după războiul independenței, vechea Societate Academică și-a luat numele cel posedă și astăzi.

La ședința anuală a Academiei din Iunie 1916, Teclu a luat parte pentru ultima oară, cu toate complicațiile internaționale de atunci, din cauza războiului. Era în preziua intrării noastre în acțiune. Ajuns la Viena, în dimineața zilei de 26 Iulie 1916, Teclu s'a stins liniștit, doar cu tristețea dorului de patrie.

Rămășițele sale nici astăzi n'au fost aduse în țară.

Pe pămîntul acestei țări pe care a iubit-o, singura cinstire ce i se face în fiecare an, și care a fost inaugurată de regretatul profesor G. G. Longinescu dela Universitatea din București, este de a se arăta studenților o bună parte din aparatele imaginate de Teclu — care au fost expuse la expoziția din 1906—și de a se vorbi despre dînsul.

N. AL. FLORESCU.

Aniversarea unei izbînzii aviatice.—

Aviația în evoluția sa este caracterizată prin două fapte: a fost realizată de către simpli amatori — conduși doar de o curiozitate omenească — și apoi a fost încurajată de armată, ridicînd o la rangul celui mai înfiorător mijloc de distrugere. Evident că orice descoperire omenească poate avea consecințe tragice, atunci cînd acea descoperire este exploatată de alți oameni, cu alte țeluri, decît acei care iubesc știința și libertatea. Aviația însă pare că în această direcție contribuie a „deforma umanitatea”—după o interesantă expresie — în gradul cel mai înalt.

Dar fiindcă aeroplanul reprezintă, fără îndoială, una din cuceririle omenești a cărei primă idee noi o cunoaștem ca un mit, el este și va rămîne întotdeauna

1) Anul IV, No. 4, p. 189—193.

2) De către I. Moisil, *Natura*, Anul XVIII, Dec. 1929.

una, și un factor de progres al civilizației.

Viața aeroplanului nu a atins încă jumătate de veac. Quasi-realizat pentru prima dată în America de Nord de către frații Wright, aeroplanul a primit adevăratul botez al aerului, ca o încununare a reușitei, în Franța. Curioși de a se avînta în văzduh, s'au găsit în mai toate țările spirite inventive, care să îmbunătățească și să ușureze problema sborului. Știm cu toții că și noi românii am avut o slabă contribuție în această direcție prin Aurel Vlaicu, însă a cărui principii aviatice n'au avut vreun rol important, din cauza morții sale timpurii. Pe atunci aviatorii erau inventatorii, constructorii și piloții.

Prima cucerire în aviație cu adevărat impresionantă a fost traversarea Canalului Mîneei de către inginerul Louis Blériot, la 25 Iulie 1909, adică acum treizeci de ani. Performanța lui Blériot la vremea aceea reprezenta, în afară de o faptă curajoasă, prima afirmație a importanței și sensului noii invenții. Sborul lui Blériot a fost, din punctul de vedere politic și economic, mai important decît celebra aventură de mai tîrziu a lui Charles Lindbergh de a curmezișul Atlanticului, și n'a avut mai puțin răsunet, ca prima emisie de telegrafie fără sîrmă a lui Marconi, la cîțiva kilometri.

Louis Blériot—născut la Cambrai în 1872 și decedat la 2 August 1936—absolvind Școala Centrală—in 1895—este angajat ca inginer într-o mică uzină electrică, în care timp imaginează un dispozitiv de lămpi cu acetilen, care fură lansate cu mult succes. La Expoziția universală din 1900 el vede primul avion. Imdată și-a ancorat gîndurile de noua tehnică a aparatelor de sbor mai grele decît aerul, călăuzindu-și întreaga activitate în această nouă direcție. Din modestele lui resurse materiale și din veniturile aduse de lampa întrebuintată la faruri, își construiește aparate de zbor. Sacrifică și energie și bani scoțînd o serie de avioane din ce în ce mai perfecționate. Incercările l au dus astfel, că ajunge să atingă un parcurs de 41,2 km. în 44 minute și 20 secunde, însoțit de un pasager, în cursul lunii Iulie 1909.

Era însă la limita puterilor și aproape ruinat. Incurajat de premiul propus de ziarul englez Daily Mail în valoare de 25000 de lei, Blériot încearcă o ultimă salvare. Pornește din apropiere de Calais, însoțit de un torpilor pus la dispoziție de guvern, cu același aparat simplu de 25 cai-putere, cu o iuțeală ce nu trecea de 120 km. pe oră, și reușește să parcurgă cei 38 km. ce despart Anglia de Franța. Gloria îi veni mai repede decum se aștepta. Țările îl invită să sboare în capitalele lor, și banii încep iarăși a-l îndrăgi.

Ce simplă și naivă ni se pare astăzi fapta lui Blériot de acum treizeci de ani. Primul sbor al lui Blériot peste ape n'a fost totuși uitat, pentru că este legat de un început. Primul sbor al fraților Wright a durat douăzeci de secunde, pentru că treizeci și doi de ani mai tîrziu, frații Key să întreprindă un zbor de douăzeci și șapte de zile, cinci ore și treizeci și două de minute fără întrerupere. Primul sbor nu avea o iuțeală mai mare de 16 km. pe oră. Anul acesta germanul Wendel a atins fantastica iuțeală de 755 km. pe oră. În Iulie 1938, americanul Howard Hughes a făcut înconjurul pămîntului în 91 de ore. În ultimii ani s'au făcut nenumărate traversări ale Atlanticului și Pacificului, drumuri pe deasupra nesfîrșitelor ape de mai bine de 6000 km. lungime. Iar ultima faptă demnă de reținut este a doi aviatori, Rossi și Esmond, care cu ajutorul unui bimotor, au parcurs 10000 km. fără escală. Sborul a durat 32 ore cu o iuțeală medie de 311,6 km. pe oră. Dar acestea sînt izbînzii și a tehnicii și a omului energic, și trec neobservate pentru că astăzi visurile se îndreaptă spre acele fapte, în a căror reușită nici noi nu avem deplina convingere. Acesta este însă imperativul momentului de față.

N. AL. FLORESCU.

PERSONALIA

D-l Gh. I. Nastase, conferențiar definitiv, a fost numit, în urma examenului depus, profesor la catedra de Geografie generală și umană, la Facultatea de Științe din Iași, pe ziua de 1 Oct. 1939.

Dări de samă

Prof. G. Ionescu-Sișești : *Cultura grâului*. Ed. Cartea Românească, 1939.

De curînd literatura agricolă românească s'a îmbogățit cu o foarte interesantă lucrare tratînd despre „Cultura grîului” cu privire specială la condițiunile din România, a cărei autor este d-l G. Ionescu-Sișești, profesor la Facultatea Agronomică din București, Director al Institutului de Cercetări Agronomice și membru al Academiei Romîne.

Acest tratat vine la timp, dacă avem în vedere că în programul de ridicare a agriculturii romînești cultura grâului ocupă un loc principal. Datorită politicii de încurajare de către Stat a culturii grîului, agricultorii noștri se vor sili să producă grîu cît mai mult și cît mai bun, ceea ce este imposibil fără concursul științei. Iată pentru ce socotim lucrarea d-lui Prof. G. Ionescu-Sișești, ca un eveniment de foarte mare importanță pentru împrejurările actuale.

Lucrarea D sale este foarte bogat documentată și pusă la punct cu ultimele noutăți științifice. Se remarcă, deasemeni, claritatea excepțională cu care sînt expuse cele mai aride chestiuni științifice, lîmpezimea stilului, ocolirea expresiilor străine de limba romînească, fapte care procură cititorului o deosebită satisfacție, făcînd cartea accesibilă, totodată, și persoanelor ce posedă un nivel de cunoștințe științifice ceva mai redus.

Trebue să scoatem în evidență și să subliniem cu toată căldura, și faptul că, în documentarea lucrării, autorul se sprijină aproape exclusiv pe experiențe executate pe solurile și în clima Țării noastre. O astfel de documentare dă o valoare de neprețuit oricărei lucrări cu caracter agronomic, ce se referă la Țara noastră.

Această carte cuprinde următoarele capitole :

I. Istoric. II. Importanța grîului în agricultura Romîniei. III. Descrierea botanică. IV. Clasificația speciilor, varietăților și solurilor. V. Ameliorarea grîului. VI. Soiurile de grîu cultivate în România. VII. Compoziția grînelor romînești. VIII. Condițiile naturale de vegetație. IX. Îngrășămintele. X. Asolamentul și lucrarea

solului. XI. Semănatul. XII. Lucrări de îngrijire. XIII. Grîu de primăvară. XIV. Boalele și dușmanii grîului. XV. Recolta.

Dat fiind competența cu care autorul tratează diferitele chestiuni de specialitate, precum și modul armonios cum el știe să îmbine știința cu practica, sîntem siguri că acest tratat va fi primit cu cea mai vie satisfacție nu numai de specialiștii agronomi, dar și de agricultorii practici.

N. ZAMFIRESCU.

Armand de Gramont : *Problèmes de la vision*. Bibliothèque de Philosophie scientifique, 1939, 282 pag. 19 fig. Ed. Flammarion, Paris. 22 franci.

Vederea este unul din actele fiziologice a cărui importanță în echilibrul vieții—în special la om—este prea bine cunoscută. Problemele viziunii atît de ordin fiziologic, psihologic, cît și fizic, n'au ajuns la complecta desvăluire; ele desigur fac parte din acele chestiuni importante ale biologiei, care fac ca omul, după cuvintele lui Alexis Carrel, să rămînă încă o ființă necunoscută.

Prof. A. de Gramont, care a emis o importantă ipoteză asupra explicării percepției colorilor, încearcă să explice, ca fizician, ansamblul chestiunilor ce privesc viziunea. În cuprinsul acestei dări de samă nu se va putea da decît schema generală a lucrării.

Prima parte este consacrată descrierii ochiului din punct de vedere fiziologic, a defectelor și cromatismului lui.

În partea doua autorul expune fenomenele fizice ce se petrec în mediul spațial în legătură cu viziunea: reperajul în cîmpul vizual, iluziile optice, perceperea reliefului.

În ultima parte, sînt expuse teoriile asupra transmisiei cromatice. Percepția colorilor este o operație sensorială extrem de complicată. Explicația acestui fenomen fiziologic, ținîndu-se seamă că ochiul poate distinge pînă la 200 de tonuri diferite, cît și de existența acromatopsiei, nu este dusă încă la bun sfîrșit. Ipoteza lui Young asupra existenței a trei soiuri de fibre nervoase corespunzînd la trei culori principale, sau a lui

Cramont care admite existența rezonanțelor retinieni după principiile piezoelectrice, au încă nevoie de confirmări.

Cartea poate fi citită de oricine, chestiunile tratate fiind de un interes absolut general.

N. AL. FLORESCU.

Agenda chimistului. Editată de Cartea Românească. București, anul IV, 1939—524, 524 pagini și numeroase figuri.

Prin publicarea „Agendei chimistului”, Editura Cartea Românească și-a definit mai exact scopul ei de a fi, în primul rând, închinată progresului culturii românești. Fapta aceasta, desigur, situează marea Editură pe un nivel cu totul deosebit de celelalte întreprinderi de aceeași natură. Agenda aceasta prin conținutul ei nu poate interesa în mod special decât o fracție infimă a publicului cititor, și totuși nu s-a preocupat scoaterea ei într-o ireproșabilă tipăritură. Dealtfel Editura Cartea Românească, sub imboldul spiritual al d-lui profesor I. Simionescu și sub conducerea unui grup de tineri ingineri chimiști, publică o revistă trimestrială „Buletinul Laboratoarelor” în care informează și ține la curent, despre evoluția și nouile creații în aparatura științifică.

Prin publicarea „Agendei chimistului”, Editura Cartea Românească vrea să-și continue pe același plan superior ajutorul neprețuit pentru ridicarea științei în România. Ajunși la al patrulea an, redactorii au ținut să înnoiască materia, pentru ca publicația să pară mai vie și să stărnească un interes continuu pentru cititor.

Ca conținut, Agenda cuprinde un material ales astfel, ca să fie de toată utilitatea celor care apelează la metodele Chimiei. Materia este aranjată în cinci părți ordonate în modul următor:

Prima parte, consacrată părții calendaristice, prezintă aproape zi la zi evenimentele importante — întâmplări și date biografice — în special despre știința și viața culturală românească. Este un calendar al omului de știință în care figurează ca sfinți, marii savanți.

În Panteonul chimiștilor români sînt pomeniți profesorii G. G. Longinescu și Al. Zaharia, morți decurînd, și care au fost printre marii pioneri ai Chimiei românești.

Partea a treia și cea mai dezvoltată — redijată de d. inginer Demetrescu — conține „o privire generală asupra metodelor folosite astăzi în Chimia analitică, punîndu-se în evidență și contribuția chi-

miștilor romîni la aceste metode”. Sînt expuse metodic și cu suficientă claritate metodele de analiză chimică, cele clasice precum și unele apărute recent — dielcometria, polarografia. Acestea din urmă prea puțin introduse ca procedee de laborator au incontestabile avantaje, și înfățișarea lor va folosi mult. În ceea ce privește expunerea acestor metode, sînt de părere ca la o nouă ediție, să fie revăzută de către un fizician, pentru a căpăta atît în claritate cît și în precizie.

În a patra parte sînt înșirate toate Laboratoarele de Chimie existente în România, dîndu-se la fiecare cite un mic istoric, scopul și activitatea. Și aici am fi de părere, ca în loc să se dea numărul lucrărilor ce s-au executat în Laboratoare — număr dealtfel de o valoare relativă neavînd nici o semnificație — să se expună în cîteva cuvinte chestiunile importante care au fost abordate de cercetătorii români.

Ultima parte, care este o listă a principalelor întreprinderi științifice, industriale, este deopotrivă interesantă și utilă.

Fără îndoială că, „Agenda chimistului” este de un real folos pentru chimiști, farmaciști, ingineri, medici, profesori și studenți, și poate mulțumi chiar și pe cei exigenți.

Ing. N. AL. FLORESCU.

N. T. Leontescu: *Biografiile oamenilor iluștri*, 235 pag. Edit. Universul. București 1938, preț 90 lei.

Oamenii iluștri nu pot fi decît creatorii. Acel care au creat ceia ce va rămînea etern în domeniul spiritualității, sînt geniile, creatorii faptelor pămîntești care rămîn în Istoria lumii, sînt eroii, iar cei care au creat Nirvana sînt asceții. Numai aceștia formează aristocrația energiilor umane.

În înțelesul acesta, o culegere de biografii ale iluștrilor dispăruți este o lucrare pe cît de valoare, pe atît de utilă. A avea la îndemînă posibilitatea de a-ți aminti de marii oameni, a avea înfățișat cu claritate în mod critic caracteristica și valoarea operii lor, este de o importanță tot atît de mare pentru intelectual, student sau profan. Oricine din noi a apelat deseori la enciclopediile ce le-a avut la îndemînă ca să-și reamintească de marile figuri. Cîteodată simți nevoia de a avea adierea entuziasmului sau melancolia marilor fapte; numai viețile mari îți dau înfățișarea superbă a vieții omenești.

N'ași putea spune că lucrarea despre care țin să vorbesc — pe lingă valoarea

priorității în limba românească — nu are calitățile strict necesare, numai că autorul, neținând seamă de adevărata accepțiune a cuvântului „ilustru”, introduce personaje fără nici o valoare istorică, științifică, artistică sau morală (de ex. regina Elisabeta a Angliei). Dacă titlul ar fi fost lipsit de termenul „ilustru”, am fi înțeles că lucrarea constituie o culegere de vieți de personaje de diverse categorii, și nu ne ar fi mirat prea mult văzînd viața lui Newton descrisă alături de a Ecaterinei II. Căci nu se poate înțelege meritul datorit întâmplărilor sau cel moștenit. Cu totul alta este valoarea unui spirit creator sau a unuia ce a îndeplinit fapte mărețe, decît a unei persoane care a rămas posterității prin simplul fapt că a purtat un titlu sau un rang. Existența acestor din urmă este atît de ștearsă, încît povestea vieții lor ar putea fi doar un roman banal. Sensul cuvîntului ilustru nu se leagă numai de întâmplările miraculoase din timpul vieții, ci mai mult de faptele care dăinuiesc dincolo de moarte, și cărora noi le datorăm imense avantaje.

În afară de această obiecție, se poate reproșa autorului unele scăpări, care au darul de a altera armonia întregii cărți. Astfel autorul—probabil mai familiarizat cu cultura literilor și a filosofiei—înfățișează pe oamenii de știință sub un unghiu prea strîmt. Evident că este destul de greu a infățișa în cuprinsul unei coloane de tipar biografia unui om, din care să se vadă și importanța lui, de aceea și cartea d-lui Leontescu nu poate fi fără de păcate. Totuși autorul are meritul de a fi alcătuit o carte interesantă, antrenantă chiar, în care—cu unele scăpări—nici o frază nu este inutilă. Astfel, într-o singură frază este dată întreaga tragedie a Sf. Ioan Gură de Aur: „Condamnat și depus fără să i se dea posibilitatea să se apere, readus pe scaunul patriarhal după un cutremur de pămînt și mai apoi din nou depus, vigurosul predicator moare în exil la Comane, în ziua de 14 Sept. 407, lăsînd în urma sa o serie de splendide pageniricuri, homelii și scrisori, prin care recomandă credincioșilor săi că este mai creștinește să convingi decît să persecuți și că este mai bine să urmărești erezia decît pe eretic”; iar despre Platon aceste simple și frumoase cuvinte: „Trecînd în cele eterne într-una din nopțile anului 347 în timp ce petrecea la nunta unui elev, rămășițele pămîntești ale divinului filosof au fost așezate spre putrezire în preajma grădinii care-i fusese atît de dragă, foș-

netul platanilor pe sub care se plimbase de mii de ori discutînd cu genialul său Aristot despre o Republică ideală, avînd să-i cînte veacuri de-a-îndul imnul celor nemuritori”.

O mai mare atenție la biografiile oamenilor de știință, ar fi evitat cîteva erori importante. (Faraday: „...explică fenomenul inducției produse într-un circuit metalic...”, în realitate Faraday descopere inducția electro-magnetică; Galileu: „...Privind întîmplător la oscilațiile unui candelabru a observat că acesta cu cît se mișca mai slab cu atît avea numărul oscilațiilor cam de același lungime mai mare”; ceva absolut neclar).

Cartea conține 309 biografii, 63 fotografii și la sfîrșit tablouri cronologice a a faptelor însemnate. Fără îndoială că meritul autorului este apreciabil și sper să rămînă mereu o carte de actualitate.

N. AL. FLORESCU.

Lecomte du Noüy: *L'homme devant la science*. Bibliothèque de Philosophie scientifique. 280 pag. 1939. Flammarion, Paris. Prețul 20 franci.

D-l Pierre Lecomte du Noüy s'a afirmat ca un biolog distins, iar cercetările sale de Biofizică moleculară au o importanță deosebită mai ales prin caracterul lor adînc în ceia ce privește fenomenul vieții. Scrierile sale care iau caracterul unor discuții de ansamblu, s'au arătat a fi de o remarcabilă înălțime.

Autorul—avînd prin urmare ca îndelnicire știința experimentală—încearcă, în cartea de față, să supue la o critică logică conceptele, raționamentele și teoriile științei actuale, luînd ca bază *faptul științific*. Înlăturînd dogmatismul, care încătușase în ultima vreme un număr de teorii, disprețuînd logica și dogmatica, a căror rațiune de a exista o ignorează, situîndu-se între mistică religioasă și antireligioasă, autorul filosofează asupra valorii științei actuale și a rolului pe care-l joacă omul și viața în fața științei. Aspectele metafizice ale problemelor științei rămîn în afară de preocupările autorului, căci el afirmă că știința niciodată n'a retractat vreo afirmație ce decurge din faptele riguros stabilite.

Pornind dela ideia că, singurul ghid indiscutabil în cunoștințele noastre este faptul științific, d-l Lecomte du Noüy subliniază existența relativității științei față de om; a imposibilității de a neglija omul în edificarea științei noastre: „În absența omului, universul n'ar mai avea nici o formă, nici o valoare”; „Orice

dată științifică comportă în mod necesar un element esențial: factorul uman". Fenomenul sau faptul științific nu poate fi conceput în afară de prezența omului. Poziția omului față de univers—relativitatea fenomenelor față de noi—este tradusă tocmai prin acest rol de receptor al omului, care dă o transformare macroscopică a faptelor elementare: „Cunoașterea noastră nu poate fi decât relativă". Existența sau inexistența identității între universul real și imaginea lui pe care o evocăm noi—fapt imposibil de demonstrat—constitue un punct obscur în evoluția științei. Aceiași relativitate a fenomenelor naturii în raport cu omul, face să joace un rol important noțiunea de *continuitate* și opusa ei: „Continuitatea este întotdeauna o iluzie subiectivă".

Empirismul și relativismul acesta este dar înfățișat atunci când autorul vorbește despre *legile noastre științifice* sau despre *adevărul științific*. Legile sînt a posteriori după cum sînt „esențialmente relative și subiective și validitatea lor este strict legată de om". Admiterea principiului cauzalității este indiscutabilă. În ce privește adevărul științific, noi nu vom înțelege semnificația sa, „cît timp nu vom cunoaște relațiile ce unesc un fenomen fizico chimic cu fenomenele vitale și psihice, care-l pot însoți în organismul viu". Noi nu putem avea decât adevărul științific *prin esență uman și relativ* și care este, în definitiv, chiar scopul științei. Iar legătura între realitate și adevăr științific nu se va putea stabili decât prin experiență.

Înlănțuirea faptelor, adică construcția legilor științifice umane, sînt, în general, interpretate prin o serie de metode din care autorul discută pe singura practică și cea mai importantă, analiza, adăugînd cîteva cuvinte și despre interpolare și extrapolare.

Scopul științei este de a înțelege și de a prevedea, adică de a stabili legi. Orice fenomen condus de legile științei noastre, ascunde o dezordine absolută, și numai grație calculului probabilităților s'a putut stabili o armonie desăvîrșită. „Calculul posibilităților are marele avantaj de a permite să se urmărească investigațiile în domeniul în care metodele mecanice nu sînt aplicabile". La scara lumii noastre, nu există decât fenomene statistice care se pot percepe direct.

Tot în legătură cu modul cum știința parvine să prevadă, autorul vorbește despre necesitatea ipotezelor: „ipoteza este sufletul științei".

O caracteristică importantă a fenomenelor naturii este ireversibilitatea lor. Reversibilitatea nu este decât un caz ideal. În special fenomenele vieții au un caracter indiscutabil de ireversibilitate. Științificește, ireversibilitatea poate fi exprimată și interpretată prin probabilități. Ireversibilitatea fenomenelor fiind un adevăr nedemonstrabil, este exprimat prin al doilea principiu al Termodinamicii. Atît măsura cît și sensul acestei ireversibilități este dat de o importantă noțiune introdusă de Clausius, *entropia*. Entropia este singura indicator a sensului de evoluție natural al fenomenelor ce ne înconjoară. Asupra acestei probleme d-l L. du Noüy insistă, tratînd-o cu destulă claritate.

În capitolul intitulat „Critice", autorul arată semnificația legilor statistice și legitimitatea calculului probabilităților de a fi generalizat în diferitele domenii, ale Fizicii și în fenomenele vieții. Analizînd unele rezultate ale Biologiei, concludă că legile statistice cît și al doilea principiu al Termodinamicii aplicat la ființele vii, se arată a nu fi posibile, „căci omul nu percepe psihologicște decît calitatea, pe cînd știința nu ține seamă decît de cantitate". În lumea subatomică legile statistice, însă alte statistice decît cele ale lumii macroscopice, au o totală valabilitate.

În ce privește ideile asupra originii ființelor și lucrurilor, autorul expune teoria evoluției, a determinismului și finalismului. D-sa arată fiecareia o parte din scepticism, căci afirmă: „originea vieții rămîne în întregime misterioasă". Finalismul prezintă însă avantajul de a admite legile statistice. Concluzia autorului este că, cu tot progresul științific „nu s-a putut trece din domeniul inorganizat la viață, și dela viață la gîndire", deoarece „între imaginea pe care știința ne-o poate da despre om și realitatea acestui om, este aceeași deosebire ca între planul unui oraș și viața intimă a locuitorilor acestui oraș".

În concluzie, autorul, partizan al științificismului, — „Știința pură este magnifică și merită mai mult decît oricare altă manifestare a activității umane o admirație fără margini"—păstrează calea medie: nici materialismul absolut și nici spiritualismul absolut nu reprezintă un punct de vedere complet al soluției practice ale diverselor probleme științifice. În ce privește problema vieții, autorul nu vede soluționarea ei, atît timp cît la baza universului nostru material vor rămîne conceptele de astăzi. „Omul în com-

plexitatea sa, trebuie considerat ca o problemă unică“.

Cartea d-lui L. du Noüy este un interesant studiu critic al științei actuale și a semnificației științei în raport cu omul, a relativității și sensului ei de evoluție. Chestiunile atacate sînt interesante și prin aceea că, ele sînt expuse de un om de

știință, și nu au aspectul de speculații pur filosofice. În această direcție putem cita cuvintele autorului: „Il ne faut pas que nous perdions de vue la relativité des réponses de la science et leur caractère superficiel quand nous voulons philosopher“.

N. AL. FLORESCU.

Literatură științifică română

REVISTE :

Buletinul Societații de Științe din Cluj, Tomul IX, fasc. 2, Iulie 1939. *P. A. Chappuis*: Subterane Harpacticoiden aus Süd Italien; *Dan Rădulescu*: Les intervalles musicaux les spectres des molécules et atomes et leur interprétation; *G. Spacu et C. Gh. Macarovici*: Sur une classe d'ammines complexes nouvelles, appartenant au groupe fer- et cobalt-dinitrosoliosulfates; *C. Gh. Macarovici*: Sur la séparation du fer, aluminium et chrome, d'avec le cobalt, le nickel et le manganèse à l'aide de la pyridine; *Dan Rădulescu, Ladislav Novac, Ion Petraru und Simeon Popa*: Beiträge zur Kenntniss der Eigenschaften der Nitrogruppe; *P. A. Chappuis*: Notes sur les Copépodes.—11. Une nouvelle *Attheyella* du Japon.—12. *Chappuisius Singeri* n. sp. de la nappe phréatique du Main; *V. Alexa*: Analyse des eaux minérales des sources de Sângiorz-Băi; *C. Gh. Macarovici et E. Popper*: L'analyse de l'eau et du limon provenant du lac et des alentours des „Bains de la Ville de Turda“; *G. Spacu et C. Gh. Macarovici*: L'action de la pyridine et de l'amoniac sur certaines ammines complexes avec benzidine; *D. V. Ionescu*: Quelques applications des propriétés d'une famille de trajectoires; *D. V. Ionescu*: Généralisation d'une propriété mécanique de la chaînette; *G. Spacu et A. Pop*: Sur une nouvelle classe d'ammines. Les thioannates complexes; *G. Spacu et M. Wancea*: Sur une méthode volumétrique pour le dosage des arsénates.

Analele Dobrogei, anul XIX, vol. III, 1838. (Inchinat Cadrilaterului). *C. Filipescu*: Agricultura în Dobrogea nouă; *Victor Morfeș*: Organizația de credit a Dobrogei sudice; *C. Budeanu și Al. Petrescu*: Realizări tehnice și economice în Cadrilaterul dobrogean; *Virgil Cotovu*: Instalațiile pentru navigația maritimă pe coastele Cadrilaterului; *I. P. S. S. Gherontie*: Înfăptuirii și nevoi bisericești în Dobrogea nouă; *Ioan Micu*: Cetăți, muzee și colecții de antichități din Sudul Dobrogei; *C. Brătescu*: Dobrogea Regelui Carol I și colonizările dobrogene; *O. Mărculescu*: Transmarisca—Turtucaia. Pagini literare: *Gr. Sălceanu*: Regina; 6 Iunie; Credința Marelui Voevod Mihai; *D. Stoicescu*: Colinda din Beller; *I. Lolu*: Coasta de Argint în legende.

Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei, Nr. 9, 1938. *A. Partea administrativă*: Mersul muzeului în 1938; Înființarea Stațiunii limnologice Vălcov; Ocrotirea Monumentelor Naturii

din Basarabia. *B. Partea științifică*. *D. Frunzetti*: Analize chimice de ape din Dunăre, Nistru și din lacul Jibreni; *I. Lepși*: Însemnări despre geografia universală aler Cluverius și Bruzen la Martiniere din anul 1729; *B. Florescu*: Associations de Gobiidés dans les eaux roumaines; *I. Lepși*: Sur quelques moustiques et sur la malaria en Bessarabie; *N. Moroșan*: Depozitele geologice ale fîntinilor arteziene din Chișinău și în special al artezienei noul Nr. 3; *C. Ambrojevici*: Materialien zur Molluskenfauna der pleisto und holozänen Ablagerungen Nordrumäniens; *G. Bujorean*: Lisimetru ecologic, aparat și rezultatele măsurătorilor de pe 3 ani.

Gazeta Matematică, anul XLIV, Nr. 11, Iulie; Nr. 12, August, 1939. Calea Griviței 158, București.

Revista Matematică din Timișoara, Școala Politehnică. Anul XIX, Nr. 5-6, Iulie-August; Nr. 7, 8 și 9, Sept., Octombrie și Noiembrie 1939.

Boletín-Matemático, Buenos Aires, Avenida de Mayo 560. Anul XI, Nr. 5, Mai 1938, an. XII, Iulie 1939.

Natura, București, str. Carol Nr. 26. Anu XXVII, Nr. 7, 15 Iulie; Nr. 8, 15 August; Nr. 9 15 Septembrie 1939.

Arhiva Veterinară, București, Facultatea de, Medicină Veterinară. Vol. XXXI, Nr. 3, 1939.

Viața Forestieră, București, B-dul Tache Ionescu 31. Anul VII, Nr. 8-9, Aug.-Sept. 1939.

Revista Pădurilor, București, B-dul Tache Ionescu 31. Anul 51, Nr. 6, Iunie; Nr. 7-8, Iulie-August 1939.

Revista Științelor Medicale, București. Institutul „Dr. I. Cantacuzino”, Splaiul Independenței 103, Nr. 7-8, Iulie-August; Nr. 9, Sept. 1939.

Endocrinologie, Ginecologie, Obstetrică, Cluj, Clinica Ginecologică și Obstetrică, strada Mico 3. Anul III, Nr. 4, Ianuarie 1939.

Buletinul A. G. I. R., București, str. Romană Nr. 8. Anul XXI, Nr. 6, Iunie 1939.

Tinerimea Română, București, B-dul Schitu Măgureanu Nr. 4. Anul LVII, Nr. 10, Iunie 1939.

Transilvania, Buletin de tehnică a culturii. Sibiu, str. Șaguna Nr. 6. Anul 70, Nr. 3, Mai-Iunie; Nr. 4, Iulie-August, 1939.

Școala Basarabeană, Chișinău, str. I. C. Brătianu Nr. 87 a. Anul VII, Nr. 6, Iunie 1939.

Revista enciclopedică, Cluj, str. General Grigorescu Nr. 16. An. VIII, Nr. 2, Aprilie-Iunie 1939.

Buletinul Meteorologic lunar, București, Institutul Meteorologic central al României. Seria III, vol. IX, Nr. 1, Ianuarie; Nr. 2, Februarie; Nr. 3, Martie 1939.

LUCRĂRI PRIMITE ¹⁾ :

- Tadophile T. Vescan.* — Note sur les orbites relativistes des planètes. Comptes Rendus de l'Acad. des Sciences, Paris. Tome 209, Juillet 1939.
- X. Al. Florescu.* — Perméabilité magnétique axiale des fils et des couches minces de fer, en haute fréquence. Comptes Rendus de l'Acad. des Sciences, Paris. Tome 208, pag. 1717, Mai 1939.
- Perméabilité magnétique axiale des fils et des couches minces de fer, dans

les champs magnétiques de haute fréquence. Ann. Scientifique de l'Univ. Jassy. Tome XXVI, Section I, Année 1940, Fasc. 1, p. 79-153.

M. Guşuleac. — Zur Präzisierung der Nomenklatur der Früchte und der Prinzipien eines natürlichen Fruchtsystems. Ans. „Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi“. Bd. XII, 1938, p. 337-355.

Teofil T. Vescan. — The cosmogonical problem of the annihilation of the sun's mars, and the evolution of the planetary orbits. 1938, Timişoara, 9 pag.

N. M. — Transformarea prin inversiune. Biblioteca Revistei „Pitagora“. Monografia No. 2. Arad, 1939, 32 pag. Preţul lei 25.

¹⁾ In ordina primirei.

A APĂRUT:

România balenară şi turistică

de

E. TEPOSU şi VAL. PUŞCARIU

cu o prefaţă de Prof. I. Iacobovici
cu numeroase fotografii şi schiţe.

Edit. Cartea Românească.

Preţul 250 lei

A APĂRUT:

Cursul de Mecanică

Partea I-a

Noţiuni elementare asupra vectorilor
Calcul algebric, diferenţial şi integral.
Teoria potenţialelor. Teoria câmpurilor.
Noţiuni asupra tensorilor. Exerciţii

DE

Dr. IOAN I. PLĂCINTEANU

Profesor de mecanică la Universitatea din Iaşi

EDITURA LAB. DE MECANICĂ IAŞI — 1939

140 pag. Preţul 100 lei, pt. studenţi 50 lei

A apărut:

Călăuza Ceahlăului

Se poate comanda la Soc. de Gimnastică, Sport şi Muzică, str. Şc. de Arte, IAŞI **Lei 30**

A APĂRUT:

INTRODUCERE

IN

ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM

Inducţia. — Curentul alternativ. — Unde şi oscilaţii electromagnetice. — T. F. S. —
Electroni, raze pozitive, raze X. — Radioactivitatea. — Electricitatea atmosferică.

DE

ŞT. PROCOPIU

Profesor la Universitatea din Iaşi

EDITURA LABORATORULUI DE ELECTRICITATE

Vol. II, 336 pag., 214 figuri.

Preţul 250 lei

A APĂRUT:

INTRODUCERE ÎN ELECTROCHIMIE

DE

P. B O G D A N

La autor

Profesor la Universitatea din Iași

Lei 80

A APĂRUT:

CĂLĂUZA EXCURSIONISTULUI LA MAREA NEAGRĂ

DE

A. POPOVICI-BĂZNOȘANU

și

M. A. IONESCU

Ed. Cartea Românească, Buc.

Lei 90

A APĂRUT:

FAUNA ROMÂNIEI

DE

Prof. I. SIMIONESCU

Membru al Academiei Române

Editura Fundației pentru Literatură și
Artă „Regele Carol II”, București

Lei 200

LES ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE JASSY

Organe de la Société Scientifique de Jassy

apare în fascicule, unite câte patru într'un volum.

Prețul volumului 400 lei.

Pentru orice privește redacția și administrația, a se adresa D-lor Profesori
OCTAV MAYER sau C. MOTĂȘ (Universitatea Iași).

A APĂRUT:

ȚARA NOASTRĂ

Oameni—locuri—lucruri

de **I. SIMIONESCU**

Profesor la Universitatea din București

Cu 249 figuri, 4 hărți și 24 planșe

Prețul lei 200.

Se poate comanda prin
CARTEA ROMÂNEASCĂ

A APĂRUT:

PLANTE VASCULARE

cuprinzând și chei dichotomice pentru de-
terminarea pînă la genuri a Briofitelor din
împrejurimile orașului Iași

DE

CONSTANTIN PAPP

Profesor de Botanică la Facultatea de Științe
din Iași

și

MIHAI RĂVĂRUȚ

Asistent al Laboratorului de Botanică
al Facultății de Științe din Iași

1938 — Editura Laborat. de Botanică din Iași

Prețul 20 lei

CEL MAI MODERN

INSTITUT DE ARTE **BRAWO**
GRAFICE ȘI EDITURA

CONST. BRAHĂ & EM. WOLOTZKY

IAȘI, STRADA ARCU N^o. 9

execută ori-ce lucrări tipografice cu prețurile cele mai avantajoase

Revista Științifică

«V. ADAMACHI»

SUMAR

- Dr. N. L. Cosmovici. — Profesorul Dr. Nicolae Florescu (cu portret).
 Prof. Dr. Ing. Otin Cristea. — Cuvântare rostită în ziua de 14 Octombrie, în Aula Universității Mihăilene, cu prilejul deschiderii cursurilor Școalei Politehnice «Gh. Asachi».
 Ernest Toporescu. — O noțiune nouă în chimie: rH.
 Constantin D. Bușilă. — Politehnica Gh. Asachi.
 Dr. I. Plăcinteanu. — Obiectul Mecanicii (lecție introductivă).
 Andrei Incze. — Cauzele glaciației. Ipotezele mai noi.
 Constantin Papp. — Răspindirea Alkanninei în flora României (cu două figuri).

NOTE ȘI INFORMAȚIUNI

H. Chirilei: Modificări morfologice externe și modificări interne fizico-chimice și fiziologice la plantele unisexuate în timpul dezvoltării; C. Burduja: O nouă stațiune de *Lepidium crasifolium* în Moldova; Alex. Ruscinschi: Observații asupra ciufului de pădure în captivitate; N. Al. Florescu: Molozan; Mihai Răvăruț: O lucrare botanică de mare valoare despre Cheia Turzii; Ing. Virgiliu G. Eneorghiu: Folosirea vântului pentru producerea energiei electrice; C. Motaș: Al VI-lea centenar al Universității din Grenoble; Cozubschi Elena: Bicentenarul Academiei de Științe din Suedia; N. Al. Florescu: Ceva aniversări și comemorări în Fizică, în 1939; C.: Cea mai mare adâncime din Oceanul Atlantic; C.: Numărul locuitorilor din Rusia și Germania; N. Al. F.: Premiul Nobel pentru Fizică, în 1939; Personalita.

DĂRI DE SAMĂ

O carte elementară nouă de Biologie generală (C. Motaș); I. Simionescu: Flora României (C. M.); Ion Simionescu: Mamiferele Pliocene dela Cimișlia (România) (N. Macaroviči); Henry Le Châtelier: De la méthode dans les Science expérimentales (N. Al. Florescu); Albert Einstein et Léonard Infeld: L'évolution des idées en physique (N. Al. Florescu); Erasmus Iuliu Nyárády: Enumerația plantelor vasculare din Cheia Turzii (M. C.); L. Rodewald: Systematische und ökologische Beiträge zur Tardigradenfauna Rumäniens (C. M.); Sălăgeanu N.: Contribution à la méthode de détermination de l'intensité de l'assimilation chlorophyllienne et de la respiration des feuilles aériennes, à de courts intervalles de temps (V. V. Radu); I. Gr. Mihăilescu: Sur un cas de jaunissement rapide à l'obscurité chez les feuilles de *Polygonum cuspidatum* (V. V. Radu); Dr. V. D. Mirza: Histophysiologie de l'Ovogenèse (V. Gh. Radu); Alexe Arvat: Vegetația dela Copanca (M. R.); Emilian Țopa: Vegetația halofitelor din Nordul României în legătură cu cea din restul Țării (Mihai Răvăruț).

LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ ROMÂNĂ

Prețul 50 Lei

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ «V. ADAMACHI»

APARE TRIMESTRIAL SUB ÎNGRIJIREA UNUI COMITET COMPUS DIN D-NII:

I. Simionescu (Profesor Univ. București), **Petru Bogdan**, **Const. Motăș**,
I. G. Botez, **Radu Cernătescu**, **Șt. Procopiu**, **T. Ionescu**, **I. I. Plăcineanu**, **V. Zăhărescu**, **C. V. Gheorghiu** și **Const. Papp**
(Profesori la Universitatea Iași)

Tot ce privește redacția (articole, reviste, publicații) a se adresa D-lui **Prof. Petru Bogdan** sau D-lui **Prof. C. Motăș**.

Tot ce privește administrația (mandate, subvențiuni) să se trimeată D-lui **Prof. P. Bogdan** (Laboratorul de Fizică, Universitatea Iași).

ABONAMENTUL

Un an: 150 lei.

Pentru foștii bursieri ai Academiei din fondul V. Adamachi: 180 lei.

Pentru instituțiuni (laboratoare etc.): 200 lei.

Pentru studenți, preoți, învățători: 60 lei.

Abonamente de încurajare, pentru Instituții și Intreprinderi Industriale mari, **lei 2000.**

Abonamentele se plătesc înainte, după primirea primului număr.

Cei ce nu vor să se aboneze, sunt rugați cu insistență a face cunoscut prin o carte poștală sau a refuza primul număr.

Domnii colaboratori sînt rugați a ține în samă cele ce urmează:

a) Nu se pot tipări articole mai lungi de șase pagini de tipar, nici cu „urmare”; pentru fiecare notă și dare de samă, spațiul rezervat este cel mult 2 coloane.

b) Articolele să fie scrise de preferință la mașină, pe o singură pagină iar figurile definitiv desemnate, separat de text.

c) Colaboratorilor li se trimete numai întîia corectură, dacă doresc.

d) Costul separatelor privește pe autori, care le comandă direct la tipografie.

Ele nu vor putea fi ridicate înainte de apariția revistei și vor purta subtitlul: „Extras din Revista științifică V. Adamachi”. Autorii care doresc separate sînt rugați să indice pe manuscris numărul lor.

e) Manuscrisele se publică în ordinea sosirii; cele nepublicate nu se înapoiază.

Pentru numerele neprimite, ad-ția nu răspunde; cei care doresc, pot căpăta revista recomandat, adăugînd la prețul abonamentului încă 34 lei.

Pentru orice schimbare sau completare de adresă, rugăm a fi vestiți.

Laboratorul de Geologie al Universității posedă colecția revistei noastre dela vol. IX — pînă la ultimul volum. Deasemeni există vol. VII, din care au apărut numai n-rele 1 și 2 din cauza războiului. Vol. I — VI inclusiv sînt complet epuizate, iar din vol. VIII ne lipsește nr. 1.

Prețul unui număr vechi, începînd dela vol. X înainte, este de 50 lei, iar acel al unui număr din vol. VII-IX, de 80 lei.

N. R.—Facem cunoscut cetitorilor noștri că subvenția acestei reviste a fost suprimată. Dacă doresc ea să mai apară, rugăm stăruitor să plătească abonamentele.

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ

«V. A D A M A C H I»

Vol. XXV. — Nr. 4.

Octombrie—Decembrie 1939.

Profesorul Dr. Nicolae Florescu

(1867—1939)

de

Dr. N. L. COSMOVICI

Profesor la Universitatea din Iași

Țara noastră a avut și are mulți naturaliști, în special botaniști, zoologi și geologi; fiziologii în schimb sînt cam rari. E o specialitate pe



PROFESORUL DR. NICOLAE FLORESCU
(1867—1939)

care puțini o îmbrățișază. Anul acesta în plină primăvară s'a stins, aici la Iași, cel mai de samă fiziolog pe care l-a avut țara: Dr. Nicolae Florescu. Pensionat anul trecut, s'a retras la Iași cumpărîndu-și o vilă la

Copou, unde dorea să-și petreacă restul zilelor, deși era craiovean prin naștere și cernăuțean ca profesor al Universității din Cernăuți. Pe când eram student îl știam numai din nume, căci nu era tratat de fiziologie în care să nu-l fi găsit trecut. Deși atît de bine cunoscut în străinătate, totuși și-a făcut drum în lumea noastră universitară cu foarte multă greutate. A izbutit să cucerească titlul de profesor universitar la o vîrstă cam înaintată. Și astăzi par'că resimt acea puternică emoție pe care am avut-o cînd am redactat memoriul ce avea să-l consacre ca profesor universitar la Cernăuți. Ce mulțumire am avut cînd a venit, curînd după aceea, să mă vadă. Mi-am dat sama atunci că aveam înaintea mea nu numai un savant, ci și un om cu însușiri sufletești cu totul excepționale. Era dotat cu o memorie prodigioasă și cu o abilitate tehnică neîntrecută. Stăpîn cu desăvîrșire pe subtilitățile limbii franceze, lucrările sale sînt clare și admirabil scrise. N'a fost numai un eminent profesor, ci și un adevărat savant. A fost bine cunoscut peste hotare și prea puțin înlăuntrul lor, căci era modest, preocupat de cercetări și neîubitor de reclamă. La aceasta a mai contribuit și faptul că noi avem obiceiul de a cita pe oricare străin la curs, numai pe ai noștri nu. Din punctul acesta de vedere, am socotit că e o chestiune de mîndrie națională să-i pronunț numele la curs, ori-decîteori ocazia se prezenta. Am ținut ca studenții noștri să-l cunoască și să-l cinstească așa cum se cuvine.

Activitatea științifică a lui Florescu n'a fost întreruptă decît între anii 1913—1918 cînd a luat parte la campania din Bulgaria și la războiul de întregire a neamului, fiind grav rănit în luptele dela Jiu (1916). După numirea sa ca profesor titular la Cernăuți, toate lucrările pe care le-a mai făcut au fost publicate în Buletinul de științe din acel oraș. Răsfoind acel buletin, am constatat că pînă în ziua pensionării, el a lucrat continuu. Activitate prodigioasă ce însumează 98 lucrări de specialitate tipărite în diverse reviste și periodice străine și romîne.

Următoarele probleme fiziologice au fost studiate de Florescu: Originea fierii și pigmentii biliari. Un total de 9 lucrări publicate în colaborare cu savantul său profesor Dastre. Ei descopăr funcția *marțială* a ficatului, adică raportul intim fiziologic ce există între acest organ și fer. Ficatul are proprietatea de a reține ferul. Pun în evidență un nou pigment hepatic, acela ce dă culoarea cafenie ficatului și care este un proteozat de fer și pe care l-au botezat *ferrina* (pigment apos). Un alt pigment cu proprietăți asemănătoare lipocromilor e denumit de dînsii *cholechrom*. Solubil în alcool-cloroform e un pigment intermediar între lipocromi și pigmentii biliari. Studiază puterea zimatică a pancreasului și prezintă congresului din Cambridge în 1898 un raport asupra labfermentului. În colaborare cu A. Dastre, studiază fenomenul coagulării sîngelui, urmărind acțiunea acizilor, a gelatinei, a peptonei, a sărurilor de fer, a clorurei de calciu și a glicerinei. Ei găsesc că plasma hepatică, rezultînd din macerația ficatului unui animal ce a primit o injecție de peptonă, are proprietatea de a împiedeca coagularea sîngelui, proprietate ce se păstrează chiar dacă fierber extractul. Agentul activ a fost botezat: *zymofrenator*. Deasemenea mai urmăresc și mecanismul imunizării prin peptonă. Aceste cercetări formează un total de 12 articole. Digestia salină a gelatinei formează obiectul unei lucrări prezentate în colaborare cu A. Dastre congresului din Berna în 1895. Se ocupă de digestia papainică. Fermentii solubili din lymfă sînt pe larg studiați (1898). Secționarea nervului sympathetic și efectele acestei secționări sînt urmărite pe diverse organe, fie pe animale, fie pe om (în colaborare cu Th. Ionescu).

Realizează în 1902 suturi încrucișate de nervi. Descopere reflexe nouă (1907). Către sfârșitul carierei sale studiază fenomenele vago-simpatice (1932); reflexele auriculo-termice (1929) și reflexul naso-palpebral (1933). Izbutește să facă rezecții și chiar transplantări de rinichi, (1905). Se ocupă cu reviviscența inimii (1905) și de pulsul digital (1932). Urmărește acțiunea toxică a glandelor cutanate dela broască. Prepară un nou anestezic „benzina iodată”, a carui efect e urmărit pe miță, pe inima de broască și asupra fermentilor (1925—26).

Apa iodată deasemenea ar acționa asupra fermentilor (ptyalină, labferment, drojdia de bere). Studiul puterii catalitice a metalelor formează cuprinsul a două memorii publicate în 1928. Argonul e urmărit în acțiunea sa asupra anesteziei și asupra labfermentului (1936—1938). În ultimii ani s'a ocupat pe larg de două probleme:

1. Studiul fiziologic al drojdiei de bere. Putere catalitică, acțiunea substanțelor toxice, a diverselor metale, a curenților induși și a tensiunilor înalte, a vaporilor mercuriali, a argonului cât și a anestezicilor asupra levurei (1923—1936).

2. Studiul fiziologic al ciupercii Chamboucho. Extractul ciupercii e pus să lucreze asupra inimii de broască, izolată, sau asupra ouălelor de broască. Deasemenea mormolocii de broască sînt hrăniți cu bucăți din această ciupercă și urmăriți în modul lor de comportare.

A construit o canulă gastrică și o pensă excitatrice. Diversitatea subiectelor tratate cât și numărul lor, arată vastele sale cunoștințe în domeniul fiziologiei cât și marea sa putere de muncă. A face suturi de nervi, transplantări de organe și în special de rinichi, înșamnă a fi un abil tehnician. Lucrările sale, în special cele făcute asupra ficatului, vor rămîne clasice. Alături de un Cl. Bernard, Marey, Schiff, Richet, etc., numele lui Florescu stă cu cinste.

* * *

Născut la Craiova în 1867 și-a apărut pămîntul drag cu acea îndirjire pe care numai Românul o cunoaște, căzînd grav rănit pe frontul dela Jiu. A păstrat titlul de bursier al liceului Carol I din Craiova, din clasa I-a pînă în clasa VII-a, dovedind prin aceasta calitățile excepționale ale savantului de mai tîrziu. Universitatea a făcut-o în București. Numit preparator sue treptat toate treptele învățămîntului superior, trecînd prin asistent, șef de lucrări, conferențiar și înfine profesor titular. După luarea licenței în Șt. Naturale în 1894, i se acordă o bursă pentru studiul fiziologiei la Paris. După un an numai, e luat ca preparator onorific de către savantul fiziolog A. Dastre, profesor la Sorbonne, devenid mai apoi colaboratorul său. E perioada marilor descoperiri științifice, publicînd în decursul a 4 ani de studii (1894—1898), cam treizeci de lucrări. Doctoratul său a rămas celebru. Reîntors în țară, e numit prin concurs profesor de Științe Naturale la liceul „Mihai Viteazul” din București în 1900. În 1902 trece ca profesor și director al gimnaziului „Cantemir Vodă”. Ca inspector al învățămîntului secundar, e trimis în 1911 la Paris în vederea reformei învățămîntului universitar și a înființării școalelor medii. Ajunge suplinitorul catedrei de Fiziologie animală la Universitatea din București după decedarea prof. I. Atanasiu. E numit apoi conferențiar și în fine profesor titular la catedra de Fiziologie animală din Cernăuți, catedră pe care o deține pînă în ziua pensionării.

Florescu a fost cu drept cuvînt un intelectual de rasă și o glorie a științei romînești. Bunătatea și delicateța sa sufletească contrastau cu energia și cu puterea sa de muncă. Ele vor reeși din cele ce urmează.

În 1911, am plecat la Paris pentru a-mi trece doctoratul în Fiziologie la Sorbonne. Obligat fiind de a aștepta sosirea profesorului A. Dastre (maestrul meu ca și al lui Florescu a fost Dastre), mi-am petrecut timpul cetind numele savanților înscriși pe frontonul sălii ce dădea în amfiteatru. După cîteva nume de Franceji am cetit numele lui Florescu. Iată în ce chip a știut universitatea franceză să răsplătească pe acela care a făcut cînte școalei ce l-a primit și care a purtat în acelaș timp recunoștință maestrului său iubit, Dastre. De cîte ori împrejurările îl purtau prin țări străine, Florescu cînd ajungea la Paris primul său gînd era să se ducă la Ermont și să depună pe mormîntul maestrului floarea lui preferată „Mușcata”. Se ducea apoi să viziteze pe d-na Dastre. Găsind într-o zi literele de pe mormînt cu desăvîrșire șterse, cumpără o sticlă de tuș și un pen-son și le scrisese din nou. Ultimul său drum a fost în vara anului 1937 cu prilejul expoziției din Paris. Cînd trecu pragul casei văduvei marelui dispărut aceasta îl primi cu surîsul ei blînd: „Știam, domnule Florescu, că ești la Paris”. Văzînd figura lui mirată adaugă: „am găsit pe mormîntul lui Albert mușcate proaspete”.



Cuvîntarea Domnului Profesor Dr. Inginer Otin Cristea,
Rectorul Politehnicei „Gh. Asachi” din Iași, rostită în ziua
de 14 Octombrie, în Aula Universității Mihăilene,
cu prilejul deschiderii cursurilor.

*Domnule Primar,
Domnule Rector,
Domnilor Colegi,
Doamnelor și Domnilor,*

Simțindu-se nevoia, pe de o parte, ca la începutul fiecărui an școlar să se facă o expunere, atît a rezultatelor atinse în cursul anului trecut, cît și a diverselor probleme principale ce s'au pus și care au fost rezolvate în total, în parte, sau poate chiar deloc, iar pe de altă parte, trebuind să se arate ceia ce se urmărește, să se cerceteze, în anul care vine, din ansamblul general al învățămîntului caracteristic școalei respective, s'a adoptat, în special de către instituțiile superioare de învățămînt din toate țările civilizate, obiceiul ca deschiderea cursurilor să se facă într'un cadru solemn, în care reprezentantul autorizat să-și spună cuvîntul său, după care să urmeze lecția de deschidere ținută de un membru al corpului didactic.

Pentru anul acesta sarcina și onoarea de a face această lecție revine D-lui Profesor Ștefan Procopiu, Decanul Facultății de Electrotehnică.

Credincioși acestui frumos obicei, care pentru noi, ce abia intrăm în al doilea an de funcționare, este și necesar, și chiar imperios cerut, facem azi deschiderea solemnă a cursurilor pentru anul școlar 1939—1940.

Solemnitatea am început-o cu un serviciu religios, respectoși față de dă-tinele strămoșilor noștri, care își cinsteau fiecare acțiune mare, prin a-și îndrepta gîndul lor spre a tot puternicul. Aceasta am făcut-o cu atît mai mult cu cît noi considerăm, că nu este nici o incompatibilitate între credință și știință, ba chiar trebuiește să se stabilească o cît mai strînsă legătură și conlucrare între ele, ajutîndu-se și complectîndu-se reciproc și una și alta avînd numai de cîștigat și nimic de pierdut. Una alteia nu-și pot face umbră. Dealtfel baza și

începutul tuturor civilizațiilor vechi și moderne o formează religia ca reprezentînd și întrupînd cultul forțelor supreme și de neînțeles, poate chiar și pentru zilele de astăzi, cînd avem pretenția că deținem, dacă nu totul, dar foarte mult din secretele naturii. Adevăratele bastioane radiante de cultură pentru toate timpurile au fost căștele preoțești, care au jucat un rol de o foarte mare importanță și pe care, trebuie să recunoaștem, l'am îndeplinit cu deplin succes, aducînd foloase mari și prețioase omenirii. Și dacă azi știința este cea care a luat conducerea, religia nu a rămas cu nimic întunecată. Trebuie să dăm fiecăreia ce i se cuvine, lăsîndu-i și recunoscîndu-i meritele ce și-a cîștigat și în măsura ce va ști, să și le păstreze.

Politehnica „Gh. Asachi” se înființează prin decizia Ministerială No. 205660 3 Decembrie 1937, avînd două secții și anume: Secția Electrotehnică și de Chimie Industrială. Prin legea din 3 Noembrie 1938, pentru modificarea și completarea legilor privitoare la învățămîntul superior, și special în vederea raționalizării, Politehnica se întregește cu Facultatea de Științe Agricole de la Chișinău, devenind „Politehnică cu 3 (trei) Facultăți”.

Și astfel, Învățămîntul Aplicat, ce a ființat pe lîngă Facultatea de Științe dela Universitatea Mihăileană, a căpătat ființă proprie, avînd buget și administrație aparte.

De acum progrese se fac văzînd cu ochii. De unde la inaugurarea Politehnicei, în Octombrie anul trecut, posibilitățile materiale erau aproape neînsemnate, astăzi putem spune cu mîndrie, că ne găsim într'o situație înfloritoare, în plină ascensiune, și poate chiar de invidiat, față de multe alte instituții care au la pasivul lor un trecut și o moștenire, ce se cifrează cu deceniile.

Este suficient, să vă spun, că datorită legii de raționalizare din 3 Noembrie 1938, Politehnica noastră s'a îmbogățit c'un număr simțitor de mare de catedre și conferințe.

Dar, toate acestea ar fi rămas fără nici un efect binefăcător, dacă n'ar fi fost urmate prin traducerea în fapt a prevederilor bugetare respective. Spre satisfacția noastră, bugetul pe 1939—1940 ne-a adus surprize, cum nu se pot mai plăcute. În adevăr, datorită interesului și dragostei ce ne-a arătat-o D-l Profesor *Petru Andrei*, Ministrul Școalelor, împreună cu secretarul său general D-l Profesor *N. Dașcovici*, cărora le prezentăm aici cele mai calde mulțumiri însoțite de toată recunoștința și gratitudinea noastră, au fost prevăzute sumele corespunzătoare pentru 6 catedre noi și anume: Catedra de Rezistența Materialelor și Statica Grafică, Catedra de Fizică Industrială, recte Radiotehnică, Catedra de Electrotehnică Generală, Catedra de Mașini Electrice și Stațiuni Centrale, Catedra de Măsurî și Instalații Electrice și Catedra de Chimie Technologică Organică. Iar, următoarele Conferințe, și anume: Conferința de Matematici Generale, Conferința de Desen Industrial, Conferința de Electrochimie și Electrometalurgie, Conferința de Metode și Analize Technice și Conferința de Motori și Mașini Termice au fost înscrise în buget, parte cu sumele întregi, parte completate cu sumele respective, reparîndu-se astfel o mare nedreptate, întrucît existau printr'o ingenioasă (!) invenție, conferințe plătite cu cîte 2000 lei lunar. Nepermis și imoral.

În același buget, catedrele de Chimie Technologică Anorganică și de Chimie Fizică și Analitică, au fost trecute, conform legii de organizare, dela Facultatea de Științe la Politehnică. Ele au fost înzestrate cu cele necesare și prevăzute cu laboratoarele respective, avînd instalațiile cele mai moderne. În felul acesta ne-a fost dată posibilitatea, să ne completăm corpul didactic și să privim cu încredere viitorul.

Dar, ceiace este și mai îmbucurător pentru noi, este înscrierea în buget a unui impresionant număr de locuri de personal ajutător. În adevăr, ni s'au prevăzut fondurile pentru 12 locuri de asistenți, 2 de preparatori și 6 oameni de serviciu, numai la Facultatea de Electrotehnică și Chimie Industrială. Mulțumirile noastre se îndreaptă spre D-1 Vintilă Mihailescu, fostul Director General al învățământului Superior.

Cu modul acesta, întregul personal didactic prevăzut în legea de raționalizare există ca atare și în buget, ceiace ne asigură o bună funcționare și o garanție pentru viitorul Politehniceii.

Se înțelege, că sînt oarecare goluri în ansamblul general al prezentării mijloacelor didactice. Lipsesc cîteva catedre și conferințe, care ar fi putut și trebuit, să fie prevăzute în legea de organizare cu caracter de raționalizare. Însă, în totul, putem afirma cu toată convingerea și spre deplina noastră satisfacție, că din punct de vedere al specialităților cuprinse în tabloul didactic, Politehnica noastră este bine înzestrată și prevăzută cu cele trebuitoare pentru a pregăti temeinic pe viitorii ingineri. Iar dacă, și mijloacele materiale necesare laboratoarelor și bibliotecii ar fi la un nivel ceva mai ridicat, adică la fel cu celelalte Politehnice, atunci cu adevărat am putea spune, că sîntem puși în situația de a ne achita onorabil de însărcinările ce le avem și pe care cu plăcere ni le-am impus.

Privitor la corpul didactic Politehnica noastră are o bună parte din catedrele fundamentale, în număr de 5, dela Universitatea Mihăileană—Facultatea de Științe—catedre, care au funcționat la fostele Institute Tehnice și care, fatal, au trebuit, să le urmeze la constituirea lor în Politehnică, rămînînd astfel comune celor două Instituții.

E dela sine înțeles, că idealul ar fi, ca Politehnica să-și aibă profesorii și laboratoarele ei proprii. În situația de azi, care de fapt este un stadiu de încercare pentru Facultatea de Științe — secțiile de Fizică și Chimie — actuala combinație și conlucrare între Universitate și Politehnică este cea mai fericită aleasă. Nu știm și poate, că e greu de prevăzut, dar mai ales delicat și prematur de spus ceiace gîndim, c'am dori să ne aducă viitorul apropiat. Deviza noastră a tuturor trebuie să fie, să ne folosim cît mai mult și cu cît mai mare cîștig de ceiace avem la dispoziție și să nu încetăm nici o clipă de a pregăti un viitor cît mai bun și cît mai frumos Politehniceii noastre.

Trebuie să se pună la contribuție cu maximum de efect, ceiace avem, fără a intra în noi cheltueli cu aparență de dublă întrebuintare. Dealtfel, armonia cea mai perfectă — cu mici excepții inerente începuturilor — există între Universitate și noi. Și pentru tot ceiace Universitatea a făcut și face sub înțeleapta conducere a actualului Rector D-1 Profesor Dr. I. Tănăsescu, sîntem datori — și o facem cu toată sinceritatea — să exprimăm toată gratitudinea noastră, fiind convinși, că oricît nu este de ajuns pentru a răsplăti bună voința și dragostea ce ni se arată.

Facultățile de Electrotehnică și Chimie Industrială sînt instalate în noua aripă a Universității, ocupînd un spațiu destul de important și putînd face față cerințelor moderne.

Avem înscris însă, în programul nostru cel mai apropiat, ca cel puțin Facultatea Electrotehnică, să o mutăm în noua clădire, ce înțelegem să o construim la Copou.

Studiile necesare acestei construcții au fost făcute de D-1 Inginer Inspector General Andriescu-Cale, profesorul nostru de construcții, și le-am mărginit deocamdată la aripa dinspre șoseaua Copou, reprezentînd o suprafață de 2000 m²,

prevăzută cu parter și două etaje. Privitor la fondurile necesare, am făcut apel la Ministrul Educației Naționale. D-l Ministru Prof. *Petru Andrei* ne-a promis, încă dela începutul lunii Martie, o sumă de 10 milioane, sumă ce ne-ar fi permis să ducem la bun sfârșit această parte din clădirea, în care am fi putut să instalăm întreaga Facultate Electrotehnică. Au venit cunoscutele evenimente internaționale, care au zdruncinat și cele mai bune intențiuni. Dar timpul nu stă pe loc, lucrează, și de data aceasta a lucrat, nu spre folosul nostru.

În luna Iulie, după binevoitoarea și stăruitoare recomandare a d-lui Ministru *Petru Andrei*, obțin efectiv dela Casa Școalelor, prin d. Director General *Ștefan Șoimescu*, căruia îi prezint aici călduroase și pline de recunoștință mulțumiri, suma de lei 500.000. Este mică, însă plină de speranțe, dându-ne posibilitatea, să putem face în această campanie de lucru cel puțin operațiile de curățire și de adaptare, în vederea marelui lucrări ce va urma și pe care o vom pune în executare la începutul campaniei viitoare.

Era pentru noi o chestiune de onoare și de prestigiu, pe lângă una de necesitate, ca să facem anul acesta cel puțin un început de executare a legământului solemn, ce luasem față de noi și de conducerea Municipiului Iași, care ne acordase terenul de cca. 38.000 m² la care, anul acesta, a mai adăugat, printr-o aprobare separată, încă o parcelă de 480 m², înlesnindu-se astfel o intrare demnă și comodă în curtea viitoarei Politehnici. Sperăm, că vom da Iașului una din cele mai falnice clădiri școlare în admirabila poziție de pe dealul Copoului. Pentru toată sollicitudinea ce ne-a arătat-o d. General *Const. Ionescu*, primarul Iașului și ajutorul d-sale d. *M. Borcea*, exprim cu această ocazie toate mulțumirile noastre.

După devizul făcut, ne era absolut necesar — pentru acest început — o sumă minimă de lei 3.000.000. Nu era nici o altă posibilitate decât un împrumut. M'am adresat la Casa de Depuneri, garantind cu taxele școlare. D-l Ministru *Andrei* mi-a dat aprobarea și astfel am putut să fac demersurile necesare cu mare perspectivă de reușită. Trebuia însă, să aranjez cu Universitatea Mihăileană în sensul ca taxa de construcție, ce o vărsam ei, să o întrebuintăm acum pentru plata ratelor noastre, așa cum era și logic și drept. Am găsit din partea d-lui Prof. Dr. *Tănăsescu*, rectorul Universității, totală și inimoasă înțelegere.

Și astfel am putut să ne asigurăm fondurile pentru începerea lucrărilor, ceea ce ne-a permis, ca să și publicăm licitația pentru ziua de 16 Septembrie a. c. Evenimentele cunoscute și starea de spirite excepțională a făcut, ca să nu se prezinte niciun concurent. Am publicat a doua licitație pentru ziua de 7 Octombrie c., cu acelaș rezultat. Am făcut demersuri spre a obține aprobarea forurilor superioare de a construi în regie. Cred, că vom obține asentimentul Ministerului, iar Instituția va avea numai de câștigat.

Acestea au fost dificultățile întâmpinate, cu privire la viitoarea construcție a localului nou al Politehnicii pe care, pentru anul acesta, le-am putut rezolva. Pentru viitor sperăm — dacă bine înțeles și împrejurările vor fi favorabile în sensul de a ne bucura de o stare de liniște și pace — să putem continua lucrarea într'un tempo ceva mai accelerat și să punem, c'un moment mai devreme la îndămina Politehnicii, clădirea atât de necesară dezvoltării ei, corespunzând nevoilor și cerințelor moderne. Pentru anul acesta, deși ne-am bucurat de bunăvoința și dragostea ce ne-a arătat-o d. ministru *Andrei* în întreita d-sale calitate de ministru, de coleg și cetățean al Iașului, nu s'a putut face mai mult. Împrejurările vitrege s'au opus și alte nevoi au venit pe primul plan. Totuși, nu disperăm și credința fermă ce avem în reușita noastră, nu ne-a părăsit, din contra ne-a oțelit.

În cursul anului 1938—1939, Politehnica noastră a primit în anul preparator și apoi a admis definitiv — pe bază de examen — în anul I, următorul număr de studenți și anume :

La Facultatea de Științe Agricole, 94 studenți.

La Facultatea de Chimie Industrială, 42 studenți din 88 înscriși, și

La Facultatea Electrotehnică 50 studenți din 73 înscriși.

Cum însă, pentru anul 1939—1940 s'a desființat anul preparator și, pe deo parte, spre a nu nedreptăți pe actualii studenți admiși în anul întâi, iar pe de altă parte, spre a nu închide porțile Politehniceii noilor bacalaureați, am decis, ca să se primească, numai dintre aceștia și pe bază de examen, cite 50 de studenți la facultățile de Chimie Industrială și Electrotehnică și 60 la cea de Științe Agricole. În acelaș timp, toți studenții proveniți din anul preparator vor avea posibilitatea, să se înscrie și să urmeze cursurile și laboratoarele anului al doilea, spre a-și căpăta treptat-treptat locul respectiv în Politehnică, câștigînd anul preparator. Este o înlesnire dreaptă și meritată, făcută elementelor muncitoare și distinse.

În cursul aceluiaș an au obținut diplome de inginer o serie de studenți, proveniți dela fostele Institute tehnice și anume: 58 în specialitatea Chimie Industrială și 16 în Electrotehnică.

În plus, Facultatea de Științe Agricole a acordat, în sesiunile de Octombrie 1938, Februarie și Iunie 1939, un total de 134 diplome.

Toți diplomații noștri și-au găsit locuri, fiind ceruți și apreciați ca elemente serioase și bine pregătite.

Este de remarcat, că diplomele eliberate sînt de tip universitar. Politehnica va începe, abia în Octombrie 1940, să dea diplomele sale proprii, studenților, care vor absolvi în Iunie 1940. Ei trebuie, să fie înscriși, ca atare, la Politehnică în Octombrie 1938 și să fi urmat deci cursurile și laboratoarele sale în anii III și IV, conform cu regulamentul și legea nouă de raționalizare.

O situație curioasă și împovărătoare o formează așa zișii absolvenți ai fostelor institute tehnice, care în anul trecut au atins impozanta cifră de 231, din care 173 la Chimie Industrială și 58 la Electrotehnică. Marele număr dela Chimie se datorește simbiozei, ce a existat între Facultate și Institut : studentul dela Chimie Industrială fiind și student la Facultate și reciproc. Situație inofensivă în aparență, dăunătoare în fapt.

Este de remarcat și de reținut, că majoritatea acestor absolvenți, produși ai unei demagogii universitare de pe vremuri, nu merită această titulatură, decît numai în senzul și măsura de a-și fi trecut prin universitate numărul de ani prevăzut de lege, fără să fi trecut și examenele corespunzătoare. Unii din ei, luați după examenele trecute, abia dacă ar putea fi înmatriculați în anul II, majoritatea corespund anului III și rare excepții anului IV. Absolvenți adevărați : nici unul. A fost o greșală în felul de a considera și înțelege situația de student. Au suferit studenții și a păgubit școala. Roadele se văd acum. Timp pierdut, decepții, deziluzii și nemulțumiri.

Sperăm și cerem insistent autorității școlare superioare, să ia măsuri și să clarifice o situație anormală, care nu poate și nu trebuie, să mai dăinuiască pentru această categorie de studenți desorientați și fără de nici un căpătii legal și sigur. Să se înceteze odată cu menajamentele dăunătoare, și studenților și prestigiului autorității, și cu începerea noului an școlar să se hotărască definitiv fixarea lor în Politehnică în anul corespunzător studiilor făcute și a examenelor date, față de legea din 4 Noembrie 1938. Actuala stare de lucruri dăunează și școalei și unei bune pregătiri a viitorilor diplomați. Deci, trebuie să se abroge dispoziția din Monitorul Oficial No. 75 din 31 Martie 1938, după

Revista Științifică

„V. Adamachi“

CONȚINUTUL VOLUMULUI XXV

1939

I A Ș I

Colaboratorii la Revista Științifică «V. Adamachi»¹⁾

Alexa Gh., Profesor Șc. Politehnică, Iași
 Alexinschi A., Profesor secundar Tecuciu
 Antoniu-Murgoci Adriana, Asistentă la
 Lab. de Zoologie, Iași
 Arventiev V., Asistent Facultatea de A-
 gronomie, Chișinău
 Atanasu Ion, Profesor la Facultatea de
 Științe din Iași
 Barbos A., Asistent la Lab. de Chimie
 organică, Iași
 Bogdan Petru, Profesor la Facultatea de
 Științe, Iași
 Burduja C., Asistent la Lab. de Bota-
 nică, Iași
 Calinicenco N., Asistent la Laboratorul
 de Electricitate, Iași
 Chelărescu Alex., Asistent la Lab. de Mi-
 neralogie, Iași
 Chirilei Haralamb, Preparator la Lab. de
 de Fiziologie Vegetală, Iași
 Cosmovici L. N., Profesor la Facultatea
 de Științe, Iași
 Cozubschi E., Licențiată în Chimie, Iași
 Farcaș T., Conferențiar la Școala Poli-
 tehnică, Iași
 Florescu N. Al., Asistent la Laboratorul
 de Electricitate, Iași
 Gheorghiu V. C., Profesor la Facultatea
 de Științe, Iași
 Gheorghiu V., Șef de lucrări Laborato-
 rul de Electricitate, Iași
 Gheorghiu I., Asist. la Fac. de Med., Iași
 Huzum V. I., Profesor secundar, Tecuciu
 Iamandi Gr. Gr., Asistent la Facultatea
 de Medicină, Iași
 Incze Andrei, Licențiat în Geografie, Cluj

Ionescu Stan, Profesor la Fac. de Șt., Iași
 Lacrițeanu C., Profesor secundar, Buc.
 Macarovici N., Asistent la Lab. de Geo-
 logie, Iași
 Martiniuc C., Asistent la Lab. de Studii
 Geografice, Iași
 Mastacan G., Asistent la Lab. de Mine-
 ralogie, Iași
 Motaș Const., Profesor la Facultatea de
 Științe, Iași
 Obreja Alex., Profesor secundar, Iași
 Otin Cristea, Rectorul Școalei Politeh-
 nice, Iași
 Papp Constantin, Profesor la Facultatea
 de Științe, Iași
 Plăcințeanu I., Profesor la Facultatea de
 Științe, Iași,
 Popa I. Ilie, Conferențiar la Facultatea
 de Științe, Iași
 Pora Eugen, Asistent la Lab. de Fizio-
 logie Animală, Cluj
 Radu Gh. V., Conferențiar la Facultatea
 de Științe, Iași
 Radu V. V., Asistentă la Lab. de Fizio-
 logie vegetală, Iași
 Răvăruf M., Asistent la Lab. de Bota-
 nică, Iași
 Ruscinschi A., Asistent Facult. Agrono-
 mie, Chișinău
 Soarec I., Licențiată în Șt. Nat., Iași
 Teclu M., Medic veterinar, Iași
 Teodoru Ion, Inginer, București
 Toporescu E., Conferențiar la Școala Po-
 litehnică, București
 Zamfirescu N., Profesor la Facultatea de
 Agronomie, Chișinău

Articole de fond

	Pag.
Alexa Gh. — Fibre textile artificiale	8
Antoniu-Murgoci Adriana. — Filogeneza sistemului urogenital la Vertebratele gnatostomate (cu 6 figuri)	82
Bogdan Petru. — Școala Normală Superioară din Iași	53
Bușilă Const. — Politehnica Gh. Asachi	181
Chelărescu Alex. — Rolul bogățiilor naturale în apărarea națională	86
Cosmovici L. N. — Profesorul Dr. N. Florescu (cu portret)	163
Florescu N. Al. — Orizonturile unei invenții (cu 14 figuri)	120
Gheorghiu V. C. — Profesorul G. G. Longinescu (cu portret)	35
" " Profesorul Nicolae Costăchescu (cu portret)	111
Gheorghiu I. — Observații și fapte experimentale asupra unei epizotii de cancer de cușcă la șoarecii albi (cu 5 figuri)	17
Incze Andrei. — Factorii climatici în cercetările de geografie și etiologie me- dicală (cu o hartă)	29
Incze Andrei. — Cauzele glaciației. Ipotezele mai noi	189
Ionescu Stan. — Fiziologia vegetală și însemnătatea ei	59
Lacrițeanu C. — Evoluția sau transformismul evolutiv al ființelor în starea de azi a cercetărilor biologice	23

<i>Mastacan G.</i> — Aplicația fenomenului de difracție al razelor X la studiul metalelor și al aliajelor (cu 5 figuri)	1
<i>Mastacan G.</i> — Fabricarea cărămidilor (cu 3 figuri)	114
<i>Olin Cristea.</i> — Cuvintare rostită în ziua de 14 Octomorie, în Aula Universității Mihailene, cu prilejul deschiderii cursurilor Școalei Politehnice „Gh. Asachi“	166
<i>Papp Const.</i> — Considerații asupra vegetației halotite a văei pîrîului Elan (cu o hartă și 2 figuri)	66
<i>Papp Const.</i> — Răspîndirea alkanninei în flora Romîniei	193
<i>Plăcînteanu Ion.</i> — Obiectul Mecanicii (lecție inaugurală)	184
<i>Popa I. Ilie.</i> — Profesorul Gheorghe Țițeica (cu portret)	34
<i>Pora A. Eug.</i> — Migrațiile peștilor euryhalini (Anadromi, cu 6 figuri)	71
„ „ Migrațiile peștilor euryhalini (Catadromi sau Thallasotoci, cu 7 figuri)	137
<i>Răvăruf M.</i> — Cîteva cuvinte despre fînețele și pășunile din munții Bistriței	131
<i>Toporescu Ernest.</i> — O noțiune nouă în chimie: Hr (cu două figuri)	175

Note și informații

<i>Antoniu-Murgoci A.</i> — Sistemul interrenal, supra-renal și corpusculii lui Starmins, în seria vertebratelor	104	<i>Florescu N. Al.</i> — Cîteva aniversări și comemorări în Fizică, în 1939	204
<i>Arventiev V.</i> — Un cimitir de păsări în apropiere de Jurilovca	154	<i>Florescu N. Al.</i> — Premiul Nobel pentru Fizică, în 1939	205
<i>Burduja Const.</i> — O nouă stațiune de <i>Lepidium crossifolium</i> în Moldova	197	<i>Gheorghiu Virgiliu.</i> — Folosirea vîntului pentru producerea energiei electrice	201
<i>Calinicenco N.</i> — Numărul locuitorilor din Rusia și Germania	205	<i>Huzum V. I.</i> — Nume de plante	163
<i>Calinicenco N.</i> — Cea mai mare adîncime în Oceanul Atlantic	205	<i>Iamandi Gr. și Teclu M.</i> — Date epidemiologice asupra unui focar de ankylostomiaza canina din stepa Bălților	38
<i>Chirilei Haralamb.</i> — Considerații fitosociologice și biologice asupra unei noi turbării din jud. Cîmpulung, Bucovina	103	<i>Ionescu Stan.</i> — Donația profesorului universitar Dr. ing. Otin Cristea	40
<i>Chirilei H.</i> — Modificări morfologice externe și modificări interne fizico-chimice și fiziologice la plantele unisexuate în timpul dezvoltării	195	<i>Martiniuc Const.</i> — Cîteva informații asupra numelui „Huțul“	153
<i>Cozubschi Elena.</i> — Aspecte principale ale evoluției Chimiei în veacul al XX-lea	49	<i>Motaș Const.</i> — Pericolul aero-chimic și protecția populației civile	36
<i>Cozubschi E.</i> — Centenarul nașterii lui Ernest Solvay	42	<i>Motaș Const.</i> — Organizarea muncii științifice în România	151
<i>Cozubschi E.</i> — Vîrsta hîrtiei poate fi determinată în mod precis	106	<i>Motaș Const.</i> — Al VI-lea centenar al Universității de Grenoble	202
<i>Cozubschi E.</i> — Centenarul descoperirii Chinonei de chimistul rus A. A. Waskresensky	106	<i>Obreja Alexandru.</i> — Limita de nord a „Masivului Bicului“	39
<i>Cobzusch E.</i> — Bicentenarul Academiei de Științe din Suedia	203	<i>Radu Gh. V.</i> — 100 ani dela întemeierea teoriei celulare a structurii organismelor	99
<i>Florescu N. Al.</i> — Conferințe	43	<i>Răvăruf Mihai.</i> — O lucrare botanică de mare valoare despre Cheia Turzii	202
„ Un chimist român uitat: Nicolae Teclu	154	<i>Redacția.</i> — Al II-lea congres internațional al Federațiunii Societăților Latine de Eugenică	43
„ Aniversarea unei izbînzii aviatice	156	<i>Ruscinschi Alex.</i> — Observații asupra ciufului de pădure în captivitate	197
„ Moldavium	199	<i>Teodoru Ion.</i> — Donații și recunoștință	105
		<i>Personalial</i>	44, 107, 157, 206

Dări de samă

	Pag.
<i>Grigore Antipa</i> : Hommage à son œuvre	107
<i>Agenda chimistului</i> : Editată de Car-tea Românească	159
<i>Maria Celan</i> : Sur les chondriosomes, les plastes et les noyaux, au cours de l'évolution du cystocarpe chez <i>Halopithys pinastroides</i>	48
<i>Maria Celan</i> : Nouvelles recherches préliminaires sur les synopses des algues rouges	49
<i>Dr. C. N. Cernescu</i> : Facteurs de climat et zones de sol en Roumanie	50
<i>Petru Dumitrașcu</i> : Manual de tur-nătorie	107
<i>Mihai D. David</i> : Omagiu profeso-rului S. Mehedinți la despărțirea sa de catedră	109
<i>Albert Einstein et Léopold Infeld</i> : L'évolution des idées en physique	208
<i>Armand de Gramont</i> : Problèmes de la vision	158
<i>Prof. G. Ionescu-Sisești</i> : Cultura griului	158
<i>C. Lacrițeanu</i> : Biologia generală	206
<i>P. Lecomte de Noüy</i> : L'homme de-vant la science	160
<i>N. T. Leontescu</i> : Biografiile oame-nilor iluștri	159
<i>N. Lupu</i> : Contribuțiuni la studiul fizic și antrogeografic a regiunii subcarpatice din Bucovina, cunos-cută în literatura geografică sub denumirea de „Bazinul Rădău-țului”	110
<i>H. Le Chatelier</i> : De la Méthode dans les Sciences expérimentales	158
<i>I. Gr. Mihăilescu</i> : Sur un cas de jaunissement rapide à l'obscurité chez les feuilles de <i>Polygonum cuspidatum</i>	209
<i>Dr. V. D. Mîrza</i> : Histophysiologie de l'ovogenèse	210
<i>Prof. Dr. V. Merușiu</i> : Harta etno-grafică a Romîniei, 1.000.000	108

	Pag.
<i>Lucia Manolescu - Pavelescu</i> : Les phénomènes de coloration des dérivés de la thio-2-aryl-3-hidroxy-tetrahydro-1.2.3.4-quinazoline	44
<i>G. Macovei</i> : Les gisements de pé-trole	45
<i>G. I. Nastase</i> : Itinerarii și popasuri basarabene	110
<i>Erasmus Iuliu Nyárády</i> : Enumera-rea plantelor vasculare din cheia Turzii	208
<i>Constantin Papp</i> : Caracterul florei împrejurimilor orașului Iași	47
<i>Const. Papp</i> : Contribution à la Bryo-géographie des environs des Jassy	48
<i>Const. Papp et Gh. Petcu</i> : Catalog de semințe oferite în schimb de Grădina Botanică a Univ. Mihăi-lene din Iași	48
<i>Aurelian A. Popescu</i> : Noui contri-buțiuni la fauna lepidopterelor din București și împrejurimi	46
<i>I. Rick</i> : Mișcarea aerului în Cîmpia Romîna	110
<i>L. Rodewold</i> : Systematische und ökologische Beiträge zur Tardigra-denfauna Rumäniens	209
<i>N. Sălăgeanu</i> : Contribution à la mé-thode de détermination de l'inten-sité de l'assimilation chlorophy-lienne et de la respiration des feuilles aériennes, à des courts intervalles de temps	209
<i>Ion Simionescu</i> : Fauna Romîniei	46
” ” Flora Romîniei	206
” ” Mamiferele Pliocene ” dela Cîmișlia (Romînia)	207
<i>Ion T. Tarnavski</i> : Karyologische Untersuchungen an Halophiten aus Rumänien im Lichte zytoökologi-scher Forschung	49
<i>E. C. Teodorescu</i> : Sur les mouve-ments d'agglomération et de dis-persion des zoospores d'algues	46



care, așa zișii absolvenți, pot să-și aranjeze situația lor pînă la 1941, luînd diploma dela Universitate, însă pe bază de examene de specialitate trecute la profesori, care totuși nu mai aparțin Universității.

Vezi, auzi și nu-ți vine să crezi, c'ar fi posibilă o astfel de anomalie și absurditate. Și totuși este. Așa cum se practică acum, nu folosește nimănui și mai puțin diplomaților respectivi, care sînt considerați ca îngăduiți și miluiți. Jignitoare situație.

* * *

Privitor la corpul didactic, Politehnica a primit o grea lovitură prin trecerea la cele veșnice a titularului de Chimie Anorganică : Profesorul *Nicolae Costăchescu*. În amintirea lui să păstrăm un minut de tăcere și reculegere. De felul cum se va face înlocuirea sa la Facultatea de Științe, va depinde ceiace vom avea de făcut și noi.

Deocamdată, în cursul acestei luni, sînt în mers lucrări pentru ocuparea a 3 catedre și anume : Catedra de Mașini Electrice și Stațiuni Centrale, Catedra de Radiotehnică și Catedra de Chimie Technologică Organică. Prin noii titulari — conferențiarii de astăzi — elemente strălucite și care au dat dovezi, atît de solida lor pregătire, cît și de dragostea și interesul ce-i poartă, Politehnica noastră, se va consolida și mai mult, ridicîndu-se apreciabil prestigiul învățămîntului nostru tehnic. În același timp moralul noilor și tinerilor elemente se va înălța, văzînd, că munca și pregătirea se recunoaște și se răsplătește.

În anul care vine, sperăm, să ocupăm și restul de catedre și conferințe vacante, pentru o parte din ele fiind chiar făcute formele respective, punînd la dispoziția Politehnicei elementele cele mai distinse și alese de care dispunem. Forțe noi și hotărîte se vor adăuga la cele actuale și cu puteri unite pregătirea viitorilor noștri ingineri va fi pe deplin asigurată.

* * *

Și anul acesta, ca și anul trecut, am făcut apel la diversele instituții industriale și bancare dintre cele mai proeminente pentru a ne ajuta și din surplusul lor, să ne înzestram și să împlinim multele și marile goluri, ce fatal sînt într'un așezămînt nou de cultură tehnică. Este știut, că în învățămîntul superior aplicat rolul cel mai mare îl au laboratoarele și atelierele. Ele sînt cele care cer fonduri mari, care sînt greu și chiar imposibil să fie satisfăcute cu subvențiile Ministerului, ori cît ar fi ele de impunătoare, necum în situația de azi cînd și cele mai bune intenții se izbesc de imposibilitatea realităților.

Spre marea noastră durere și amărăciune, constatăm și acum, așa cum din nenorocire am constatat-o și anul trecut, că marile noastre întreprinderi se țin departe și nu ajută de loc, sau într'o măsură revoltător de slabă.

Dar ceiace ne mîhnește și mai mult și ne umple sufletul de desnădejde este, că întreprinderi, care au în conducerea lor ingineri de marcă, ba chiar foști și actuali profesori din învățămîntul superior, cu venituri de zeci și sute de milioane, rămîn surde la apelurile noastre. Avantajele lor personale le-au împietrit sufletele, i-au înstrăinat cu totul și i-au făcut, să uite sărăcia în care se zbate desnădăjduit învățămîntul, acesta rămînînd bun numai să le fi făcut platformele atît de confortabile pe care stau. E trist, dar poate că odată și odată ne vom schimba mentalitatea de azi. În tot cazul, să ia sama cei ce sufăr acum și să se gîndească și să nu uite, cînd la rîndul lor vor fi prea ghiftuiți. Să se știe, că mai pe sus de bani este iubirea de aproape și omenia.

Pînă acum au răspuns la apelul nostru :

Banca Națională cu lei 47.500; Sindicatul Spirtului Industrial cu lei 30.000 și Reșița cu lei 20.000.

Spre mîndria Iaşului, cei care au înţeles mai bine nevoile noastre, au fost conducătorii Uzinei de Electricitate din Iaşi, care ne-au acordat frumoasa sumă de lei 100.000. Pentru ei şi Instituţie, avem speciale cuvinte de recunoştinţă.

D-l Rezident Regal, profesorul Traian Ionaşcu, a avut bună voinţă să ne acorde un premiu de încurajare de lei 3600 pentru lucrări ale studenţilor noştri. Îl rugăm, să primească cele mai calde mulţumiri şi sperăm, că şi pe viitor ne vom bucura de preţiosul ajutor al d-sale.

În plus am mai primit donaţii în materiale dela următoarele autorităţi şi instituţii :

Regiunea a II-a Aeriană, Serviciul Aeronautic, două motoare; Facultatea de Medicină din Iaşi, Uzina Electrică din Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Căminul şi Domeniile Reşiţa, Societatea A. E. G., Fabrica Ţesătura Socola Iaşi, Industria Sămel Turda, Inginer I. Solomon Iaşi.

Toate acestea se ridică la o valoare de peste un milion de lei.

Tuturor acestora le aducem aici cele mai vii mulţumiri şi îi asigurăm, că sumele vor fi întrebuinţate exclusiv numai şi numai pentru înzestrarea laboratoarelor, aşa cum se practică în străinătate. Acolo însă, înţelegerea din partea industriei particulare e nemărginită faţă de instituţiile culturale tehnice de specialitate, ceiace contribuie şi explică progresele extraordinare de umiditate şi de folositoare cu care se fălesc industria, învăţămîntul şi în ultima esenţă ţara, căreia aparţin. Noi am avea scuza şi putem invoca faptul, că sîntem prea tineri şi prea de curînd veniţi la masa civilizaţiei. Se poate. Să sperăm însă, că nu va întîrzia prea mult şi se va produce un reviriment şi la noi, şi devenind mai puţin egoişti şi mai mult înţelegători şi de nevoile celor mulţi, vom încerca cea mai mare bucurie şi fericire în a da din cîştigul muncii noastre pentru folosul obştesc, pentru instruirea celor mulţi. Numai astfel, se va stabili o strînsă legătură între oameni, care este baza şi podoaba unei adevărate civilizaţii. Altfel, totul nu e decît spoială şi făţarnicie.

În schimb constatăm, cu deosebită satisfacţie, că persoane particulare ne-au arătat dragostea lor. Aşa, d. G. J. Duqué mare industriaş şi om de suflet a binevoit, să ne doneze suma de lei 10.000. E primul şi singurul străin, care a înţeles, că o instituţie ca a noastră, trebuie să fie ajutată.

Influenţe binefăcătoare a obiceiului frumos şi folositor, practicat în largă măsură în străinătate, nu l-a părăsit, cu toate că trăeşte de mai multe decenii printre noi. Îl rugăm, să primească cele mai calde mulţumiri şi recunoştinţă.

Însă, ceiace ne încurajează mult şi ne dă mari speranţe în viitorul şcolii noastre şi în nobleţa absolvenţilor este gestul d-lui inginer George Morariu, un distins diplomat al fostelor Institute tehnice, actual Director general al Societăţii Italo-Romîna pentru valorificarea produselor petrolifere romîneşti, actual sediul la Roma. D-sa ne-a donat 10.500 lei pentru fondul de construcţie al Politehnicei. Gestul vorbeşte dela sine şi ne arată, că strălucitul nostru elect. lingă cîntea, ce ne face în străinătate, are mult suflet şi nu uită instituţia care i-a înlesnit temeinica pregătire tehnică, ce are. Onoare lui şi Slavă instituţiei care are astfel de elevi. D-lui inginer Morariu îi prezentăm toată graţitudinea noastră şi sperăm, că exemplul d-sale va servi şi altora. În special celor ce vor absolvi Politehnica noastră, nu le va fi permis să uite şi să treacă uşor peste ceiace au auzit astăzi.

O legătură sufletească cît mai durabilă şi strînsă, trebuie să se stabilească între foştii şi viitorii elevi.

* * *

Pentru înlesnirea şi ajutorarea studenţilor săraci şi meritoşi, Ministerul Educaţiei Naţionale ne-a pus la dispoziţie un număr de 70 de burse a lei 500

lunar pentru Facultatea de Chimie și Electrotehnică și de 90 burse pentru Facultatea de Științe Agricole. Spre marea noastră satisfacție am constatat, că elementele, care s'au bucurat de această favoare, au corespuns intențiilor, numărul celor ce au pierdut bursa fiind extrem de mic.

Pentru anul care începe, în afară de bursele menționate și de bursa acordată de Academia Română din fondul Adamachi, avem ocazia să comunicăm, că un fost bursier al aceluiaș fond Adamachi, care și-a făcut timp de 5 ani studiile în străinătate — la Politehnica Charlottenburg — a instituit la rîndul său la Academie un fond de 1 milion în rentă de Stat cu obligațiunea ca din venitul de lei 50.000 anual, să se institue 2 burse de câte lei 1500 lunar fiecare, pe întreg anul, una la Chimie și alta la Electrotehnică. Cum se vede, elementele sîrguitoare găsesc mijloace suficiente, ca să se poată pregăti temeinic pentru viață, devenind astfel folositoare lor și țării lor.

* * *

În ce privește înzestrarea Politehnicei noastre, am continuat cu avînt și succes opera începută și am reușit ca unele laboratoare, să fie puse pe picior de egalitate, dacă nu de superioritate, față cu similarele lor din țară și chiar din străinătate.

În plus, datorită sîrguinței și priceperii d-lui *Dr. Al. Cișman*, care deține deocamdată prin suplinire Catedra de Radiofonie, s'a instalat un post de radio-difuziune la Iași. Întreaga instalație a fost făcută cu mijloace proprii și a costat lei 80.000, față de 250.000 lei cît ar fi costat, dacă am fi cumpărat-o din străinătate.

Antena postului de tipul „Zeppelin” întinsă între doi piloni de 16 m. înălțime, așezați pe acoperișul Universității, a fost instalată de Uzina Electrică din Iași pe cheltuiala ei. D-lui inginer *Mircea Volanschi*, Directorul general al uzinei și Conferențiar la Politehnică îi aducem cu această ocazie cele mai calde mulțumiri. Postul emite pe lungimele de undă de 21 m. pentru străinătate și de 42 m. pentru țară, este controlat cu quartzuri piezoelectrice, ceiace asigură o perfectă stabilizare a frecvenței emise. Lămpile suportă la nevoe pînă la 300 Watt, iar deocamdată energia admisă este de 225 Watt. Modulația în fonie atinge, fără deformații, 92%, ceiace permite ca postul nostru, să fie considerat ca satisfăcînd ultimele perfecțiuni tehnice. Menționăm, că mîna de lucru a fost pusă la dispoziția noastră de atelierul de fizică de sub înțeleapta conducere a d-lui profesor *Procopiu*, iar fondurile au fost acordate de Politehnică.

Postul este în funcțiune și datorită lui sîntem puși în plăcuta și fericita situație, ca să difuzăm solemnitatea de azi a începerii anului școlar 1939—1940, dată ce este în acelaș timp și inaugurarea oficială a stațiunii noastre.

* * *

Dacă s'au făcut și se fac toate eforturile, ca Politehnica noastră să fie la înălțimea unei instituții de o importanță așa de mare, dîndu-și toate silințele, ca să pregătească cît mai solid și mai temeinic elementele sîrguitoare ce-i sînt încredințate, este că ea urmărește stăruitor și cu perseverență, să corespundă rolului frumos și mare, pe care este chemată să-l joace cu toată demnitatea și prestigiul cerut.

Dar, în afară de corpul didactic, format din elemente de mîna întâi, conștient de ceiace are de făcut și de ceiace i se cere, Politehnica trebuie, să se bazeze și pe tineretul, ce va avea să se instruiască. Nu este de ajuns, ca să se dispună numai de un mănunchi de profesori, geloși de meseria lor, spre a se obține rezultate înfloritoare, oricare ar fi direcția și metoda cu care s'ar lucra.

Nu. Trebuie mult suflet, multă înțelegere, multă dragoste și o nemărginită și strinsă legătură sufletească între profesor și elev. Să fie o conlucrare continuă între cel ce dă și între cel ce primește. Profesorul să fie nerăbdător și dornic în a i se prezenta cât mai grabnic și des ocazia, să apară înaintea studenților săi, iar elevul să aștepte înfrigurat clipa, când va trebui, să asculte învățătura și spusele profesorului. Aceasta nu se capătă decât printr'o încredere reciprocă și printr'o comunitate de idei și sentimente. Studentul trebuie să fie convins, că profesorii săi nu urmăresc altceva, decât să-i înăbușească cunoștințele, dându-i totul și cu drag din ceiace ei înșiși au adunat, cu privire la specialitate și la ceiace poate și trebuie să-i folosească în carieră și în viață. Intre ei să fie raporturi strinse de prietenie, însoțite și din o parte și din cealaltă de respectul, ce trebuie să-și datoreze reciproc. Să se cultive în cel mai înalt grad simțul de demnitate personală și să nu se admită nimic, care ar putea să slăbească încrederea în sine.

În special tineretul nostru trebuie să-și dea sama, că numai prin munca lui poate și trebuie să însemne ceva.

Să i se dezvolte într'o mai mare măsură dorința și gustul de muncă, singura care înalță pe om și îi dă posibilitatea în a spera și a-și valorifica toate resursele fizice și morale de care dispune. Cu modul acesta, tinărul de mîne eșit de pe băncile Politehnicei noastre, va fi bine înarmat și va privi cu încredere viitorul, fiind convins că va ajunge la culmi înalte spre satisfacția lui, a profesorilor lui și a școlii, care l-a produs.

Va fi o recompensă bine meritată, pentru valorificarea capitalului intelectual adunat cu atîta rîvnă și îngrijire. Orice tinăr trebuie să știe și să fie pătruns, că atîta timp cât este student, nu are și nu trebuie să facă nimic altceva decât să învețe, să asculte, să se pregătească, asimilînd cât mai multe cunoștințe și îmbogățindu-și sufletul cu cât mai înalte și frumoase calități. El trebuie, să fie surd la ceiace nu este școală, fără a deveni unilateral. Să citească, să asimileze, să-și facă o frumoasă cultură generală și să-și mărească cât mai mult și varieat bagajul de cunoștințe folositoare, ce-i vor servi în viitor, în carieră, în viață. Dar, ceiace nu este permis să uite studentul nostru, este, că el trebuie să fie total străin de preocupările politice, ținîndu-se cât mai la distanță de ele. Să nu se lase sedus de glasul de sirenă amăgitoare și înșelătoare cu care își ademenește prozeliții politicianul, fără conștiință și fără scrupul.

Tinărul fără experiență intrat în mrejele politicianismului, chiar cînd nu-i venal și veros, își pervertește, în cazul cel mai bun, adevărata lui chemare, devenind un element frivol, cu dorinți multe, ușoare și fără nici o bază serioasă. Devine un pretențios fără nici o îndreptățire. Pierde simțul realității. Ba chiar poate, să se nenorocească complect și iremedial. Să fie pentru el și pentru ai lui un izvor de suferinți. Să încerce un dezastru.

De altfel nu e mult de cînd, din păcate, se găseau chiar profesori, care chemau și îndemnau la politică pe studenții lor, luîndu-i în mod criminal dela adevărata lor menire. Să lăsăm acest trecut cu păcatele lui, să fie numai un vis urît și să fim mulțumiți, că un nou drum se întrezărește, avînd ca lozincă: „Studentul la carte“. Cu toții să luptăm în această direcție, înlesnind tinărului nostru student drumul, să se pregătească temeinic pentru a putea servi de exemplu și altora, cînd fatal va fi chemat, să formeze pătura conducătoare de mîne. Trebuie știut, că viitorii conducători și îndrumători cu răspundere vor fi cu atît mai ascultați și mai valoroși, cu cît ei înșiși vor avea o meserie, vor fi muncit real, vor avea dragoste de bun, drept și frumos, vor fi elemente productive, firi creatoare. Munca, dublată de înțelepciune și înțelegere, desăvir-

șește pe cel chemat, să călăuzească pașii celor mulți, căpătîndu-le dragostea, ascultarea și supunerea.

Pentru asta se cer sacrificii, care însă, oricît ar fi ele de multe și mari, sînt cu mult prea mici față de foloasele aduse.

În plus tineretul nostru trebuie, să fie pătruns de respectul, ce datorează muncii și meritelor altora și să considere, ca un privilegiu măreț și divin, mînia și chemarea lui de a contribui la ușurarea vieții celor mulți, la înobilarea sufletului omenesc și la fericirea, siguranța și liniștea concetățenilor și semenilor săi. Să urmărească progres prin creații folositoare și nobile. Să fie un element de pace și un exemplu de bună stare și înțelegere între oameni. Să se identifice cu glia romînească plămădită cu sîngele sfînt al strămoșilor lui și să-și iubească cu pasiune Neamul, Țara și Coroana.

Să contribuie din răspuțeri la formarea unei civilizații creatoare, nu în înțelesul nenorocit de a da cît mai multe și rafinate mijloace de distrugere. Să fie un deschizător de drumuri, un purtător de cuvînt. Așa dorim noi, viitorilor noștri diplomați, actualilor noștri copii sufletești.

Declar cursurilor deschise.

Spor la muncă, sănătate și pace.

O noțiune nouă în chimie : rH

de

ERNEST TOPORESCU

Știința și în special fizico-chimia ne pune la îndemîină noțiuni și metode noi cu care putem studia fenomene ce pînă mai ieri erau greu de interpretat. Astfel noțiunea de pH ne dă posibilitatea de a determina aciditatea sau alcalinitatea unei soluții mult superioară așteptărilor noastre, căci, dacă altădată punerea în evidență a unei acidități, ca de exemplu a unei soluții normale pe o mie de acid clorhidric era o problemă nu tocmai ușor de rezolvat, astăzi, cu ajutorul noțiunii și metodelor pentru determinarea lui pH, putem determina acidități de ordinul normal pe un milion. Deaceia noțiunea de pH a luat o mare extindere, atît în cercetările științifice, cît și în determinările industriale. În fenomenele biologice, astăzi, noțiunea de pH e curent întrebuințată, pentru că s'a constatat că pentru variații foarte mici a mediului în pH avem variații enorme de mari în fenomenele biologice.

O altă noțiune nouă, care începe să fie mult cercetată și pentru care se întrevăde o mare aplicație practică, este noțiunea de rH.

Dela început vom aminti că între noțiunile de rH și pH este o așa de strînsă legătură încît cred că această nouă noțiune de rH nu va fi bine înțeleasă dacă am expune o paralelă cu noțiunea pH.

Se știe că noțiunea de pH are ca punct de plecare disocierea apei. Într'adevăr s'a admis că apa este disociată și că între ionii formați și moleculele de apă nedisociate, pentru o temperatură dată, avem un echilibru exprimat prin relația :



dela care, conform legii masei, avem raportul :

$$\frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} = C$$

C fiind constanta de disociere a apei pentru temperatura dată. Ionii în această relație sînt reprezentați prin paranteze ce au semnul $+$ sau $-$ (particule materiale încărcate cu electricitate).

Pornind dela raportul de mai sus s'a determinat numărul de ioni de hidrogen ce iau naștere în această disociere în modul următor: Numărul de molecule de apă disociate în ioni de hidrogen și oxidrili e o cantitate foarte mică față de numărul enorm de mare de molecule de apă nedisociate și deci putem pune, în relația de mai sus, numărul de molecule nedisociate egal cu o constantă, adică :

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = K$$

sau :

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K}$$

din cauză că ionii pe care ni-i dau apa prin disociere sînt în număr egal cu doi de fiecare moleculă.

Determinările lui K au dus, în urma numeroaselor determinări, la valori pentru temperatura 18° $K = 0,7 \times 10^{-14}$

” ” ” 20° $K = 1,012 \times 10^{-14}$

de unde rezultă că numărul de ioni de hidrogen este egal cu :

$$[\text{H}^+] = 10^{-7}$$

Sörensen exprimă numărul de ioni din această relație sub forma $\text{pH} = 7$, concentrarea în ioni de hidrogen fiind reprezentată prin puterea negativă a lui 10.

Clark, un savant american, plecînd tot dela raționamentul de mai sus, introduce noțiunea de rH în modul următor: Să presupunem că ioni de hidrogen, care formează din disocierea apei, se găsesc în echilibru cu atomi de hidrogen, atomi pe care îi putem reprezenta prin presiunea pe care o exercită în acest echilibru. Această presiune a fost determinată pentru apa la temperatura de 18° găsindu-se valoarea: presiunea atomilor de $\text{H} = 10^{-41}$ atmosfere, adică numărul ionilor de hidrogen 10^{-7} îi corespunde o presiune de hidrogeni atomici 10^{-41} atm., o presiune enorm de mică.

Clark exprimă această presiune sub forma de $\text{rH} = 41$, adică prin puterea negativă a lui 10.

De aici se vede legătura strînsă ce există între pH și rH .

Analogia între aceste două noțiuni merge și mai departe cîci, după cum orice substanță ce reprezintă un pH mai mic decît valoarea 7 ne spune că avem o soluție acidă, tot așa și noțiunea de rH ne arată că pentru valori mici ce în ce mai mici de 41, pentru rH , avem presiuni în atomi de hidrogen din ce în ce mai mari, hidrogeni ce au putința de a reduce, avem substanțe reductoare.

Invers, cu cît valoarea lui pH este mai mare decît 7 avem substanțe cu caracter opus acizilor, adică substanțelor alcaline, același lucru și în cazul rH , pentru valori mai mari de 41 avem substanțele opuse celor reductoare, avem substanțele oxidante.

Din această comparație deducem că noțiunea rH ne arată gradul de reducere sau de oxidare a unei substanțe sau amestec de corpuri. Din această cauză rH se mai cunoaște sub numele de fenomen de oxi-reducție.

Înainte de a arăta importanța deosebită ce o are noțiunea rH în studiile fizico-chimice, biologice și industriale, să arătăm care sînt caracteristicile și proprietatea de a fi reductoare sau oxidante și cum determinăm pH .


Am văzut că punctul de plecare în determinarea noțiunii de rH este deosebit de importantă vom căuta să amintim de corpurile care numai sub formă de ioni de hidrogen dau fenomenele de reducere sau de oxidare; de altfel am văzut că

mene nu sînt decît rezultatul unei reacții chimice în care apa are rolul principal, de exemplu sulfitul de sodiu în apă trece în sulfat :



dacă, hidrogenii ce se pun în libertate, găsesc o substanță cu care să se combine. Sulfitul de sodiu este o substanță reducătoare.


Acidul arsenios, acidul fosforos sînt deasemenea substanțe reducătoare, căci :





hidrogenii pot reacționa cu diferite substanțe.

Clorura stanoasă, o soluție de anhidridă sulfuroasă în apă, glucoza, hidrocchinona și multe alte substanțe organice ce se oxidează pe contul moleculei de apă sînt substanțe reducătoare.

Tot ca un fenomen de reducere este și trecerea ionilor de diferite metale dela o valență inferioară la una superioară, de exemplu trecerea ionului feros din clorura feroasă în ionul feric, căci și în cazul acesta avem formare de atomi de hidrogen :




Substanțele oxidante sînt corpurile cu caractere chimice opuse celor amintite mai sus. Astfel clorul, bromul, permanganatul de potasiu, puse în contact cu apa ne dau oxigen atomic :



avem soluțiile cele mai active, sînt oxidante.

Trecerea ionilor de diferite metale dela o valență superioară la una inferioară are loc deasemenea cu degajare de oxigen atomic, în mediul apos ; de exemplu, o soluție de fericianură de potasiu o întrebuințăm adesea ca o soluție oxidantă :



Sînt multe substanțe ce ne dau oxigen atomic cînd mediul este acid sau alcalin, de exemplu : bicromații, permanganatii, cerații, etc.

Din punct de vedere electrochimic, o reacție de reducere se face cu adădire de electricitate pozitivă și invers pentru reacțiile de oxidare, sau, exprimînd acest lucru în mod științific, reducerea se face cu pierdere de electroni iar oxidarea cu fixare de electroni.

Pentru determinarea lui rH ne servim de o relație, pe care o deducem în modul următor : fie de exemplu, reducerea clorurei ferice în clorură feroasă cu ajutorul atomilor de hidrogen :



Pentru o temperatură dată și un timp determinat, putem spune că între cele patru substanțe avem un echilibru, pe care îl putem exprima între ioni feroși și ionii de hidrogen, avem relația dată de legea masselor :

$$(1) \quad \frac{[\text{Fe}^{+++}] \cdot [\text{H}]}{[\text{Fe}^{++}] \cdot [\text{H}^+] } = K$$

Trecerea ionilor ferici, din clorura ferică, în ioni feroși, clorura feroasă, se face cu producerea unui lucru mecanic pe cale izotermică egal cu :

$$A = RT \text{ Log } \frac{[\text{Fe}^{++}]}{[\text{Fe}^{+++}]}$$

și cărui lucru mecanic îi corespunde o forță electromotrice :

$$n f e = A = RT \operatorname{Log} \frac{[\text{Fe}^{++}]}{[\text{Fe}^{+++}]}$$

sau

$$e = \frac{RT}{nf} \operatorname{Log} \frac{[\text{Fe}^{++}]}{[\text{Fe}^{+++}]}$$

Raportul între ionii feroși-ferici din această formulă îl putem înlocui prin :

$$\frac{[\text{Fe}^{++}]}{[\text{Fe}^{+++}]} = \frac{1}{K} \frac{[\text{H}]}{[\text{H}^+]}$$

scoasă din formula (1), așa că forța electromotrice se poate scrie :


$$e = \frac{RT}{nf} \operatorname{Log} \frac{1}{K} + \frac{RT}{nf} \operatorname{Log} \frac{[\text{H}]}{[\text{H}^+]}$$

sau

$$e = \Sigma + \frac{RT}{nf} \operatorname{Log} \frac{[\text{H}]}{[\text{H}^+]}$$

Σ fiind o constantă.

Atomii de hidrogen, din această ultimă relație pot fi înlocuiți prin presiunea corespunzătoare dedusă din relația :



care ne arată că între doi ioni de hidrogen, doi electroni și o moleculă de hidrogen avem un echilibru, sau

$$2\text{H} \rightleftharpoons \text{H}_2 \text{ de unde } [\text{H}]^2 = K P_{\text{H}}, \quad [\text{H}] = \sqrt{K P_{\text{H}}}$$

în care K este o constantă de acțiune a masselor.

Formula de mai sus devine :

$$e = \Sigma + \frac{RT}{nf} \operatorname{Log} \frac{\sqrt{P_{\text{H}}}}{[\text{H}^+]}$$

sau

$$e = \Sigma' + \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{nf} \operatorname{Log} \frac{\sqrt{P_{\text{H}}}}{[\text{H}^+]}$$

trecând dela logaritmul natural la cel zecimal.

Aceasta-i forța electromotrice pe care ne-o dă trecerea ionilor ferici în feroși. Pentru ca să determinăm această f. e. m. trebuie s'o măsurăm. Ori, această determinare o facem prin comparație cu un electrod luat ca unitate de măsură, care în cazul acesta este electrodul cu hidrogen. Deaceia la f. e. m. de mai sus adunăm f. e. m. a electrodului de comparație :

$$e' = \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{f} \operatorname{Log} \frac{\sqrt{P'_{\text{H}}}}{[\text{H}^+]}$$

în care P'_{H} este presiunea hidrogenului în echilibru cu ioni de hidrogen :

$$e_{\text{H}} = \Sigma' + \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{f} \lg \frac{P_{\text{H}}}{[\text{H}^+]} = \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{nf} \lg \frac{\sqrt{P_{\text{H}}}}{[\text{H}^+]}$$

Dacă în expresia f. e. m. a electrodului cu hidrogen facem $P'_{\text{H}} = [\text{H}^+] = 1$ înseamnă că electrodul este luat ca unitate de comparație, avem electrodul normal. Ecuația de mai sus se poate scrie :

$$e_{\text{H}} = \Sigma' + \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{f} \lg \frac{1}{\sqrt{P_{\text{H}}}} + \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{nf} \log \frac{1}{[\text{H}^+]}$$

ori, cologaritmul ionilor de hidrogen după Sørensen

$$\log \frac{1}{[\text{H}^+]} = \text{pH}$$

iar cologarithmul presiunii de hidrogen după Clark

$$\log \frac{1}{P_H} = rH$$


încît expresia de mai sus devine

$$eH = \Sigma' + \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{f} rH + \frac{1}{0,4343} \frac{RT}{nf} pH$$

În această relație f are valoarea 96540 iar n este numărul de electroni ce a variat în fenomenul de oxi-reducere. În cazul nostru $n = 1$.

Din formula aceasta scoatem valoarea lui rH care, este ușor de văzut că este o funcție de $rH = f(pH, eH)$.

Studiindu-se această relație s'a constatat că pentru cazul cînd pH este constant, rH variază cu eH soluției, de exemplu, la o soluție în care avem ioni feroși și ferici, ce pot fi reprezentați prin echilibru



și în care proporția de ioni feroși e $a\%$ iar cei ferici $(100-a)\%$, îi corespunde




Fig. 1.




Fig. 2.

o forță electromotrice eH . Dacă proporția între ioni feroși-ferici e alta, pentru același pH vom avea o altă valoare drept forță electromotrice și așa mai departe. Valorile lui rH calculate pot fi puse într-o diagramă prin raport cu concentrările ionilor reductori și oxidanți (fig. 1). Aceiași ioni fiind în echilibru pentru o altă valoare dată lui pH , vom obține o curbă identică ca în cazul întâi paralelă cu prima.

Toate curbele prezintă un punct de inflexiune cînd raportul de ioni reductori-oxidanți este de 50%.

Tot pe baza relației de mai sus s'a studiat variația lui rH în funcție de pH ajungîndu-se la rezultatul că această variație este liniară iar dreptele paralele între ele. Dreapta ce trece prin coordonatele $pH=7$ și $rH=41$ desparte diagrama în două, astfel: dreptele ce se găsesc sub această limită corespund substanțelor reductoare, iar cele superioare corpurilor oxidante (fig. 2). După cum am văzut, din cele expuse, pentru calcularea lui rH avem nevoie de pH soluției și de eH .

Determinarea pH -lui soluției și a forței electromotrice eH se fac pe cale

potențiometrică, pentru pH prin metodele cunoscute și asupra cărora nu insistăm, iar pentru eH se face ca și în cazul lui pH numai că se ține seama de următoarea regulă :

1. Se ia drept electrod un metal inatacabil de către soluție.
2. Metalul ce se ia drept electrod să nu aibă gaze absorbite (oxigen sau hidrogen), căci va trebui ca, acest electrod să servească la determinarea f. e. m. a atomilor de hidrogen ce se găsesc în echilibru cu ionii din soluție.
3. Determinările se fac în afară de contactul aerului într'un gaz inert, azot perfect curat.

Drept electrozi se iau platina lucioasă sau aurul.

Dispozitivul cu care determinăm f. e. m., eH, constă dintr'un vas de sticlă 100—250 cm³, pus într'un termostat, prevăzut cu un dop de cauciuc prin care trece un termometru, un tub de sticlă prin care aducem azotul perfect curat și care barbotează prin soluția de studiat, un tub pentru eșirea azotului prevăzut cu o supapă, doi sau trei electrozi de platină lucioasă, un dispozitiv prin care introducem soluția de studiat sau diferiți reactivi, în fine, un tub cu agar-agar cu clorură de potasiu ce joacă rolul de punte între soluția de studiat și electrodul de referință, calomel soluție saturată de clorură de potasiu.

Se pun doi sau trei electrozi în celula în care avem soluția de studiat pentru a controla dacă echilibrul oxi-reducere s'a făcut în toată masa de soluție căci în cazul acesta toți electrozii trebuie să dea aceeași forță electromotrice.

$$eH = A - \frac{B}{2} rH + B pH$$

A și B sînt niște constante și le găsim în tabele. Valorile acestor constante depind de natura electrozilor cu care determinăm pe eH și de temperatura la care se face determinarea.

Nu insistăm mai mult asupra metodei de lucru și încheem această expunere amintind de aplicațiile acestei noțiuni rH.

Din punct de vedere fizico-chimic determinarea lui rH ne dă posibilitatea de a studia echilibrul ce se stabilește între ionii aceluiaș element cînd elementul are valențe variabile; de exemplu: echilibrul între ionii feroși-ferici; manganosi-manganici; taloși-talici; ceroși-cerici; cobaltoși-cobaltici; ștanoși-stanici, etc.

Reacțiile organice de oxidări și reduceri se pot urmări în cele mai mici detalii cu ajutorul noțiunii de rH.

Știința care profită cel mai mult de pe urma acestor determinări este biologia, fiziologia animală, bacteriologia. E deajuns să amintesc că, în general toate fenomenele vitale sînt întovărășite de reacțiuni de reduceri și oxidări, pentruca să se înțeleagă toată importanța determinărilor de rH.

Din studiile teoretice rH a trecut în aplicațiile practice. Astfel: industria berei, a vinului, a alcoolului, a laptelui, fabricarea pâinei, industria textilă, a hîrtiei, a pielei, industria fotografică, corosiunea metalelor, agricultura, etc. încep a se servi de noua noțiune rH pentruca metodele empirice din aceste industrii să cedeze locul celor științifice.

Politehnica Gh. Asachi ¹⁾

de

CONSTANTIN D. BUȘILĂ

Președintele Consiliului de perfecționare a «Politehnicei Gh. Asachi»

Înainte de a începe expunerea ce am intenția a o prezenta în fața Dvs., am o pioasă îndatorire a mă asocia la cuvintele pe care d. Rector al Politehnicei le-a spus în memoria distinsului profesor dr. N. Costăchescu, și împreună cu Dvs. să-i regret pierderea pe care Universitatea Mihăileană și Politehnica „Gh. Asachi” au suferit.

Am cunoscut de multă vreme pe N. Costăchescu, de pe vremea când era asistent al ilustrului său profesor P. Poni. Și am avut ocazia a regăsi pe N. Costăchescu și a face apel la cunoștințele sale, în timpul pregătirii războiului când, la „Direcția Generală a Munițiilor”, am avut nevoie de consultările și sfaturile sale pentru nevoile războiului.

Am apreciat în N. Costăchescu pe un distins savant în domeniul Chimiei, un mare profesor care a format numeroși chimiști și ingineri în această Universitate din Iași; dar am admirat pe marele român care, în toate ocaziile a căutat a-și pune priceperea, cunoștințele și puterea de muncă în serviciul țării și poporului român. Ca om de știință în laborator pentru a face studii și cercetări, ca profesor la catedră pentru a îndruma pe elevii săi, ca bun român în activitatea publică a țării, N. Costăchescu este o figură a cărei amintire va rămâne vie pentru toți acei ce l-au cunoscut, l-au admirat și l-au iubit.

*Domnule Rector,
Iubiți colegi,*

Ca întotdeauna vin cu emoție la Iași, în orașul amintirilor unei tinereți trecute pe băncile școlii și a speranțelor ce am nutrit cu toții în timpurile grele ale aspirațiilor naționale ce ni s'au realizat. Și mă simt foarte fericit a mă găsi azi, din nou, în mijlocul colegilor, profesori și conferențieri ai Politehnicei „Gh. Asachi”.

Este o foarte mare onoare pentru mine de a fi desemnat, pentru a treia oară ca Președinte al Consiliului de perfecționare a Politehnicei Dvs.; vă mulțumesc foarte călduros și țin a vă asigura de tot interesul ce port acestei tinere Politehnice, exprimându-mi speranța de a putea lucra, împreună cu Dvs., pentru buna așezare și îndrumare a acestei instituții de învățământ superior pentru a forma cât mai bine pe inginerii necesari evoluției noastre economice și trebuințelor apărării naționale.

* * *

Rolul Politehnicilor este foarte mare și importanța lor este în o continuă creștere în raport cu progresele științei și tehnicii, și cu nevoile de tot felul de vieții active care trebuie să ne asigure viitorul țării și propășirea neamului românesc. În toate ramurile de activitate tehnică are tot mai mare rol, și ingi-

1) Expunere făcută în ședința dela 11 Sept. 1959 a Consiliului profesoral unit cu Consiliul de perfecționare a „Politehnicei Gh. Asachi” din Iași.

nerii de diferitele specialități sînt chemați a lucra pentru progresul economic în timp de pace și pentru pregătirea și conducerea unui eventual război, pe care nu-l dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiți în interesul apărării noastre naționale.

Formația inginerilor se face în Politehnici și această formație are un caracter tehnic de aplicații; dar buna formație a inginerului trebuie să se bazeze pe o solidă pregătire științifică. Numai un elev care a obținut cultura generală a învățămîntului secundar complet, cu bune cunoștințe în domeniile științifice ce va avea de aplicat și cu o bună formație tehnică, teoretică și practică, va putea deveni un bun inginer folositor în activitatea ce va avea să desfășoare în cariera sa. Politehnicele, ca și Universitățile, trebuie să creeze elemente de elită de care țara are nevoie pentru a se îndruma pe calea progresului.

Avem în țară trei Politehnice; este nevoie a se urmări ca fiecărei din acestea să i se dea organizarea compatibilă cu rolul ce are de îndeplinit, să i se pună la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a-și putea atinge scopul ce urmărește, pentru a forma ingineri bine pregătiți. Poate sînt în dezacord cu unii dintre colegii mei, dar am convingerea că aceste trei politehnice nu sînt prea multe pentru nevoile țării noastre, căci viața noastră economică, în evoluția normală către care trebuie a se îndrepta, necesită un mare număr de ingineri în diferitele ramuri de specialitate, dar necesită ingineri bine formați ca pregătire științifică și tehnică, teoretică și practică, cu deprinderea și disciplina necesară pentru a-și exercita profesiunea și formați în atmosfera morală a iubirii de țară și neam și de îndeplinirea corectă a îndatoririlor către Societate.

Fiecare Politehnică trebuie a-și îndeplini rolul ei, pentru specialitățile ce formează cadrul de formație inginerescă; fiecare Politehnică trebuie să devie o instituție de înaltă cultură științifică și tehnică, de a selecționa și forma elementele care să poată duce lupta vieții, să activeze efectiv și să-și urmeze drumul normal pe baza meritelor și a muncii ordonate. Nu trebuie să mai considerăm școlile superioare, și mai ales Politehnicele, ca instituții de unde să iasă funcționari publici care urmează calea ascensiunii erarhice prin o activitate onorabilă, dar care nu totdeauna este de natură a pune în evidență meritele elementelor cele mai bune.

* * *

S'au împlinit doi ani de cînd a luat ființă „Politehnica Gh. Asachi” ca o instituție de cultură superioară independentă de „Universitatea Mihăileană”, dar prin gruparea a două Institute tehnice și a unei Facultăți care făceau parte și se dezvoltaseră în cadrul acestei Universități. Credem că nu a luat ființă prea curînd această Politehnică care poartă numele marelui *Gh. Asachi*, care, în 1835, a organizat primele cursuri de inginerie pe lângă Academia Mihăileană, de pe acele vremuri, și a înființat Școala de inginerie civilă, precedînd cu cîțiva ani începuturile unui învățămînt ingineresc în Țara romînească.

Trecînd însă peste aceste începuturi modeste, putem considera ca întemeietor al adevăratului învățămînt ingineresc, pe acel care a pus bazele unei politici a învățămîntului tehnic superior, pe marele patriot moldovean, fost profesor al Academiei Mihăilene, pe *M. Kogălniceanu*. Căci acesta, ca ministru sub Vodă Cuza, în 1864, a creat „Școala de punți, șosele, mine și arhitectură”, un fel de Școală Politehnică pe acele vremuri.

Prin gruparea în „Politehnica Gh. Asachi” a trei specialități tehnice care se găseau în Universitate, această instituție are tradiția și dispune de pregătirea științifică pentru a se putea mai ușor adapta la organizarea necesară pentru

buna formare a inginerilor în ramurile de specializare ale facultăților de care dispune. Trebuie urmărită organizarea și complectarea Politehnicei în vederea scopului urmărit, complectându-și programele, personalul didactic, instalațiile și materialul de învățămînt. Sub conducerea eminentului Rector pe care „Politehnica Gh. Asachi” și l-a ales în persoana d-lui Prof. C. Otin, cu concursul distinșilor profesori și conferențieri care au adus contribuția lor științifică, în decurs de mulți ani, în fostele Institute tehnice universitare și acum, în urmă, în Politehnica de azi; și prin chemarea elementelor tinere ce vor trebui să complecteze personalul didactic în viitor, am credința că „Politehnica Gh. Asachi” va putea deveni un important centru de formare a inginerilor bine pregătiți pentru activitatea viitoare, în folosul ridicării și consolidării țării. Iășul, acest oraș al vechei culturi românești, nu se va dezice nici azi și va putea deveni un centru propice și pentru cultura inginerescă.

Actualele Facultăți ale Politehnicei vor trebui complectate mai înainte de a se lua în considerare crearea de noi facultăți, și, fără a avea intenția de a expune un program de complectări, îmi exprim părerea că ar fi o necesitate a se urmări transformarea Facultății de Electrotehnică în o Facultate de *Electromecanică*. Căci între mecanică și electricitate este o strînsă legătură în domeniile de aplicații, și un inginer cu o formație mecanică și electrică ca bază a specializării, se poate foarte bine specializa în anumite domenii mai restrînse ale fiecărei din cele două ramuri. Organizarea acestei facultăți trebuie așa făcută pentruca cultura științifică și tehnică, comună tuturor elevilor, să fie complectată prin cursuri și lucrări de aplicații în anumite specialități, formîndu-se în acest scop secții de specializare. Inginerii absolvenți ai unei astfel de facultăți ar fi electromecanici, mențione ce se va trece pe diplomă; iar pentru specializare se vor elibera certificate de complectare a diplomei.

Nu voiesc a vorbi, cu această ocazie de crearea altor facultăți la „Politehnica Gh. Asachi”; asemenea chestiuni vor trebui abordate și rezolvate în conformitate cu necesitățile economice ale evoluției țării, cu caracterul regiunii și cu mijloacele intelectuale și materiale pe care s’ar putea conta, pentru a se putea obține o bună organizare care să poată fi de folos.

* * *

Inginerul, ca om de cultură superioară, trebuie să-și sprijine pregătirea profesională pe baze științifice; pe aceste baze științifice, ca și pe formarea tehnică, teoretică și practică, el își va îndruma studiile sale și-și va forma concepțiile sale tehnice; căci azi empirismul nu mai poate servi pentru o activitate rațională și cu folos îndeplinită.

Formarea inginerului necesită însă un mare număr de cunoștințe de specialități teoretice și de aplicații practice. Cursurile trebuiesc astfel făcute pentru ca, în fiecare specialitate să se dea elevului bune cunoștințe fundamentale și mijloacele de a fi îndrumat în studii și cercetări aprofundate, de care va avea nevoie pentru rezolvarea problemelor tehnice, ce i se vor prezenta în practica profesiei. Deaceia nu trebuie a se intra în multe detalii și particularități care încarcă bagajul intelectual al elevului fără a-i fi de un real folos în profesia sa. De altminteri datorită progreselor repezi ce zilnic se realizează în diferitele ramuri de specialitate și numeroaselor lucrări ce se produc, nu mai este posibil ca la un anumit curs de specializare, să se poată da elevului tot ce se cunoaște în acel domeniu și a se insista asupra tuturor detaliilor.

Alături de învățămîntul de pe catedră, viitorii ingineri trebuiesc bine formați prin o intensă activitate practică de aplicații a cunoștințelor date la cursuri. Această activitate de aplicații trebuie să se facă în seminarii, laboratorii, ateliere,

săli de desen și de proiecte și prin vizite tehnice și stagii de lucru efectiv în fabrici, ateliere și pe șantiere, așa cum viitorii ingineri vor avea de îndeplinit în profesiunea lor.

Dar cu cea mai bună organizare, cu cele mai raționale programe, cu cel mai bun personal didactic și cu cât mai complete și moderne instalații de învățămînt, o Politehnică va da rezultate bune numai dacă va folosi materia primă de bună calitate. Este nevoie de o serioasă selecție la admiterea în Politehnică, spre a fi primite cele mai bune elemente formate într'un învățămînt secundar ce este pe cale a fi reorganizat și pus în acord cu nevoile de formare a elitelor intelectuale. Și mai este nevoie de un regim școlar corespunzînd seriozității de pregătire inginerească, bazat pe ordine și disciplină.

* * *

Imi exprim credința că tînăra „Politehnică Gh. Asachi“, condusă de devotatul și entuziastul ei Rector, și cu concursul unui corp didactic care se va completa cu bune elemente tinere, va realiza aci, în Iași, o instituție de bună formare a inginerilor de care țara are nevoie pentru propășirea ei economică în timp de pace și pentru apărarea frontierelor în cazul unui război.

Terminînd, fac cele mai bune urări de bună așezare și propășire a „Politehnicei Gh. Asachi“ și-i doresc să dea promoții de ingineri a căror activitate să constituie o mîndrie pentru Școala ce i-a format.



Obiectul Mecanicii

Lecție introductivă

de

Dr. I. PLĂCINȚEANU

Profesor la Universitatea din Iași



Știința are ca scop să studieze și să formuleze legi pentru fenomenele naturii. Prima sarcină a științei este să deosebească și să grupeze fenomenele naturii în categorii; în felul acesta disciplinele științifice care au luat naștere din spiritul cercetător și constructiv al omului, se deosebesc prin „obiectul de studiat“, prin „concepția“ principială și prin „metodele de tratare“.

Dintre aceste discipline, Fizica se ocupă cu studiul naturii materiale, clasificîndu-și obiectul de cercetat în grupuri de fenomene cu caractere analoge. Așa s'a dezvoltat treptat Mecanica, Electricitatea și Magnetismul, Optica, Termodinamica și celelalte. Astăzi nu se mai face o deosebire așa de marcantă între aceste diferite capitole ale Fizicii, fiindcă ele se îmbină și se ajută reciproc. Ceiace este sigur și caracteristic însă, este faptul că Mecanica e un capitol covîrșitor prin importanță. Inșăși evoluția istorică, a așezat-o pe poziție privilegiată. Putem afirma că legile, metodele și regulile Mecanicii își găsesc aplicație, cîteodată directă, în toate celelalte capitole. Astfel, deseori, o problema de Electrodinamică poate fi tratată ca o simplă problemă de Mecanică.

Toate aceste discipline științifice au rostul și menirea de a permite construirea de legi, descoperirea de relații și stabilirea unor metode cît mai comode nu numai pentru studierea pur științifică a problemelor puse de natura ce ne înconjură, ci pentru a putea pune stăpînire pe această natură și a o constrînge

să servească omului. Acesta este rostul aplicațiilor practice și tehnice din ce în ce mai complicate și mai complexe. E bine știut însă, că niciun studiu de aplicație tehnică nu poate fi înțeles, chiar nici expus cum se cuvine, fără a se folosi baza științifică a problemei. Deaceia, nu poate fi vorba de o pregătire profundă a multor discipline fizice sau tehnice, fără o cunoaștere precisă a Mecanicii.

2. Mecanica se ocupă cu studiul mișcării corpurilor materiale și cu studiul forțelor ce acționează aceste corpuri spre a le schimba starea inițială de mișcare. În felul acesta, Mecanica este o știință a naturii, care își fixează fundamentele și își formulează axiomele după anumite principii scoase din datele experimentale.

Iată câteva păreri exprimate de diferiți savanți asupra obiectului Mecanicii:

Ernst Mach: „Partea de fizică, cea mai veche și cea mai simplă, care prin urmare trebuie considerată ca bază pentru înțelegerea multor altor ramuri de știință, are ca obiect studiul mișcărilor și echilibrului maselor. Ea poartă numele de Mecanică“. (La mécanique, 1904).

H. Poincaré: „Englezii predau Mecanica socotind-o știință experimentală; pe continent ea este totdeauna expusă, mai mult sau mai puțin, ca o știință deductivă și a priori. Englezii au dreptate, se înțelege dela sine“. (La science et l'hypothèse, p. 110).

Paul Appell: „Printre toate științele matematice, prima este știința calculului, care se sprijină pe noțiunea de număr... vine apoi Geometria care face să intervie o noțiune nouă, aceea de spațiu... în Geometrie nu ne ocupăm de timpul în care se efectuează mișcările. Dacă facem să intervie noțiunea de timp, obținem o știință mai complexă, Cinematica; ea studiază proprietățile geometrice ale mișcărilor în raport cu timpul, fără a se întreba care sînt cauzele fizice ale acestor mișcări. Această problemă se pune în Mecanică“. (Traité de mécanique rationnelle, 1909).

Max Planck: „În lunga mea carieră didactică am făcut mereu experiența care mi-a arătat că dificultățile cu care are de luptat studentul învățînd Fizica teoretică, erau mai puțin din cauza formei matematice a problemelor, ci mai mult din cauza conținutului fizic al ideilor cuprinse în problemă. Nu calculul cu ecuații, ci punerea însăși a problemei în ecuație și interpretarea rezultatelor, îi dădea mai mult de lucru“. (Einführung in die allgemeine Mechanik, 1920).

S. Santelevici: „Cinematica este numai o introducere în Mecanica propriu zisă, știință care-și propune să studieze mișcările materiei așa cum se produce realmente în natură. Mecanica este deci studiul fizic al unui grup de fenomene naturale și ca atare ea pornește dela postulatul că aceste fenomene satisfac principiul cauzalității“. (Curs de Mecanică, 1929).

3. Creatorul Mecanicii este *Galileo Galilei* („Discorsi e dimonstrazioni matematiche“, 1638). Prin aceasta el poate fi considerat ca întemeietorul științei fizice, teoretice. Ocupîndu-se cu cercetarea cîtorva fenomene care se petrec numai pe suprafața pămîntului, el reușește să formuleze pentru prima oară o lege cauzală, sub formă integrală, pentru un anumit fenomen fizic.

Cel care stabilește însă cea dintîi lege fizică scrisă sub formă de ecuație diferențială este *Isaac Newton* („Philosophiae naturalis Principia mathematica“, 1687). Prin aceasta *Newton* construiește primul „sistem teoretic“ fizic: Mecanica rațională. Totodată *Newton* recunoaște necesitatea de a se preciza în știință noțiunile folosite curent spre a fi degajate de înțelesul lor comun, adeseori contradictoriu sau neclar. Iată ce spune *Newton*:

„Pînă acum am încercat să lămuresc sensul în care trebuiesc înțelese anumite denumiri mai puțin cunoscute. Nu voi defini noțiunile de timp, spațiu și

mișcare, cunoscute tuturor. Trebuie de observat totuși, că aceste mărimi, așa cum sînt cunoscute, obișnuit, se referă la simțurile noastre; prin aceasta iau naștere însă anumite idei preconceptuate, care se înlătură de obicei prin împărțire în absolut și relativ, real și aparent, matematic și comun“.

„*Timpul absolut*, adevărat și matematic se scurge, prin natura lui însăși, uniform, fără nicio relație cu vreun obiect oarecare. El este numit adeseori „durată“.

„*Timpul relativ*, aparent, comun, este ceva exterior pe care îl apreciem ca simțurile noastre, ca măsură a duratei, măsură mai precisă sau mai puțin precisă“.

„*Spațiul absolut* nu este, din cauza naturii sale însăși, în niciun fel de raport cu vreun obiect oarecare, fiind mereu același, în nemișcare.

„*Spațiul relativ* este o măsură a primului, sau a unei părți a primului, care este determinată cu simțurile noastre prin poziția sa față de alte corpuri“.

„*Mișcarea absolută* este deplasarea unui corp dintr'o poziție absolută spre altă poziție absolută“.

„*Mișcarea relativă* este deplasarea unui corp dintr'o poziție relativă spre altă poziție relativă“.

Deabia peste o sută de ani, Immanuel Kant repune în discuție noțiunile de spațiu și timp, din punctul de vedere filosofic al cunoașterii (*Kritik der reinen Vernunft*, 1787), căutînd să elimine caracterul absolut al ambelor noțiuni. Pentru Kant, spațiul și timpul nu sînt noțiuni empirice scoase din experiența cotidiană, ci sînt reprezentări necesare „a priori“-ce, care exprimă numai „forma pură“ a intuiției simțurilor noastre interioare. Spațiul și timpul nu există prin ele înșile; deci ele nu reprezintă vreo proprietate a „lucrului în sine“, care posedă o existență obiectivă, ci sînt condiții subiective de-ale simțurilor noastre, înăscute odată cu noi.

În felul acesta, Kant neagă noțiunea de spațiu și de timp absolut.

Pentru știința fizică, această critică și discuție filosofică în jurul noțiunilor de spațiu și timp nu a avut multă vreme o prea mare însemnătate. Totuși Fizica și-a dezvoltat cercetările și a evoluat, bazată pe concepția newtoniană de spațiu și timp, aproape două sute de ani, pînă cînd A. Einstein (1905) revizuieste aceste noțiuni pe baza concepțiilor izvorite din datele Fizicii experimentale și teoretice, crează Teoria relativității.

Mecanica newtoniană admite deci, ca realitate fizică, existența unui spațiu și al unui timp absolut. În acest spațiu absolut, mișcarea se poate reprezenta prin raportare la un anumit sistem de referință, iar timpul se măsoară după o anumită scară. Se ia ca sistem absolut de referință un triedru tridimensional cu originea în centrul de greutate al sistemului solar și cu axele îndreptate spre trei stele fixe. Metrica acestui spațiu este, în Mecanica newtoniană, aceea a spațiului euclidian cu trei dimensiuni exprimată prin teorema lui Pythagoras. Ca măsură a timpului se alege secunda solară medie, adică 1 : 86164 din durata unei rotații de 360° a pămîntului în jurul axei sale.

Studiul mișcării este studiul variației pozițiilor pe care un corp, definit prin coordonatele punctelor ce-l formează, raportate la un sistem de referință fix, le ia cu timpul. Pentru simplificare, fie un punct geometric M în mișcare. Coordonatele lui față de sistemul de referință (sistem de coordonate) sînt (x, y, z) . Ele pot fi reprezentate prin vectorul de poziție $\vec{r} = (x, y, z)$. Cînd ele variază, punctul descrie o curbă, numită *traectorie* și dată prin ecuațiile $\vec{r} = \vec{r}(t)$.

Mecanica are de răspuns următoarelor întrebări : a) de ce se mișcă un corp ; b) cum se mișcă un corp ; c) care este starea de mișcare relativă a diferitelor regiuni ce constituiesc un corp deformabil.

4. *Corp material.* O mare parte din spațiul care ne înconjoară este plin de materie. Un corp oarecare, luat la voe, este, el însuși, o aglomerație de particule mai mici de materie, unite între ele după anumite legi, pe care Fizica și Chimia se căznesc să le descopere. Din această observație simplă se vede că noțiunea de „corp material“ este, de fapt, extrem de complexă. Dacă am vrea să cercetăm, în ansamblul lor, modul cum sînt aranjate *moleculele* care constituiesc corpul material, apoi *atomii* în molecule, *electronii*, *neutronii*, *protonii* etc., în atomi și în nucleele atomilor, am ajunge la o problemă imposibil de rezolvat. Deaceia știința procedează prin simplificare și idealizare; apoi, încetul cu încetul, ea își modifică și dezvoltă criteriile și metodele, pătrunzînd tot mai adînc și mai amănunțit în natura fenomenelor fizice. Astfel, Mecanica nu se poate ocupa de „mișcarea unui corp material“ în tot complexul ei, dintr'odată. Adică, de mișcarea corpului în ansamblu, de mișcările diferitelor regiuni, una față de cealaltă, de deplasările și oscilațiile în interiorul corpului, a moleculelor, atomilor, etc.

5. Mecanica își propune, în primul rînd, problema studierii mișcării unui corp material considerat ca „*rigid*“ (distanțele mutuale ale punctelor sau părților ce-l constituiesc sînt invariabile). În realitate nu există un corp perfect rigid. Mecanica mediilor deformabile, se ocupă cu chestiuni ce privesc mișcările posibile ale corpurilor care se deformează; urmează apoi mecanica fluidelor, gazelor și așa mai departe, treptat. Dar nici chiar mișcările corpului rigid nu se pot studia dintr'odată! Ci, în prealabil, Mecanica idealizează un corp rigid extrem de simplu, fără dimensiuni: „punctul material“.

6. *Punctul material*, este un corp rigid, material, care poate fi considerat, după natura problemei dinamice propusă spre rezolvare, că are dimensiunile unui punct geometric; el nu efectuează mișcări de rotație în jurul vreunei axe trecînd prin el însuși; are o „*masă*“ materială. Punct material poate fi un electron, sau o piatră svîrlită din praștie, poate fi chiar pămîntul întreg în mișcarea lui planetară, dacă nu ținem seamă de rotația în jurul axei polilor. Vedem deci, că noțiunea de punct material este legată de felul problemei pusă; ea nu este o realitate absolută. Așa dar un punct material nu este o mărime fizică reală, ci o entitate fictivă menită să servească la simplificarea formulării și rezolvării problemei de mecanică.

7. *Massa.* Noțiunea de „*masă*“ este destul de complicată; ea cuprinde într'însa două înțelesuri, două caractere:

a) *Massa gravifică.* Proprietatea de greutate a masei unui corp este ușor de conceput, din experiența zilnică. Știm că orice corp are o tendință să „cadă“ spre pămînt, ca și cum acest pămînt l-ar atrage. Însă această atracție depinde de ceva caracteristic corpului dat, „ceva“ pe care noi îl numim „*masă*“.

b) *Massa inertă.* Masa mai are însă o altă proprietate, ea este inertă. Se știe din viața de toate zilele, că această proprietate este deseori pusă la contribuție. Cineva, care aleargă într'o direcție și își schimbă brusc direcția, înfrîmînd efectul masei, care, în virtutea inerției, îl menține în prima direcție. În tren, cînd pornește sau cînd oprește, cădem pe spate sau în față, — deoarece masa corpului nostru, caută, în virtutea proprietății de inerție, să-și păstreze starea de mișcare pe care o avea dela început. În general, efectul inerției se va resimți ori de cîte ori vom încerca să modificăm *brusc* starea de mișcare (sau de repaos) a unui corp material.

O experiență simplă ne pune în evidență cele două proprietăți ale masei unui corp¹⁾. Legăm o sferă grea *M* cu două fire; cu un fir atîrnăm sfera de un suport solid *B* lăsînd ca celălalt fir să atîrne în jos pînă în punctul *A*. a) Dacă tragem brusc din *A*, se va rupe firul *BM*, căci în acest caz efectul tragerii se va manifesta

1) Această experiență poate fi descrisă și în cursul de liceu.

ca o greutate aditivă lui M , se va aduna cu greutatea sferei, rupînd firul de sus.
 b) Dacă zmuncim brusc de A , inerția sferei va opune rezistență și se va rupe firul între AM . Această proprietate de inerție se exprimă prin cuvintele: „Orice corp are nevoie de timp, ca să-și schimbe starea de mișcare”; dacă i se lasă timp suficient, el își schimbă mișcarea sub acțiunea unei cauze exterioare; dacă i se impune să-și schimbe mișcarea brusc, el se va „opune”, adeseori surprinzător de puternic.

Putem aminti că, într-o vreme s'a crezut că masa gravifică a unui corp ar fi diferită de masa inertă. Această discuție a fost provocată de teoria relativității. O experiență celebră, datorită lui *Eötvös*, a dedus însă, că cele două mase sînt riguros egale.

Valoarea masei se exprima printr'un singur număr, întotdeauna pozitiv, *m-grame*. Este deci un scalar esențial pozitiv. Masa are proprietatea aditivă. Dacă adunăm două sau mai multe mase, vom obține totdeauna o masă mai mare, egală cu suma lor: $m_1 + m_2 = m$.

Din considerațiile de mai sus rezultă că noțiunea de masă este asociată cu noțiunea de acțiune exterioară (gravitatea sau acțiunea care tinde să schimbe starea de mișcare inițială a corpului). Asupra echivalenței dintre cele două mase vom reveni la sfîrșitul acestui curs (Cap. X).

8. *Forța*. În afară de cele două mărimi scalare, descrise mai sus, timpul și masa, care intervin în mișcarea unui corp material, într'un spațiu definit, experiența ne arată că orice corp material își schimbă starea de mișcare sau de repaos, cînd asupra lui lucrează o cauză exterioară, noi zicem, o *forță*. În multe tratate se definește „forța” ca fiind „cauza mișcării”; ceiace este nepotrivit. Noțiunea de „cîmp” face posibilă concepția de forță, independent de „mișcare”. Această noțiune este una din cele mai fructuoase, în Fizică, și este datorită fizicianului *Faraday*. Într'un domeniu, considerat ca sediul unor fenomene fizice, de ex. electrice, magnetice, gravitaționale, etc., „mediul” este dispus într'o anumită „stare” sau „configurație”, — stare potențială (în devenire) capabilă să declanșeze o mișcare atunci cînd se introduce în acest mediu un corp care să-i perturbeze starea lui actuală. De exemplu: într'un mediu electric produs de un conductor (în repaos) dacă introducem o particulă electrizată, aceasta se va pune în mișcare. Deci mediul cu configurația lui dată (zicem: „Cîmpul”) *există înainte* de introducerea particulei, — prin urmare înainte mișcării.

La fel cîmpul gravitațional există ca un „cîmp de forțe” înainte ca să se constate starea de mișcare a unui corp greu introdus în cîmp, — și independent de această mișcare.

Noțiunea de forță se obține prin observația fizică. Dacă avem un corp solid și printr'un mijloc oarecare îl deformăm, zicem că asupra corpului solid am făcut să acționeze forțe. Apăsînd cu degetul pe masă, am provocat o deformarea a suprafeței, etc. Forțe sînt de multe feluri: forța musculară, gravitatea, forța elastică, frecarea, forțele electrice, magnetice, etc. În general însă putem distinge: 1) Forțele ce acționează asupra suprafeței corpului și 2) Forțele ce acționează asupra volumului corpului.

Natura fizică a forței ne face s'o reprezentăm matematic printr'un vector. Acest caracter vectorial al forței intră ca un postulat, ca un principiu de bază, în Mecanică.

În rezumat, deci, obiectul Mecanicii este extras din natura înconjurătoare; el constituie primul capitol de Fizică; metoda de tratare este cea corespunzătoare unui sistem de Fizică teoretică, avînd ca materie de studiu ansamblul fenomenelor de mișcare și drept aparat de calcul, cel pus la dispoziție de Analiza matematică.

Cauzele glaciației. Ipotezele mai noi

de

ANDREI INCZE

Licențiat în științe, Cluj

Ipotezele ce servesc pentru elucidarea problemei glaciației, vor ține cont, în mod obligatoriu, de următoarele fapte:

1. Glaciația cuaternară pe emisfera sudică și nordică, era *simultană*.
2. În general, se deosebesc *trei perioade interglaciale*. Oscilațiile termice au drept consecință schimbări și modificări enorme: înaintări și regresii continue ale ghețarilor, mărilor, ale gurilor râurilor, alternanța pădurilor cu stepe reci, etc. Toate acestea de patru ori și într-o perioadă de $\frac{1}{2}$ —1 mil. de ani... La congresul din Viena s'a evidențiat intransigența dintre concepția *monoglacială* a paleontologilor și *poliglacialismul* susținut de geologi și morfologi. Se poate, că evoluția actuală merge spre o nouă perioadă interglacială numai și nici n'am intrat încă în „status quo ante” al climatului. După calculul *Milankowitsch-Köppen-Wegener*, durata cuaternarului este de 592.000 ani, din care 512.000 reprezintă interglaciile, și numai 78.000 de ani perioadele glaciale.

3. Denudația și eroziunea, în timpurile postglaciale, *nu a putut șterge încă complet urmele eroziunii glaciale*, pentru că a trecut cam puțin timp dela cuaternar încoace (după unii, numai de 7000—20.000 ani).

4. Clima glacială se caracterizează printr'o scădere a temperaturii medii anuale cu 8°, în Europa. Toate elementele climatice coboară spre Sud cu 13°—15°. Apa se acumulează sub formă de gheață și zăpadă, iar în interglaciale, ea se scurge în oceane, se constată deci o diferență de nivel de cca. 150 m. ¹⁾.

Este vrednic de relevat, caracterul *static* al primelor încercări de explicare, față de *dinamismul* teoriilor recente. Aceste prime tentative se bazează pe proprietățile *fizice ale atmosferei*. Astfel s'a presupus modificarea regimului vînturilor și al curenților marini prin ridicarea lanțurilor muntoase. Schimbarea procentului de acid carbonic în atmosferă era susținută de *Arrhenius* și *Tyndall*. Creșterea conținutului de CO₂ poate explica stratele carbonifere și clima tropicală din vecinătatea polului, la Ecuator însă ar rezulta o temperatură așa de ridicată, ce ar împiedeca orice viață.

Ipotezele *admisibile* actualmente pentru lămurirea fenomenelor glaciale, se grupează în jurul a două puncte de plecare: 1) acele, care pleacă din ideea *deplasărilor orizontale* ale continentelor sau din schimbarea poziției polilor; 2) acele, care pleacă din cauze extraterestre, *cosmice*. Teoriile primei categorii se inspiră din ideea *wegeneriană*. Plutirea continentelor produce tulburări enorme în aranjamentul urcăturilor și mărilor de pe glob. Se isbește însă de dificultatea *simultaneității* (vezi punctul 1), în schimb, are avantajul, că lămuirește situația *asimetrică* a calotei nordice, față de axa actuală a pămîntului, prin deplasarea polului N. spre oceanul Nordatlantic, iar a polului S. spre Australia.

Pe archipelagul Spitzberg s'au găsit strate carbonifere, la 10° de polul Nord. Asemenea strate, bogate în fosile au fost descoperite și de Byrd, în 1937, în

1) W. Behrmann, Beiträge zur Geographie der Eiszeit auf der Erde, p. 17.

Antarctica¹⁾. După teoria lui Wegener, aceste urcături erau primitiv situate în apropierea Ecuatorului.

Nu poate rezolvi însă problema *glaciației siberiene*. Această regiune, după teorie, s'ar afla la distanță mare de pol²⁾. Iese din cercul glaciației și Noua Zeelandă; țărmurile sale cu fiorduri sînt însă *consecințele morfologice evidente ale eroziunii glaciale*. Nu lămurește glaciația tropicală de ex. în Noua Guineea, urnele glaciale dela Carstenspitz³⁾ și pe Sarmaget (3746 m.). În fine, *nu explică interglacialele*. Chiar dacă admitem — modest — numai patru, teoria impune *deplasările multiple ale continentului*. De fapt, paleogeografia arată, că aranjamentul continentelor era aproape identic cu cel actual.

Teoria *migrărilor* inaugurată de Köppen și Kraichgauer, dealtfel obsedați tot de concepția lui Wegener. Cît privește această teorie, numai o deplasare în sensul meridianului ce trece prin mijlocul Groenlandei, poate servi pentru clarificarea problemei. Orice altă mișcare a polilor — în direcția Alascei sau a Siberiei e în contradicție cu așezarea simetrică a calotei în jurul Atlanticului de Nord⁴⁾. Să examinăm mai deaproape situația creată prin deplasarea polului N. cu de ex. 17%, dealungul meridianului susmenționat. Ne putem convinge *pe cale empirică* de absurditatea teoriei, dacă aruncăm o privire pe hartă. Natural, migrarea polilor spre Sud, comportă schimbarea canevassului întreg, a Ecuatorului și a *cercurilor paralele*. După noul aranjament, Ecuatorul (zona calmelor) trece prin regiuni ce astăzi prezintă un aspect pronunțat *arid* (reg. aride din America de S., reg. Titicaca, Minas Geraes din Brazilia, Africa de S.), iar *tropicul Cancerului* trece prin ținuturi, unde morfologia relevă o climă *umedă* (can. Panam, coastă de V. a Americii Centrale), cu dezagregare *subsilvică*⁵⁾ cît *tropicul Capricornului*, aceasta ar merge în sensul țărmurilor cu *fiorduri* ale Chilei și Patagoniei. Apoi se continuă în Africa, insule Sonde, Noua Guineea (cu solul de dezagregare de 60 m. grosime!). Cumpăna apelor andine fu împinsă spre versantul patagonian în Cuaternar, datorită *vînturilor puternice de Vest*, *ceiace exclude cu desăvîrșire supoziția, că această regiune ar fi fost cuprinsă în zona tropicelor*. Constanța regimului vînturilor este indicată și de limita zăpezilor din Europa. În urma migrării polilor, Siberia rămîne în afară de arcurile polare, deci în zona temperată. Ce contradicție cu resturile de mamut găsite în „tjăle“!⁶⁾ În fine, schimbări enorme în desfășurarea curenților marini. Se inversează raporturile curenților în Atlantic, cercul nordatlantic ar deveni mai slab iar cel sudatlantic, mai puternic. Aceasta nu poate să fie fără *consecință asupra mersului Golfstreamului*. Se știe însă cu siguranță, că acesta din urmă nu s'a schimbat în cursul Cuaternarului. Apa ce scăldase țărmurile Norvegiei, era liberă de gheață.

Dar deplasarea axei pămîntului s'ar repercuta și asupra *formei* sale. S'ar produce o nouă *umflare* (în virtutea forței cetrifuge) în reg. Ecuatorului cel nou. *ceiace s'ar manifesta inevitabil în tensiuni noi în scoarță, drept consecință ar fi mișcări orogenetice, ceiace însă nu se constată în realitate*⁷⁾.

Renumitul glacialog german, A. Penck, a declarat la al III-lea Congres de

1) National Geographical Magazine, Novembre 1937.

2) W. A. Obrutschen, Die Verbreitung der Eirzeitsspuren in Nord u. Zentralasien, Geol. Rundschau, XXI, 1933, 243—283, cu hartă, p. 247.

3) A. H. Colyn, Naar de eenwige Sneeuurd van tropisch Nederland Tijds. K. Ned. Aandr. gen. 1937, pg. 376.

4) Walter, „Mediterranis“, Pet. Mit. Erg. Heft. 225, Gotha, 1936.

5) K. Sapper, Über Abtragungsvorgänge in den regenfeuchten Tropen, g. z. XX, 1919, 5-8 81-92.

6) V. harta lui Schostakovitsch, in Zeitschrift d. Ges. Erdk. 1927, pg. 399, despre răspîndirea solului „tjăle“.

7) W. Behrmann, Die Konstanz der Lage des Gradnetzes auf der Erde während des Diluviums, g. 3, a 44. 3 Heft, 1938, 89-96, cu o hartă.

Cuarterologie dela Viena (1936): „Nur Kosmische Theorien vermögen die Eiszeit zu erklären“, și „exogen im wahrsten Sinne des Wortes die Eiszeit“¹⁾.

După astronomi, elementele ce pot da naștere, prin variația lor, la glaciație, sînt: a) înclinarea eclipticei cu o variație de $48''$ într'un secol; b) precesiunea echinocțiilor. Deplasarea întrece $50''$ pe an, încît în 26.000 ani punctele echinocțiale fac turul complet al orbitei; c) excentricitatea orbitei. Dacă ea crește, periheliul devine mai cald, decît afeliul. Din combinația acestor elemente, I. Milankowitsch a calculat „curba radiației solare“ (Strahlungskurve). O excentricitate mai mare, unită cu o coincidență a afeliului cu iarna și cu o maximală oblicitate a eclipticii cauzează o perioadă glacială; o excentricitate mai mică, unită cu o coincidență a afeliului cu vara și cu o minimă oblicitate a eclipticii cauzează o perioadă interglacială (v. recenzia d-lui prof. N. Al. Rădulescu, Rev. Geogr. Rom. vol. I, 1938, pag. 19). Slăbiciunea teoriei rezidă în contradicția ei cu: 1) glaciația tropicală; 2) cu simultaneitatea glaciației; 3) cu perioadele interglaciale; 4) cu asimetria calotei nordatlantice.

O ipoteză recentă este a lui M. L. Zinner²⁾. Pornește dela premiza, că pămîntul se învîrte dela început în jurul aceleiași axe. Admite însă o oscilație periodică a înclinării Ecvatorului pe planul orbitei sale. Planetele s'au format dintr'o masă de materii învîrtindu-se în jurul axei celei mari, în planul eclipticei³⁾. Planetele la început continuă aceiași mișcare, în planul orbitelor lor, ca Uran astăzi. Să reamintim învățătura lui Thompson, despre legile mișcării sfîrlezei. Oricîteori precesiunea este întîrziată, sfîrleaza cade, în virtutea gravitației. Acum radiația solară poate provoca o întîrziere în precesiunea planetelor. Studiul giroscopilor arată că dacă n'ar exista forțe care produc o întîrziere în precesiunea Pămîntului, această mișcare ar poseda un ritm uniform, fără nicio tendință de modificare a înclinării polilor pe planul orbitei: pe dealtă parte, dacă mișcarea precesiunii ar fi complet împiedecntă, atracția Soarelui, exercitată asupra umflăturii ecvatoriale, l-ar pune pe Pămînt într'o poziție verticală și l-ar menține în oscilație, exact cum este cazul unui pendul enorm, ce oscilează fără frecare. Dacă putem demonstra, că una din forțele ce tind a întîrzia precisiunea, este suficientă pentruca să producă o așa oscilare a polilor, atunci vom putea explica ușor variațiile periodice de climă. Planeta Uran cu mișcarea sa aparent retrogradă și cu înclinarea de cca 90° a ecvatorului său pe planul orbitei, ne face să ne gîndim că și Pămîntul trebuie să fi avut aceiași pozție în anumite perioade ale trecutului său. Cu privire la teoria luminii, vechea rivalitate dintre concepția corpusculară și ondulară a dispărut. Corpurile și undele nu sînt entități deosebite, ci numai manifestările deosebite ale aceleiași fenomen. Radiația solară este compusă din fotoni, mici pachete de energie, cu o masă definită; ele sînt lansate de Soare pe Pămînt, ca niște proiectile, cu viteză extraordinar de mare. În momentul cînd ele se izbesc de fața Pămîntului întoarsă spre Soare, ele se deviază în unghi drept și obțin o accelerare de 18 km. pe secundă, în direcția mișcării Pămîntului pe orbita sa, dînd naștere la o forță care tinde să învîrtească Pămîntul în jurul unui pol perpendicular pe ecliptică și în senz contrar cu precesiunea. Aceasta are efectul să întîrzie precesiunea Pămîntului, cîciace ar permite forței de atracție a Soarelui, exercitată pe umflătura ecuatorială, să accelereze polii spre verticală. Dacă durata timpului cît ea se exercită e destul de lungă, ea ar ridica polul pămîntului din planul eclipticei, dîndu-i o poziție de unghi drept, conferind

1) „Europa zur letzten Eiszeit“, Sonderdruck aus bänderkundl. Forschung. Stuttgart, 1938.

2) Les causes de les grandes periodos gliciales. Una nueva hipotesis. „Scientica“, a, XXXII., Serie III, 1/VI, 1938, 313—320.

3) I. Jeans, The Universe around, US.

pământului oscilații de foarte lungă durată. Dacă pământul s'ar învârti în jurul unei axe perpendiculare pe planul eclipticei, nu s'ar mai produce anotimpurile: zona ecuatorială ar avea o vară perpetuă, iar regiunile prin jurul polilor pînă în 45° lat. N. ar avea o temperatură scăzută, tot anul, cu alte cuvinte: o perioadă glacială.

Singura întrebare este, dacă radiația solară este într'adevăr compusă din particule, având o greutate? Cercetările de fizică atomică au relevat faptul că particulele materiei, dacă ele nu sînt identice cu ale radiației, sînt cel puțin similare cu ele. W. H. Bragg remarcă: „Distincțiunea între materie și radiație e o distincție de grade și nu de specii”¹⁾. Dacă teoria particulelor luminii e adevărată, ea poate explica cauzele glaciațiunii. Ea e incompatibilă însă cu teoria relativității. După Einstein, masa unui particul ce se deplasează cu viteza luminii, devine infinită. Așa dar „fotonii” călătoresc în spațiu cu viteza luminii, cu toate că masa lor nu este infinită. Deci una sau alta din cele două teorii cade, ele nu se pot împăca, deocamdată.

E. Belot relevă importanța nourilor de praf cosmic²⁾, pe care pământul le traversează în drumul său. Se știe, că în timpul eclipselor de soare, cu ce rapiditate scade temperatura pe pământ. E destul, ca un nor cosmic foarte puțin dens, să ajungă între soare și pământ, pentru ca să se diminueze considerabil intensitatea radiației solare, lumina solară devine roșie și se produc fenomene glaciare pe pământ. Singura condiție este ca densitatea nourului să nu fie prea mare, căci ar împiedeca mișcarea planetei. Periodicitatea glaciației s'ar explica prin trecerea succesivă a pământului prin mai multe serii de nouri de pulbere cosmică. Oricum, planeta e din cuprinsul nourului, urmează o perioadă interglacială.

Răspîndirea Alkanninei în flora Romîniei

de

CONSTANTIN PAPP

Profesor la Universitatea din Iași

Alkannina numită și Anchusină sau roș de Alkana, este o substanță colorantă roșie, ce s'a extras pentru prima dată din organele subpămîntene ale plantei *Alkanna tinctoria* Tausch. Compoziția chimică este $C_{15}H_{14}O_4$, ce pare a fi Dihydroxymetylantrachinon. E o substanță amorfă, ce se prezintă în solzișori roș închis, ce sublimează ușor (la $+60^\circ C$) în vapori violeti, formîndu-se apoi picături roșii amorse. E insolubilă în apă, dar solubilă în solvenții organici obișnuiți, precum și în soluțiile alcaline. Cu acestea dă o soluție albastru închis, ce prin acidulare, trece în roș.

Această substanță colorantă este destul de răspîndită în părțile subpămîntene ale diferitelor specii de Borriginacee, ce cresc spontan pe întinsul Romîniei, astfel la speciile de: *Alkanna* (răspîndită în locuri nisipoase din sudul Moldovei), *Cynoglossum*, *Echium*, *Echinosperrum*, *Lithosperrum*, *Onosma* și *Rochellia*. Speciile aparținînd primelor trei genuri, au rizoame groase, pivotante sau fu-


1) The Universe of Light.

2) E. Belot, La cause astronomique possible des périodes glaciaires. L'Astronomie, 1938, p. 29-30.

siforme, ca de 1—1,5 cm. grosime și ajungînd chiar pînă la 30 cm. lungime (*C. officinale*). Coaja rizoamelor și rădăcinilor uscată, este neagră purpurie și de obicei se exfoliază foarte ușor — astfel crapă în lungul organului. Genurile *Echinosperrum* și *Lithosperrum*, au rădăcini subțiri, fusiforme, parte ramificate, iar coaja rădăcinii uscate, e roșcată sau brună închis.

Rizoamele și rădăcinile acestor plante, cînd sînt smulse proaspăt din pămînt, au pe suprafața lor niște pete roșcate sau chiar roșii, ce se găsesc mai ales în zonele din apropierea eșirii rădăcinilor adventive sau a locului de inserție al frunzelor bazale. Rădăcinile tinere și perii absorbantți, sînt complet colorate în roș. Această substanță colorantă, nu se găsește în organele aeriene.

Celulele din dreptul acestor pete, prezintă în interiorul lor pigmenții roși în grupe, care la microscop apar sub formă de dungi (fig. 1). Alkannina apare sub formă de granulații fie în celule sau pe fața internă a membranei sau chiar în spațiul intercelular (fig. 2, s), sau la suprafața organelor. În cantitate mai mare, se formează în celulele suberificate — fără însă ca acestea să constituie



1. *Lithospermum arvense*: Porțiune din o secț. superf. prin rădăcină în dreptul perilor absorbantți (p). Se observă dispoziția în dungi a substanței colorante din celule.
2. *Echium vulgare*: Porțiunea externă din o secțiune transversală prin rădăcina bătrînă. Se observă substanța colorantă în spațiile intercelulare și în lamela mediană a membranei.
(După Gertrud Pulitzer l. c., în parte schematizate de autor).

un suber normal. Chiar după moartea celulei, substanța colorantă rămîne izolată în cytoplasmă; în țesuturile vii, ea apare sub forma de picături, pe cînd în celulele uscate — țesuturi moarte — se prezintă sub forma de solzișori amorfi.

Alkannina se formează devreme în embrion, în celulele superficiale ale rădăcinii sau în perii absorbantți, străbate apoi prin membrana celulelor și esă la suprafață sub forma de picături. Ea se poate produce și pe cale experimentală, prin rănirea rădăcinii în anumite puncte.

Ca material de herbar, rizoamele și rădăcinile acestor specii de plante, colorează hîrtia pe care se păstrează planta, sub forma de diferite dungi roșii, după forma organului ce a venit în contact cu hîrtia. Aceste pete rămîn roșii în contact cu soluții acide, și devin albastru-închis, cînd sînt udate cu soluții alcaline. Acesta e dealtfel procedeul de a recunoaște în materialul de herbar, prezența Alkanninei.

În tabloul următor, sînt enumerate toate Borraginaceele ce cresc spontan pe teritoriul Romîniei și a căror organe supămîntene, conțin Alkannină. Unele conțin o cantitate mai mică (notate cu +), pe cînd altele o au mult mai abundentă (notată cu ++). Din acest tablou se poate constata că speciile ce trăesc în locuri xerofite — uscate — și cu rizoame groase, pivotante, au cea mai mare cantitate de Alkannină, ceiace arată că probabil condițiile unui mediu xerofit, favorizează dezvoltarea acestei substanțe colorante, pe cîtă vreme, ea lipsește

Numele plantei	Numele popular	Cantitatea de Alkannină
<i>Alkanna tinctorial</i> (L.) Tausch.	—	+ +
<i>Cynoglossum montanum</i> Lam.	—	+
<i>C. officinale</i> L.	Limba cînelui	+
<i>Echinosperrum barbata</i> M. B.	—	+
<i>E. deflexum</i> Lehm.	—	+
<i>E. Lappula</i> Lehm.	Lipici	+
<i>Echium italicum</i> L.	Coadă vacii	+
<i>E. rubrum</i> Jacq.	Capul șarpelui	+ +
<i>E. vulgare</i> L.	Iarba șarpelui	+ +
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Mărgelușe	+ +
<i>L. officinale</i> L.	Mei-pășăresc	+ +
<i>Onosma arenarium</i> W. K.	Otrăjel	+ +
<i>O. calycinum</i> W. K.	—	+ +
<i>O. stellulatum</i> W. K.	—	+ +

la speciile cu rădăcini subțiri și ramificate cum sînt cele de *Asperugo*, *Myosotis* și *Lithospermum purpureum-coeruleum*, sau la acelea, care cu toate că au rizom gros, dar trăesc în locuri mai umede — mesofit-sylvatice — cum sînt speciile de *Pulmonaria* sau *Symphytum*. Prin urmare, Alkannina, se găsește în cantitate destul de mare la plantele cu habitusul uscat și trăind în locuri sorite, precum și la speciile de *Echium* (excl. *E. italicum*), *Onosma* și *Lithospermum*, pe cîtă vreme, speciile de *Cynoglossum* conțin foarte puțin.

Alkannina sau roșul de Alkanna, se întrebuițează în industrie la colorarea bumbacului și mătasei, iar în oficiu sau parfumerie, deoarece nu e o substanță toxică. se întrebuițează la colorarea pomezelor și grăsimilor; pentru faptul că este un colorant al grăsimilor, se întrebuițează și în tehnica microscopică, pentru a colora în cytologie, substanțele grase din celula vegetală.

Deoarece în flora Romîniei cresc prin urmare un mare număr de plante ce conțin Alkannină, alcătuiind specii destul de comune (excl. *Alkanna*), s'ar putea întrebuița pentru extragerea colorantului pe o scară mai întinsă. Părțile subpămîntene ale acestor plante, scoase din pămînt în plină vară, se usucă bine — chiar la soare; în acest mod, coaja se crapă în lung și poate fi desprinsă cu ușurință, căci, numai ea este partea ce conține substanță colorantă, căci partea centrală a organului uscat este lemnoasă și nu o conține decît indirect, prin impregnarea membranelor celulelor. Aceste părți uscate și în special coaja (suberul și scoarța), se păstrează bine în vase sau cutii ferite de umezeală. Din acest material uscat, se poate extrage substanța colorantă, prin operații obișnuite de macerație, decantare și evaporare pe bae marie. Macerația se face din 10 gr. substanță uscată la 100 gr. alcool 96° și durează 4—5 zile, la temperatura ordinară; după decantare se evaporază pe bae marie la +40° C și se obține astfel o substanță amorfă, colorată roș intens, ce este Alkannina. Proprietățile ei, cu siguranță sînt aceleași, fie ea extrasă din orice plantă, și aceasta o dovedește faptul că am putut obține rezultatele tehnice cele mai frumoase, întrebuițind Alkannina extrasă din *Echium rubrum* experiență ce am făcut-o cu ocazia lucrărilor cytologice în Laboratorul de Botanică a Universității Mihailene din Iași. Claritatea colorantului numit „*Tinctura Alkanna*” și rapiditatea de colorare, ne-a făcut să părăsim cu totul rizomul de Alkanna ce e recomandat în toate manualele clasice de tehnică microscopică.

LITERATURA CONSULTATĂ

1. *Hager Herman*. — Handbuch der Pharmaceutischen Praxis, I. Berlin 1882.
2. *Handwörterbuch der Naturwissenschaften*, VII. Jena 1912.
3. *Molisch Hans*. — Mikrochemie des Pflanze. Jena 1921.
4. *Pulitzer Gertrud*. — Über die Verbreitung des Alkannis bei den Barragineen und sein Auftreten in der Pflanze. Oester. Bot. Ztsch. LXV, 1915.

Iași, Decembrie 1939.

Note și informațiuni

Modificări morfologice externe și modificări interne fizico-chimice și fiziologice la plantele unisexuate în timpul dezvoltării. — În grupa plantelor unisexuate intră atât plante inferioare (alge și ciuperci), cât și plante superioare (gymnospermae și angiospermae). Caracterul de unisexualitate este mai redus la plantele Phanerogame decât la cele Cryptogame, fapt ce ne face să socotim *unisexualitatea ca un caracter de inferioritate*. La Monocotyledonate, socotite ca cele mai superioare din punctul de vedere al evoluției, acest caracter, dacă se întâlnește la unele plante (Arum, Typha etc.), are tendință evidentă spre hermafroditism, caracter pe care-l posedă numai plantele cu flori. *Hermafroditismul plantelor superioare trebuie considerat ca cel mai superior caracter pe care îl posedă aceste plante în vederea asigurării perpetuării speciei*. În regnul vegetal, ca și în cel animal, acest caracter de unisexualitate se manifestă de cele mai multe ori printr'un demorfism sexual citeodată foarte accentuat (Cannabis, Urtica).

Indivizii masculi sînt adeseaori mai mici decât cei femeii. Sprecher, care s'a ocupat cu studiul asupra variabilităților sexelor la Cannabis sativa (cînepă) și Rumex acetosa (Măcriș), a constatat această diferență între indivizii masculi și femeii, atât în lungime, grosime cât și în greutate. Plantele masculine (cînepa de vară, bărbătească), sînt mai lungi decât cele femele în momentul înfloririi, dar imediat după înflorire creșterea încetează. Plantele femele (cînepa de toamnă, femeiască), cresc chiar după înflorire și devin mult mai lungi, mai groase și mai grele decât cele masculine în momentul înfloririi. Deasemenea plantele femele de Rumex acetosa, sînt mult mai lungi și mai grele decât cele masculine. Dimorfismul sexual la Cannabis se constată foarte bine în parcelele îngrășate cu în-

grășămînt complet și cele neîngrășate și această variabilitate de formă este și mai accentuată cînd plantele provin din semințe nealese.

S'a constatat că parcelele care conțin acid fosforic, un azotat și var, produc plante mai lungi decât parcelele care n'au aceste substanțe și de aici concluzia că *hrana este unul din factorii care determină diformismul*. Potasiul favorizează în mică măsură lungirea plantelor de cînepă. Variabilitatea în lungime și greutate este mult mai mare la plantele femele.

Sprecher, găsește la Rumex că cea mai mare lungime la plantele femele, este în parcele care cuprind ca îngrășămînt potasiu. Plantele femele din parcelele care au ca îngrășămînt azot și var sînt mult mai mici.

Această plantă are alte nevoi decât cînepa. La cînepă și măcriș găsim nu numai deosebiri de formă, dar și deosebiri interne fiziologice și acestea sînt de sigur cele mai importante și care merită toată atenția. Tot Sprecher, determinînd la cele două sexe de cînepă și măcriș presiunea osmotică a sucului celular extras din frunzele plantelor masculine și femele, constată o diferență de presiune de jumătate atmosferă între cele două sexe. Presiunea osmotică a sucului celular este mai mare la plantele masculine decât la cele femele; astfel la cînepă presiunea sucului celular extras din frunzele masculine a fost găsită de 10,580 atmosfere, iar a sucului celular extras din frunzele femele de 10,104 atm. La măcriș, presiunea osmotică a sucului celular extras din plantele masculine a fost găsit de 7,67 atm., iar la suctul celular extras din plantele femele de 7,21 atm. Deasemenea și punctul de congelare a sucului celular extras din frunzele masculine de măcriș a fost găsit mai ridicat decât cel dela suctul extras din frunzele femele.

Această diferență de presiune osmotică este datorită, după Sprecher, cantității mari de substanțe organice (zaharuri, acizi organici), care se găsesc în suc celular al plantelor masculine. Un litru de suc celular extras din plantele masculine conține în medie 10 grame mai mult de substanță uscată decât suc celular extras de la plantele femele. Cantitatea de cenușă obținută din arderea a 100 gr. de substanță de plantă masculă este în cantitate mai mică decât cenușa din planta femelă, raportată la aceeași cantitate. Acest fapt ne arată în mod clar că substanțele organice se găsesc în cantitate mai mare la plantele masculine. Pentru că substanțele organice au un pond molecular mai mare decât substanțele minerale, nu e de mirare ca să găsim la plantele masculine o greutate moleculară mai mare decât la cele femele.

Substanțele organice acumulându-se pînă la dezvoltarea maximă a plantelor și fiind în cantitate mai mare la plantele masculine, masculii ar fi la un stadiu mai înaintat de dezvoltare decât femelele și presiunea osmotică care există la aceste plante, este numai temporară. Două plante care ies din două semințe semănate deodată, nu sînt la aceeași vîrstă din punctul de vedere fiziologic, mai ales cînd este vorba de plante femele și masculine, planta masculă terminînd mai repede perioada de dezvoltare decât cea femelă.

Sucul celular extras din frunze în momentul înfloririi la ambele sexe are o concentrație mai mare la plantele masculine decât la plantele femele. De asemenea concentrația sucului celular extras din tulpinele masculilor în momentul înfloririi este mai mare decât a sucului extras din tulpinele femelelor. Această diferență de concentrație este datorită, probabil, marii acumulări de substanțe organice în plantele masculine în vederea lignificării apropiate a celulelor. Cînd această lignificare are loc, suc pierzînd din substanța organică își schimbă concentrația. Acest fenomen este foarte vizibil la plantele masculine de cîneapă, care încetînd de a mai crește după înflorire presiunea osmotică a sucului celular scade și trece prin valorile presiunii osmotice de la plantele femele. La femele presiunea osmotică este maximă în momentul maturizării semințelor (Sprecher).

Satina și *Blakeslee*, făcînd cercetări asupra oxidazelor în frunzele de *Rhamnus*, constată că extractul alcoolic (alcoool 60%) din frunzele femele era mai gălbui la culoare, pe cînd cel obținut din

frunzele masculine era de culoare mai verde. Ei puseră în evidență oxidazele prin trei metode:

1) *Soluția alcoolică de guajac*; 2) *Soluție de naftol și dimetyl p. fenilen diamină*; 3) *Soluție de naftol*. Pentru punerea în evidență a peroxidazelor întrebuițară desemeana cele trei metode în prezența apei oxigenate. Reacția cea mai puternică de colorare fu obținută cu extractul din plantele femele. Tot ei constată că aciditatea totală, măsurată prin numărul de picături de soluție n/10 de KOH necesar spre a obține neutralizarea în prezența fenolftaleinei, este mai mare la suc celular obținut din plantele femele.

Dozînd colorimetric carotina din frunzele de *Morus*, femel și mascul, și din cele de *Rumex acetosela*, *Satina* și *Blakeslee* găsiră de asemenea diferență; frunzele femele conțin o cantitate de carotină mai mare decât cele masculine.

Deleanu și *Dick* au găsit o cantitate de carotină mai mare la frunzele masculine de *Salix fragilis* L., decât la frunzele femele.

De aici se vede, că modificările fizico-chimice sînt sub dependența variațiilor factorilor externi (hrană, căldură, umezeală, lumină, etc.) și manifestările sexualității.

S'au făcut cercetări pentru a se vedea puterea reductoare a sucului celular extras din frunzele masculine și femele. S'a constatat că puterea reductoare era mai mare la extractul obținut din frunzele masculine.

Satina și *Blakeslee* socot că marea putere reductoare a sucului extras din plantele masculine ar fi datorită conținutului mare de zaharuri și tanin. *Joyet-Lavergne* atribue deosebirea puterii reductoare glutatoniului. Cum vedem cunoștințele asupra acestei chestiuni sînt încă neprecise. Este foarte probabilă intervenția unei cantități mari de reductază.

Schopfer, care a studiat prezența lipidelor la diverse specii de *Mucor* prin extracția cu eter de petrol, a găsit că la *Mucor hiemalis* cantitatea de lipide este mai mare la plantele femele decât la masculine, pe cînd *Satina* și *Blakeslee* nu găsiră nicio diferență la ciuperciile studiate de ei. Prin studiul său, *Schopfer* a adus o contribuție foarte prețioasă, fixînd definitiv sexul speciei de *Mucor Hiemalis*. El arată diferența în conținutul de carotină și lipide, care se găsește în miceliu și progamet. Sexul care este mai bogat în grăsime este considerat de acest autor ca sex femel.

Din cele spuse pînă aici, se vede clar că există diferențe importante în ce privește mai ales plantele superioare între sucul celular extras din plantele femele și masculine. Acest fapt ne arată că *nutrirea celulară este deosebită după sex și că întrebuințarea materiei hrănitoare se face în mod deosebit*. Presiunea osmotică, aciditatea totală, conținutul în carotină, lipide, oxidaze, peroxidaze și reductaze se deosebește după sexul considerat.

Metabolismul total diferă după sex, pentru că mecanismul nutriției celulelor nu este supus exact aceluiași modalități în un sex și celălalt. Există o perfectă asemănare, în această privință, între plante și animale.

H. CHIRILEI

Preparator la Laboratorul
de Fiziologie vegetală

O nouă stațiune de *Lepidium crassifolium* în Moldova.—*Lepidium crassifolium* W. K. (Lep. cartilagineum (L. Mey. Thell) a fost semnalat în Moldova numai în puține rînduri în literatura botanică.

Dimitrie Brandza în Prodrumul Florei Romîne îl citează bazat pe afirmațiile lui Guebhard și al lui Czihaș și Szabo. De aceste afirmații s'a ocupat d-l Prof. Const. Papp în No. 2 vol. XXV, pag. 69 al acestei reviste.

Planta n'a mai fost menționată în literatură pînă în ultimul timp, cînd d-l Const. Papp o întilnește în vara anului 1938 (publicînd-o l. c.) la sud de satul Giurcani depe valea pîrului Elan¹⁾ jud. Fălciu.

În vara anului 1939, luna Iulie, am descoperit această specie într'o sărătură pe valea Ilenei: vale seacă, dar prezentînd urme de șuvoiere, afluentă aceleia a Bahluiului mai la nord de satul Cucuteni (Iași) și străbătută de linia ferată Iași-Cucuteni-Dorohoi.

Planta, reprezentată prin numeroși indivizi viguși, rari, ajunși la fructificație, popula pe o întindere de cîteva zeci de metri taluzele șanțului de împrumut din lungul terasamentului C. F.; pe o prea mică porțiune se găsea și pe fundul șanțului, lat de 8-9 m., reprezentată prin indivizi cei mai mulți opriți în cursul desvoltării: cu tulpina scurtă de tot și o rozetă de cîteva frunze, ce dădeau semne de ofilire (unele cu marginile, altele în întregime, uscate).

1) Defunctul C. Petrescu, fost șef de lucrări la acest Laborator a colecționat-o tot depe acea vale, din sărăturile dela Murgeni. A încadrat-o și a expus-o pe sala Laboratorului ca „raritate“.

În șanț, fuseseră aduse și depuse aluviuni abundente (argilă amestecată cu nisip fin). În regiune bîntuia seceta de aproape două luni, cu toate acestea, pe fundul șanțului, la adîncime de 3-4 cm., argila era îmbibată cu apă în așa măsură, încît era plastică, iar pe taluze, la o adîncime ceva mai mare, solul era de asemenea din belșug încarcat cu umezeală. Astfel că rădăcinile plantei, groase și pătrunzînd adînc în pămînt, se găseau în pături ale solului cu o bogată umiditate.

Printre Indivizii depe taluze se amestecau puține exemplare de *Obione portulacoides* Moqu, mult ramificate, înflorite, iar printre cei depe fundul șanțului, exemplare de *Camphorosma ovata*, W. K. și *Kochia hirsuta*, Nolte (*Bassia hirsuta* (L) Asch). Indivizii ambelor specii erau tineri.

În tot lungul acelei văi, ochiurile de sărături erau foarte dese atît pe fundul ei cît și pe dealurile vecine; iar vegetația halofilă era astfel reprezentată încît împrima caracterul general al florei. Grație însă abondentei eflorescențe de săruri, porțiunea de teren pe care se găsea instalat *Lepidium crassifolium* se impunea printr'o culoare albă-cenușie, ce contrasta puternic cu regiunea învecinată. Din aceeași cauză, acele porțiuni înfățișau un sol erodat („ars“) la suprafață, fin pulverizat, încît păreau acoperite cu cenușă.

C. BURDUJA

Lab. de Botanică-Iași

Observații asupra ciufului de pădure în captivitate.—În Iunie 1934, am avut ocazia să găsesc un cuib cu pui de *Asio otus* (L), sau ciuful de pădure, în pădurea satului Bularda (jud. Orhei). Unul din pui a fost luat și crescut în captivitate, sub ochii mei, pînă ce a devenit adult. Am putut deci observa cîteva obiceiuri interesante din viața acestei păsări frumoase și originale. Cele observate, le expun în nota de față.

Cuibul păsării a fost găsit într'o pădure tînără și deasă, la o depărtare de de cel mult 50 de pași dela marginea ei, pe un stejar tînăr, mai sus decît ceilalți copaci. Era probabil un cuib de cioară părăsit, fără o formă precisă, fiind făcut din vreascuri subțiri, puse fără nici o ordine unul peste altul. Acest cuib era așezat la o înălțime de trei metri aproximativ, pe cîteva crengi subțiri. În cuib erau trei pui de mărime diferită, un ou și doi șoareci morți. La apropierea de cuib, puilul cel mai mare începu să se arunce cumplit asupra mea, sbîrlindu-și penele, clămpănind din cioc și la fie-

care săritură, producând un fișuit, care amintește stupitul unei pisici, atăcată de un câine.

Puiul făcut prizonier era foarte sălbatic în primele zile și nu lua hrana decât în mod forțat. Era hrănit cu vrăbii, carne de cioară, de coțofană și de iepure, dar mai ales de șoareci. Am încercat să-i dau bucăți de piine, însă fără succes. Totuși, când nu aveam carne, era forțat să înghită piine.

Am așezat pasărea într-o cameră goală, cu o fereastră spre apus. Din momentul în care a putut să zboare, se așeza și stătea tot timpul pe oblon lină geam. Ținea corpul întins vertical, aripile lipite de corp și smocurile de pene ale urechișelor ridicate în sus; pasărea schimba din când în când piciorul și iarăși rămânea fixă.

Peste scurt timp, puiul s'a deprins cu mine și a început să ia hrana din mână, mai ales când era înfometat. Cu toate acestea, el prefera să sfîșie și să înghită victima, fără martori. Ii plăcea să mince în timpul nopții hrana pusă dimineața pe o scîndură și lăsată aproape întotdeauna neatinsă pînă seara. Hrana ce i se da seara, era consumată întotdeauna pînă dimineața.

Pasărea ținea carnea cu o labă și cu ciocul o rupea în bucăți. Dacă i se da un șoarece mort, îi rupea mai întii capul; proceda la fel, dacă i se da o vrăbie. Niciodată nu schimba această ordine: rupea capul victimei cu o singură lovitură de cioc, îl înghițea și apoi consuma și restul corpului. Obiceiul de a rupe mai întii capul l-am mai observat la *Athene noctua* (Scop.) și la *Stryx aluco* L. Ciuful de pădure omoară șoarecii fie strîngîndu-i în ghiare încît nu mai mișcă, fie strivindu-le capul cu ciocul. Numai când este foarte înfometat, el înghite șoarecele din una sau două înghițituri și uneori se înneacă. De cele mai multe ori însă pasărea, după ce a omorît șoarecele, nu-l înghite imediat, ci întocmai ca pisica, ține șoarecele în gură, își zburlește penele și bate puternic din picioare. Pasărea minîncă destul de mult. La vîrsta de o lună și jumătate minîncă într-o noapte 4—6 șoareci sau vrăbii.

Desvoltarea puternică a mușchilor masticatori și mușchilor gîtului permite păsării să tîrască ușor pe pămînt un pui de iepure de 1½ kg. Ea duce prada cu labele, rareori în cioc. Pe pămînt nu pășește, ci sare destul de rău; în schimb zborul ei este îndemînat și fără zgomot.

Dacă-i arăt o vrăbie sau un șoarece,

ciuful zboară spre mine, apucă hrana cu o labă și se întoarce la locul său pe oblon sau se așează pe pămînt. Totuși, când este relativ sătul, el nu se mai apropie, ci așteaptă să-i dau singur hrana.

Cînd vede că i se aduce hrana, își schimbă poziția de repaos, se tupilează, își zburlește penele, lasă în jos urechișele și începe să țipe; deschide larg gura și miorlăește ca o pisică, cînd e călcată pe coadă; în acest timp, în același ritm, cu țipetul, pasărea lovește cu picioarele în pămînt. Uneori, agitația ajunge la culme, cînd întinzîndu-și aripile în formă de evantaliu, zburîndu-și tare penele și bătînd din picioare, încearcă să se repedă la mine.

Nu-i place să pun mîna pe ea; în schimb, adeseori se așează singură pe umărul sau pe capul meu. Se supără repede cînd o iau în mînă, arătîndu-și supărarea printr'un prelung „țir-țir-țir”, cînd deschide foarte puțin ciocul, mișcîndu-l însă foarte repede, parc'ar bate în tobă.

Pasărea mai produce, mai ales noaptea un strigăt care amintește miaunatul pisicii. Ea mă primește cu acest strigăt, care poate fi graiul ei obișnuit de înțelegere, în pădure, cu congenerii săi.

Starea sufletească a ciufului de pădure se manifestă deasemenea prin felul în care ține urechișele. În mod obișnuit, penele urechișelor stau ridicate în sus și puțin oblic; iar cînd pasărea se mișcă, ele se lasă pe cap. Dacă se minie, își strînge urechișele pe cap, care pare mai mic și alungit, cum fac caii supărați. Cînd e speriată, ea produce un sîsîit caracteristic și bate tare și repede din cioc.

Este interesant cum apare penajul păsării. Cînd am luat puiul din cuib, el era acoperit cu puf și penele urechișelor erau tot din puf. După zece zile au început să apară penele la aripi și după alte 15 zile puiul putea să zboare. Au apărut mai întii penele de pe aripi, apoi dela coadă, și odată cu acestea, penele de pe față, în urmă penele de pe spinare și mult mai tîrziu penele de pe piept; iar înaintea lor, s'au schimbat penele urechișelor și puful de pe picioare a dispărut. Tocmai la urmă au început să apară penele de pe ceafă.

Este de remarcat că, în obiceiurile acestei păsări găsim multe asemănări cu obiceiurile pisicii. Graiul lor se aseamănă și ca strigăt și ca semnificație. Chiar hrana lor este aproape aceeași, în primul rînd șoarecii și păsările mici.

Această convergență de caractere la o

pasăre de pradă și la un mamifer de pradă, care s'au adaptat la un regim aproape identic, este foarte interesantă. Cred că am putea numi, cu drept cuvânt, această pasăre originală, „pisica zburătoare“.

ALEX. RUSCINSCHI
Asistent la Facultatea de Agronomie
din Chișinău

Moldavium. — Când, în 1894, Lord Rayleigh și W. Ramsay descoperiră argonul în aerul atmosferic, ei au dat un frumos exemplu al unei metode fizice admirabil pusă la punct. Deși din domeniul Chimiei, argonul a putut fi descoperit datorită preciziei, în Fizica experimentală, a măsurilor de densități ale gazelor, și astfel fizicienii au îmbogățit Știința cu încă un element.

Astăzi, descoperirea elementului 87 ne dă un exemplu analog al valorii și utilității de a ridica fără încetare precizia în măsurile experimentale. Este vorba de metoda analizei spectroscopice cu razele X, la a cărei perfecționare adăugându-se talentul de cercetător, a folosit unui compatriot al nostru, d. Horia Hulubei, profesor la Universitatea din Iași, să aducă la îndeplinire descoperirea importantă a acestui element.

Mendeleieff, care a clasificat în 1864 toate elementele cunoscute atunci, a lăsat ca un important corolar, încadrarea în tabloul său, a tuturor elementelor ce se vor descoperi în viitor. Mai tirziu, descoperirea spectrelor razelor X a arătat că tabloul pur formal a lui Mendeleieff corespunde unor însușiri naturale ale elementelor. Legea lui Moseley este aceea stăpînă care ordonează și numerează elementele, căci fiecare corp simplu are înscris în proprietățile sale numărul de ordine pe care trebuie să și-l însușească în mod natural în tabloul periodic. Și astfel, prin metoda spectrelor de înaltă frecvență, pe rînd, locurile disponibile din acest tablou minunat au început a fi ocupate: în 1922, hafnium, elementul care corespunde numărului 72; în 1925, masurium, elementul care corespunde numărului 43; tot în 1925, rhenium, elementul care corespunde numărului 72 și în 1926, florentium sau illium, elementul care corespunde numărului 61 din tabloul lui Mendeleieff.

În ultimii ani, cercetătorii au încercat să dea de rostul celor două elemente rămase necunoscute, corespunzătoare numerelor 85 și 87.

Elementul 87, după indicațiile tabloului lui Mendeleieff, face parte din familia metalelor alcaline, deaceia el a putut fi

bănuț — încă de multă vreme — că ar putea exista în natură, în diverse minereuri: polucită, lepidolită, samarskită. O serie întreagă de fizicieni au încercat numeroase metode, însă rezultatele au fost dela început contradictorii.

În anul 1936, d. prof. Horia Hulubei, pe atunci șef de lucrări la Facultatea de Științe din Iași, punînd la punct cu o înaltă precizie metoda de analiză prin raze X, găsește în polucită două din liniile spectrale specifice ($L\alpha_1$ și $L\alpha_2$) ce corespund elementului 87, pe care d. Hulubei îl botează *Moldavium* (Mi). Rezultatul acesta pozitiv, deși elementul se găsește în cantitate extrem de slabă și deși unii autori aveau pretenția de a-l fi găsit și ei, este demn de toată încrederea, căci eroarea dată de aparat este foarte mică, așa că liniile spectrale date de d. Hulubei nu se pot confunda cu ale altui element, fapt care nu se putea spune despre rezultatele altora. Rămînea doar să se elimine ușoara nesiguranță a evaluării liniilor spectrale, în ceiace privește scara lungimilor de undă și extinderea cercetărilor la alte minereuri.

Anul acesta, în ședința Academiei de Științe din Paris dela 2 Octombrie, d. H. Hulubei dă noi rezultate în ceiace privește existența în stare naturală a moldavium-ului, aducînd tehnicii spectroscopiei prin razele X, precizii nemaîntîlnite încă pînă astăzi. D-l Hulubei pornește prin a concentra elementul 87 pe cale chimică, din mineralul natural, polucita, găsind prin analiza razelor X linia caracteristică $L\alpha_1$ obținută și în cercetările anterioare. Cercetările sînt apoi îndreptate la alte minereuri ce conțin metale alcaline grele: berile, lepidolite și diverse săruri comerciale de rubidiu și cesiu. Rezultatele au fost negative. Din contra, unele minereuri radioactive: pechblende, sodite, o autunită-colombită din Bavaria au manifestat existența moldavium-ului. Cercetările acestea asupra noului element au dus, în același timp, la desăvîrșirea analizei spectroscopice cu raze X. Rezultate date de d. Hulubei, în special prin obținerea înregistrării fotometrice a liniilor spectrale, care înlătură cu desăvîrșire orice dubiu, ne arată că descoperirea elementului 87 este îndeplinită. D-l Hulubei a avut tot dreptul să-și încheie comunicarea d-sale cu aceste admirabile cuvinte: „Pour cet élément 87 j'ai proposé le nom de *moldavium* (Mi) en hommage à la Moldavie, province roumaine, marche avancée vers l'Est de la latinité.“

N. AL. FLORESCU

O lucrare botanică de mare valoare despre Cheia Turzii. — Comisia Monumentelor Naturii din România și-a propus să scoată niște publicații științifice, numite Memorii, care să fie niște lucrări monografice asupra celor mai principale monumente naturale din țară.

Nu de mult a apărut primul număr din aceste „Memorii”. Este o lucrare a d-lui Erasmus Nyárády, conservatorul Muzeului Botanic din Cluj, despre plantele vasculare din Cheia Turzii. Nici că se putea o alegere mai fericită.

D-l E. Nyárády este unul din cei mai competenți botaniști din România, iar regiunea studiată, „Cheia Turzii”, este cea mai interesantă stațiune de plante din țară.

În anul 1937, d. Nyárády a scos o monografie asupra topografiei Cheii Turzii. Acum a apărut o monografie botanică și urmează, după cum însuși autorul ne-o spune, să mai apară o lucrare care să trateze despre vegetația acestei regiuni. Studiul botanic pe care l-a publicat d. Nyárády despre Cheia Turzii prezintă o deosebită importanță.

Autorul începe lucrarea cu o introducere în care ne arată ce anume l-a determinat să facă acest studiu, precum și ce greutate a întâmpinat pînă ce a pus la punct această lucrare.

Pentru ca oricine să se poată orienta în ceiace privește distribuția geografică a diferitelor plante din Cheie, autorul ne dă o scurtă descriere topografică a acestei regiuni, însoțită de foarte frumoase și numeroase fotografii.

Într'un alt capitol ni se vorbește despre formațiile geologice și petrografice din Cheie. Urmează apoi un istoric al tuturor cercetărilor și publicațiilor asupra florei Cheii. În acest istoric sînt citate toate lucrările botanice despre Cheia Turzii, începînd cu documentul din 1291 a regelui Andrei II și pînă la lucrările scrise în ultimii ani. Pentru identificarea plantelor din Cheie, autorul a cercetat numeroase Herbare, care cuprind astfel de plante și în felul acesta a studiat plantele adunate nu mai puțin de 36 de colecții. Pe lângă aceste colecții de plante, autorul însuși a adunat un bogat material, căci a lucrat pe teren timp foarte îndelungat, în diferiți ani și în diferite timpuri ale anului.

În unul din capitole relativ la statistica florei autorul împarte plantele din Cheie după mai multe criterii și anume: 1) după mediul la care sînt adaptate; 2) după felul și situația locurilor de

creștere; 3) după zonele de altitudine și 4) după locul de origină a plantelor.

Se arată apoi că o parte din plantele din Cheie citate de unii botaniști au dispărut și între timp au apărut alte plante, care n'au fost citate în lucrările anterioare. Astfel d. Nyárády citează un număr de 266 specii noi pentru Cheie și din listele anterioare șterge 54 de specii. În afară de plantele ce cresc spontan în Cheie se mai găsesc vreo 30 specii cultivate. În total autorul citează din Cheie un număr de 988 specii de plante spontane cuprinzînd și 88 de subspecii, 76 varietăți și 83 forme. Din aceste plante sînt noi pentru știință 2 specii, 8 hibrizi sau specii de tranziție, 5 subspecii, 15 varietăți și 22 forme.

În Cheia Turzii se găsesc anumite plante care nu se mai găsesc în alte regiuni, deci sînt endemisme. Numărul acestor endemisme este de 3 specii, 10 hibrizi, 5 subspecii, 18 varietăți și 21 forme. Cea mai mare parte din aceste endemisme au fost descoperite și descrise de autorul acestei importante lucrări. Iată care sînt cele 3 specii și cei 10 hibrizi din Cheie: *Aconitum fissuræ* (Nyár.), *Carex Piroskana* (Nyár.), *Hieracium tordanum* (Zahn), *Carduus fissuræ* (Nyár.) cu 3 forme. *C. murorum* (Nyár.), *C. alghinae* (Nyár.), *C. Simonkaianus* (Nyár.), *Dianthus Julii-Wolfii* (Péterfi), *Sesell vario-dévénienense* (Nyár.), *Thymus honor-Ronnigeri* (Nyár.), *T. porphiriticus* (Nyár.), *Taraxacum levigato-Hoppeanum* (Nyár.) și *Valeriana Zoltánii* (Borbás).

În afară de plantele endemice, Cheia Turzii ascunde un număr de plante rare, care se găsesc în puține locuri în România, sau se găsesc numai în alte regiuni mai îndepărtate. Aceste plante sînt: *Asplenium lepidum*, *Carex brevicolis*, *Dracocephalum austriacum*, *Spiraea media*, *Saxifraga Rochelliana*, *Scrophularia lasiocaulis*, *Taraxacum Hoppeanum*, *Thalictrum foetidum* ssp. *alpestre*. *Viola Jooi*, *Ephedra distachya*, *Taxus baccata*, *Conringia austriaca*, *Ferula Sadleriana*, *Iris arenaria* și *Allium obliquum*.

Cea mai mare parte a lucrării o formează enumerația tuturor plantelor din Cheie. Pentru fiecare din cele 988 specii este citată toată literatura existentă asupra lor, precum și o amănunțită distribuție geografică. De aici se vede munca enormă pe care a depus-o autorul în alcătuirea acestui amănunțit studiu. Cel mai important capitol îl formează anumite observații critice pe care autorul le face unor specii, de ex.: *Poa concina* Gaud. *P. alpina* L., *Bromus fibrosus*

Hack., *Iris arenaria*, *Fagopyrum dumentorum*, *Dianthus cartusianorum*, *D. Simonkainus*, *Delphinium fissum*, *Aconitum anthora* L., *A. fissurae*, *Cardaminopsis arenosa*, apoi asupra genului *Sempervivum*, *Sorbus dacica* Borb., *Viola saxatilis* Schm., *V. banatica* Kit., *Seseli dévényense* Simk., și *S. varium* Trev.

Adnotațiile se încheie cu amănunțite studii asupra următoarelor genuri din Chee: *Peucedanum*, *Primula*, *Thymus*, *Scabiosa*, *Jurinea*, *Carduus* și *Taraxacum*. Prin aceste adnotații d. Nyárády stabilește numeroase specii, subspecii, variații și forme noi pentru știință. Ultimul capitol al acestei lucrări tratează despre Cecidiile din Cheia Turzii și aparține lui Mihai Ghiuță (Turda).

Această valoroasă lucrare a d-lui E. Nyárády conține și 67 de figuri precum și o hartă a Cheii Turzii.

Ca încheiere țin să spun că acest studiu încununează toate celelalte lucrări botanice ale d-lui Nyárády, care este un botanist desăvârșit, cu adevărat îndrăgostit de natură. Oricine își dă seama că pentru asemenea studii se cere o muncă enormă precum și numeroase sacrificii materiale. Ori, monograful Cheii Turzii, nu a precupețit vreodată munca și a făcut multe sacrificii materiale când a fost vorba de știință. Laudă lui!

MIHAI RĂVĂRUȚ

Folosirea vântului pentru producerea energiei electrice. — Încercări și realizări pentru captarea energiei maselor de aer în mișcare datează de multă vreme. Se pot cita astfel arhaicele mori de vânt, care transformă însă această energie direct în energie mecanică. În ultimul timp însă, această problemă a fost studiată mai de aproape, mai ales în Rusia, pentru o soluționare cât mai complexă. S'au realizat astfel instalații aeroelectrice, care transformă energia produsă de vânt în energie electrică.

O caracteristică a instalațiilor aeroelectrice este desigur variația continuă a energiei medii produse lunar, urmărind variațiile intensității și duratei vântului în locul considerat. Din această cauză, s'a constatat că este mai avantajos ca aceste instalații să funcționeze în paralel cu uzinele generatoare de energie electrică din apropiere. Cuplarea cu o uzină hidroelectrică are avantajul că permite o utilizare mai economică a debitului de apă disponibil, mai ales în regiunile unde acest debit variază. Cuplarea cu o centrală termică, permite de asemenea să se realizeze o economie de e-

nergie, însă mai puțin însemnată din cauza supleței mai reduse a acestor centrale.

În Rusia, la Balaclava în Crimeea, la cîteva kilometri de coasta Mării Negre, pe un platou ridicat, s'a construit o astfel de stațiune aeroelectrică de încercare. Cercetările făcute anterior au arătat că viteza medie anuală a vîntului în acest loc este de cca. 6 metri pe secundă. Pentru stațiunea aeroelectrică s'a întrebuintat o elice cu trei brațe care face în medie 30 ture pe minut și are o rază de 15 metri. Pe palele elicei sînt prevăzute niște suprafețe mici regulatrice, care permit să modifice, în mod automat, pasul brațelor elicei și să mențină constantă iuteala de rotație a acesteia la valoarea fixată, independent de variațiile continue ale vitezei vîntului. Acest reglaj automat al vitezei se face cu ajutorul unor greutateți mobile așezate în interiorul brațelor elicei și menținute într-o poziție de echilibru determinată prealabil cu ajutorul unor resoarte. Aceste greutateți sînt puse în legătură cu suprafețele regulatrice cu ajutorul unor sisteme de pîrghii. Elicea antrenează un generator asincron de cca. 100 kilowați. Elicea este mișcată cu axul ei spre vînt cu ajutorul unui motor de 1 kilowat care se mișcă pe o șină circulară. Acest motor este pus în mișcare în mod automat, cu ajutorul unui releu, de către o giruetă care este foarte sensibilă la schimbările de direcție ale vîntului.

Stațiunea aeroelectrică trimite curentul sub 6300 volți și poate fi pusă în paralel cu rețeaua electrică a orașului Sebastopol cu ajutorul unei linii aeriene de 2,5 kilometri. S'a prevăzut și un comutator, care taie automat legătura cu rețeaua, atunci cînd tensiunea produsă scade sub cea a rețelei, din cauza scăderii iuteții de rotație a elicei sub cea de regim (30 de ture pe minut).

Primele încercări cu aceste stațiuni aeroelectrice s'au făcut în 1931 iar funcționarea lor regulată a început în 1933. Cercetările făcute au arătat că realizarea de grupuri de astfel de stațiuni aeroelectrice cuplate în paralel ar fi mai avantajoase, de oarece s'ar compensa astfel parțial variațiile individuale ale randamentului.

În timpul din urmă stațiunilor aeroelectrice proiectate, de 1000 kilowați sînt prevăzute cu o elice avînd raza de 25 metri și produc o energie de cca. 2.300.000 kilowați-oră pe an.

Studiile, recent făcute în Germania, au arătat că marile uzine generatoare aeroelectrice pot fi realizabile și tehnic și

economic, și că ele ar conveni, mai ales, pentru țările sărace în combustibili și în energie hidroelectrică.

Problema creării de stațiuni generatoare hidroelectrice poate fi considerată că prezintă interes și la noi. S'ar putea astfel înființa stațiuni de cercetare a regimului vînturilor în toate regiunile unde sînt vînturi cu caracter dominant, ca în Banat, Nordul Moldovei și Basarabiei, și dealungul litoralului Mării Negre, pentru a se vedea dacă nu s'ar putea crea și la noi instalații generatoare hidroelectrice.

Energia electrică produsă de aceste instalații ar putea fi utilizată pe loc sau transportată și folosită pentru electrificări, instalații de forță, sau pentru instalații de pompare a apei potabile care ar putea fi folosită și la irigații cum este cazul mai ales în Sudul Basarabiei și Dobrogei, unde straturile aquifere sunt la adîncimi foarte mari de cca. 50—100 metri și unde problema obținerii apei potabile este de primă importanță.

Ing. VIRGILIU G. GHEORGHIU
Laboratorul de Electricitate, Univ. Iași

Al VI-lea centenar al Universității din Grenoble. — Fondată de ultimul Dauphin independent, Humbert II, la 12 Mai 1339, Universitatea din Grenoble și-a sărbătorit cu un fast deosebit 600 ani de existență în ziua de 14 Mai 1939.

Timp de trei zile au durat ceremoniile la care au participat reprezentanți ai tuturor Universităților franceze precum și ai altor Universități europene și americane. Parte din aceste ceremonii s'au ținut la Grenoble, la Teatrul Municipal sub președinția ministrului Instrucției publice *J. Zay*, iar parte în istoricul castel *Lesdiguières* dela *Vizille*, leagănul revoluției franceze și în centrele asociate Universității, și anume la *Valence* (localitate în care Universitatea din Grenoble a funcționat pînă la 1808) la *Vienne*, *Chambéry*, *Annecy*.

La Grenoble un cortegiu strălucit, prin robele de toate culorile și decorațiile pe care le arboraseră reprezentanții oficiali ai Universităților franceze și străine, a parcurs străzile principale ale orașului pînă la Teatru. Scena Teatrului în lumina becurilor prezenta un aspect din cele mai sărbătorești.

Draperiile, robele de toate formele, ca din timpul inchiiziției, uniforme strălucitoare care se amestecau cu hainele negre și chiar cu vestoanele unora, scînteierea decorațiilor și a fel de fel de colane, formau un decor dintre cele mai pitorești.

La masa din centru prezida Ministrul în haină neagră avînd alături pe rectorul *Sarailh*, într-o robă violetă pontificală, înconjurați de decanii facultăților și reprezentanții oficiali ai universităților străine.

Într-un înălțător discurs rectorul schițează istoricul Universității de șase ori centenară și arată luptele seculare pe care le-a dus orașul Grenoble pentru recîștigarea Universității sale transferate la *Valence* pînă la 1808, și care a numărat printre profesorii săi, între alții pe celebrul egiptolog *Champollion* și pe ilustrul fizician *Raoult* cunoscut prin experiențele sale de crioscopie din care el a dedus legile ce-i poartă numele.

După discursul rectorului delegații oficiali ai diferitelor universități, prezintă adresele omagiale.

Dintre universitățile românești au fost reprezentate numai cea din Cluj, prin profesorul *Sergescu* și cea din Iași prin subsemnatul. Celelalte n'au răspuns invitației și nici nu s'au scuzat.

Subsemnatul am prezentat o adresă omagială, care în traducere sună astfel:

„Universitatea din Iași se asociază din toată inima la aniversarea solemnă a celui de al șaselea centenar al Universității din Grenoble.

Ea adresează omagiul său de afecțiune și profundă admirație surorii sale mai mari care, timp de șase secole de existență, a contribuit la edificarea unui măreț și strălucit patrimoniu științific și literar.

Universitatea din Iași salută în Universitatea din Grenoble depozitarea geniului național și uman al Franței.

Este salutul recunoscător al sufletului românesc adresat spiritului francez”.

Solemnitatea dela teatru s'a încheiat prin decernarea — pentru merite excepționale — a titlului de *doctor honoris causa* unor personalități de samă ca: lordul *Halifax*, ministrul englez al afacerilor străine, apoi o serie de savanți străini, *Ganshof*, *Vischer*, Belgia; *Gutteridge* și *Tudor Edwards*, Anglia; *Bohr*, Danemarca; *Ahlmann*, Suedia; *Stankovič*, Jugoslavia; *Smith*, U. S. A.

În același timp profesorul *Grignoux*, dela Univ. din Grenoble este proclamat *doctor honoris causa* al Universității din Lausanne (Elveția).

După solemnități s'au făcut excursii în regiunile cele mai pitorești din Dauphiné și Savoie, au urmat banchete în care arta gastronomică franceză s'a întrecut pe sine însăși. La un restaurant din *Annecy*, un bucător din cei mai meșteri — emul inspirat al lui *Brillat-Savarin* — a fost proclamat *doctor honoris causa*

al gastronomiei, în hazul general și a fost fotografiat.

Universitatea din Grenoble deși cu o reputație mondială, mult timp a fost foarte săracă, fără laboratorii. Datorită însă utilizării căderilor de apă din munții învecinați (huila albă), orașul s'a transformat într-un centru industrial important, aducând după sine dela 1875 încoace dezvoltarea într-un tempo rapid și a Universității.

S'a creat *Institutul politehnic* cu anexele lui Școala de papetrie, de inginerie hidraulică, institutul de electrochimie, electrometalurgie. S'a înființat *Institutul de Zoologie* și cel de *Piscicultură* ca o stație de Salmonicultură la Vizille, condusă și astăzi de prof. L. Lèger, directorul institutului de Piscicultură.

Apoi *Institutul de Botanică*, cu grădina alpină dela Lautaret, *Institutul de Geologie* (director prof. Gignoux), *Institutul de Geografie alpină* (director prof. Blanchard); apoi *Institutul de Chimie* și în fine institutul Fournier de *Fizică și Matematici*. Iată atâtea creațiuni ale Facultății de Științe din Grenoble.

În fiecare an au loc cursuri pentru străini, care sînt atrași de frumusețile naturale în adevăr excepționale pe care le prezintă regiunea Dauphiné.

Actualmente Universitatea din Grenoble este una dintre cele mai populate din Franța. Numai în 1900 a avut peste 40.000 studenți străini de toate naționalitățile între care unii au devenit persoane care joacă astăzi roluri importante: *Prințul Konoye*, *Herr von Ribbentrop*, ministrul de externe al Reichului și *Ed. Daladier* premierul francez, care a fost profesor de istorie la Liceul din Grenoble.

C. MOTĂȘ

Bicentenarul Academiei de Științe din Suedia.—Anul acesta se împlinesc 200 de ani dela înființarea Academiei de Științe din Suedia. Cu această ocazie voi face un scurt istoric asupra dezvoltării acestei instituții, care a fost creată cu scopul de a contribui la progresul științelor utile.

Prima ședință a Academiei de Științe din Suedia s'a ținut la 27 Iunie 1739, iar statutele sale de organizare au fost aprobate abia la 31 Martie 1741. Chiar dela început s'a stabilit ca în sinul Academiei să nu se primească de cît oameni cei mai dotați ai țării, iar membrul care în răstimp de 2 ani nu prezenta o comunicare asupra activității sale, să fie exclus.

În 1746, numărul membrilor se ridica la 100. Tot în 1746, Academia a primit permisiunea de a publica „*Almanahul Suediei*”, revistă ce constituie și astăzi o sursă materială foarte importantă pentru această instituție.

Abia în 1798 s'a ajuns să se stabilească o oarecare ierarhie între diferitele ramuri ale activității; astfel, printre cele 7 grupe în care era împărțită activitatea, locul de frunte îl ocupau „economia națională și agricultura” și „industria și comerțul”. Începînd din 1818, cînd în postul de secretar a fost numit Berzelius, dezvoltarea Academiei de Științe din Suedia a luat un avînt neatinș pînă atunci. Prima grijă a ilustrului savant a fost să facă din această instituție un templu a științei pure; el a fuzionat într-una singură cele două grupe ale științelor aplicate și a mărit dela 4 la 7 numărul grupelor consacrate științelor naturale și medicinei. El a reformat radical modul de alegere al membrilor; astfel, inițiativa candidaturii revenea grupului interesat, iar noul membru era ales prin vot de membrii existenți.

În fiecare an, la 31 Martie, toți membrii Academiei se adunau în ședință solemnă și se trecea în revistă progresele realizate în diferitele ramuri ale științei. Prima manifestație de felul acesta a avut loc în 1821; cu această ocazie, comunicările din domeniul Fizicii și Chimiei au fost făcute de însăși Berzelius. Datorită stăruințelor lui Berzelius, Academiei i s'a dat un credit anual determinat, fapt ce i-a permis să-și procure diferite publicații științifice atît din țară cît și din străinătate și astfel să-și creeze una dintre cele mai frumoase biblioteci. O dată memorabilă în istoria Academiei de Științe din Suedia este anul 1895, cînd s'a înființat premiul Nobel de Fizică și Chimie. Diferitele descoperiri din 1905, 1920 și 1932 au condus la o reorganizare a acestei instituții, tinzînd să dea Fizicii și Chimiei locuri din ce în ce mai importante. Pe dealtă parte, în 1905 a fost înființat Institutul Nobel de Chimie, a cărui activitate a fost întreruptă în 1927 odată cu moartea directorului său Svante Arrhenius. În locul lui s'a înființat Institutul Nobel de Fizică teoretică condus de C. W. Oseen.

Astăzi, prin decret regal numărul membrilor Academiei de Științe din Suedia s'a ridicat la 130.

COZUBSCHI ELENA
licențiată în chimie

Cîteva aniversări și comemorări în Fizică, în 1939. — Progresul cunoștințelor, care este tendința firească a evoluției omeniei, este îndeplinit fie de cei ce izbutesc doar să așeze o cărămidă, fie de cei cu minți sculptoare, care pot ridica un întreg edificiu. Cei dintii, ne-numărați, își răzlätesc munca lor, fiind dați uitării sau chiar rămînînd anonimi. Ceilalți, făuritori ai unor rezultate bine închegate, au puterea de a cimenta ceea ce este răspîdit ici și colo, înscriindu-și numele în cartea istoriei omenirii. Acelaia au norocul de a li se mai aduce cîte un omagiu din cînd în cînd, așa cum încercăm noi în rîndurile de mai jos.

Se știe, că fenomenele de electrizare sînt cunoscute cu șase veacuri înainte de era creștină, și totuși electricitatea s'a dezvoltat atît de încet, încît cele cîteva importante observații făcute dela un veac la altul, rămîn date memorabile în știință. Din clipa cînd vechii greci se minunau de curioasele atracții electrostatice, pe care le exercită chihlimbarul frecat, au trecut un imens număr de generații de muritori, pînă cînd — în veacul al XVIII-lea — *Dufay* descopere cele două feluri de electricitate.

Charles-François de Cisternay Dufay s'a născut în Paris la 14 Septemb. 1698. Și-a început cariera ca ofițer în garda franceză. Din cauza sănătății, renunță la cariera militară dedicîndu-se ocupațiilor literare și științifice, ocupînd și postul de intendent șef la Jardin des Plantes. Scriind o serie de memorii în diverse domenii — Astronomie, Mecanică, Geometrie, Chimie, Botanică — este ales, în 1733, membru al Academiei de Științe.

Repetînd experiențele lui Stephen Gray asupra fenomenelor electrice, *Dufay*, suspendîndu-se de o coardă de mătăasă, constată că atunci cînd este electrizat, suferă pișcături în corp și se aude un zgomot la apropierea altei persoane. Cu această ocazie, descopere cele două genuri de electricitate pe care le botează: sticloasă și rîșinoasă. *Dufay* încearcă deasemenea să formuleze o teorie a fenomenelor electrice. Om pasionat, *Dufay* își neglija ocupațiile oficiale. A murit tîrziu, la 16 Iulie 1739, lăsînd ca succesor la Jardin des Plantes pe Buffon.

Printre oamenii de știință care s'au ridicat în timpul lui Napoleon Bonaparte, a fost și *Gaspard Baron de Prony*. S'a născut în apropierea Lyonului la 11 Iulie 1755. Primele studii le-a făcut la Școala de Poduri și Șosele. În timpul Revoluției

Franceze, face parte din una din comisiile delegate cu reforma măsurilor și greutateilor și cu măsurarea Franței, cu care ocazie de *Prony* izbuteste să alcătuiască o serie de table de logaritmi, formînd 17 volume, pe care le-a depus la Observatorul din Paris.

Între 1790-1796 publică importa operă: „Nouvelle architecture hydraulique“, iar cîteva ani mai tîrziu este recomandat ca succesor a lui Chézi, mare hidrolog, la Școala de Poduri. A fost printre primii membri ai Institutului Franței. În expediția din Egipt, printre alți savanți — Berthollet, Fourier, Monge — Napoleon alege și pe *de Prony*. Membru al mai multor societăți, încărcat de onoruri, moare la 29 Iulie 1839, la Paris.

Cînd în 1888, marele fizician H. von Helmholtz (1821—1894) s'a retras din activitatea didactică, la catedra sa dela Institutul de Fizică din Berlin, a lăsat ca succesor un fizician nu mai puțin vestit, pe *August Adolph Kundt*, dela a cărui naștere — 18 Noembrie 1839 la Schwerin, Macklenburg — se împlinește un veac anul acesta. A făcut studiile la Leipzig și Berlin, unde, în 1864, își trece doctoratul cu o lucrare despre polarizația luminii. După trei ani ajunge Privat Docent la Berlin, iar apoi profesor la Zurich (1868), la Würzburg (1870), la Strasbourg (1872) pentru a reorganiza noua Universitate, și în fine la Berlin (1888). *Kundt* a rămas în Fizică prin cercetări importante în Optică — cercetări asupra dispersiei anormale la lichide, vapori și pături subțiri metalice, și asupra rotației planului de polarizație la unele gaze, sub influența cîmpului magnetic, fenomenul Kundt — și în Acustică, unde a găsit o metodă ingenioasă pentru determinarea vitezei sunetului în gaze. A murit la 21 Mai 1894, la Israelsdorf.

În dezvoltarea electricității — și în special al aplicațiilor ei — elementul galvanic *Leclanché* a avut un rol important. Inventatorul acestui izvor de electricitate și-a legat numele de o invenție, care în aproape trei sferturi de veac, a ajuns cunoscută în lumea întreagă.

Elementul *Leclanché*, convenabil în întrebuințări deoarece este lipsit de reacții chimice, și deci nu se consumă atunci cînd nu funcționează, a fost pentru prima dată întrebuințat în Belgia. Tatăl inginerului *Leclanché* (acesta din urmă născut în 1839) din cauza opiniilor sale republicane este nevoit să părăsească Franța (1866), și la Bruxelles izbuteste să atragă

atenția Directorului general al telegrafului asupra invenției fiului său, și astfel, în 1868, guvernul belgian adoptă definitiv noul element *Leclanché* în serviciile telegrafice. În urma acestui succes, tânărul *Leclanché*, vine și el la Bruxelles unde instalează un mic atelier. Economia în construcția, ușurința în întreținere și în montare, au făcut ca acest element să fie introdus curînd în Olanda și în Elveția. Reușita începe a aduce inventatorului avantaje materiale, dar și neplăceri din partea unor falsificatori, care aducînd neînsemnată modificări elementului *Leclanché*, exploatau pe o scară întinsă brevetele lor. Tocmai în 1881, inginerul *Leclanche* obține din partea tribunalului din Bruxelles satisfacția deplină, falsificatorii fiind obligați la despăgubiri. Puțin timp după aceasta, 1882, inventatorul trece la cele veșnice.

N. AL. FL.

Cea mai mare adîncime din Oceanul Atlantic.¹⁾ Cea mai mare adîncime din Oceanul Atlantic a fost găsită, anul acesta, de către crucișătorul american „*Milwaukee*” prin metoda sondajului cu ecou. Această adîncime de 8742 metri s'a determinat în două locuri în regiunea dela nord de *Porto-Rico*, avînd următoarele coordonate geografice: 19°36' latitudine Nord și 68°9' longitudine West Greenwich.

C.

Numărul locuitorilor din Rusia și Germania. — Populația Rusiei Sovietice se ridică după recensămîntul făcut la 17 Ianuarie 1939, după primele date preliminare, la o cifră rotundă de 170.126.000 locuitori, locuind o suprafață totală de 21.176.000 km. p., ceea ce revine la o densitate medie de 8 locuitori pe 1 km. p. Creșterea populației din anul 1926 pînă azi este de 23,1 milioane, astfel că pentru creșterea anuală rezultă o cifră de 1,9 milioane. Totuși după datele oficiale creșterea anuală este declarată ca fiind de 3,2—3,5 milioane.

Populația Germaniei, după recensămîntul din 17 Mai 1939 este de 79 mil. 577.000. Dacă se adaugă la această cifră și populația din regiunea Memel (circa 153.000) și din Protectoratul Boemiei și Moraviei (cam 6,8 milioane) avem un total de 86,5 milioane.

Din anul 1910 regiunile care constituie astăzi marele stat german (afară de Memel și Protectoratul Boemiei și Moraviei)

au avut următoarea dezvoltare: în anul 1910 au 68,546 milioane, în 1925—73,139, în 1933—76,443 și în 1939 cuprind 79,577 milioane de locuitori. (Datele sînt luate din *Geographische Zeitschrift*, 45, 1939). Dacă la aceste cifre adăugăm și populația atît din Polonia ocupată cit și cea venită din țările baltice și Rusia, obținem un total de aproape 110 milioane de locuitori.

C.

Premiul Nobel pentru Fizică, în 1939. — Cea mai mare distincție în domeniul științelor a fost atribuită în anul acesta, pentru ramura Fizicii, profesorului *Ernest O. Lawrence* dela Universitatea Berkeley, din California. Răsplata aceasta nu încununează o întreagă carieră științifică, ci este prețul reșitei unui aparat—*ciclotronul*—imaginat de Lawrence, și pus apoi la punct împreună cu colaboratorii săi, și care aduce un folos imens în cercetările de structura materiei, cit și în alte domenii. Ciclotronul va fi al doilea aparat ingenios, după camera lui Wilson, atît de util în Fizica modernă.

E. O. Lawrence — născut în 1901 — s'a dedicat mai întîi cercetărilor asupra fenomenelor foto-emisive. Prin 1930, cînd încercările de a se obține pe cale artificială particule cu energii mari spre a servi la bombardări de atomi, s'a pus problema obținerii acestor particule cu ieșeli mari, fără a fi necesară întrebuintarea potențialelor electrice ridicate. W. deroe a dat principiul unei metode de accelerare liniară cu ajutorul unui cîmp electric oscilant, și întrebuintînd potențiale scăzute. Metoda dădea rezultate satisfăcătoare numai pentru particule grele, obținîndu-se energii de aproape trei milioane electron-volți. E. O. Lawrence, pentru a face metoda aplicabilă și în cazul ionilor de masă atomică mică, a avut ideea de a aplica un cîmp magnetic static normal pe cîmpul electric oscilant, astfel că particula accelerată de cîmp să fie deviată și supusă din nou acțiunii acceleratoare a cîmpului electric. Cînd perioada de rotație a particulei este egală cu a cîmpului oscilant, particula va fi supusă acțiunii cîmpului electric de fiecare rotație, cîștigînd astfel de fiecare dată energie. După un număr de rotații — efectuate după o spirală — particula are o energie suficientă, care poate fi echivalentă cu potențiale de peste cinci milioane de volți, deși, în realitate, nu s'au întrebuintat decît mai puțin de o sută de mii de volți.

În anii următori, Lawrence împreună

1) După *Geographische Zeitschrift*, 45, 1939.

cu colaboratorii săi, Stanley Livingston și Donald Cooksey, au izbutit să aducă aparatului acestuia de accelerație multiplă a ionilor, o sumă de perfecționări în scopul de a mări debitul ionic și de a ameliora condițiile de întrebuințare ale ionilor la sfârșitul traectoriei lor.

Ciclotronul are numeroase și importante aplicații. Ionii eșiți din aparat, bombardând, de exemplu, beriliu produc neutroni, care sînt utilizați cu mult succes în biologie. Tot în cercetările biologice, ciclotronul este întrebuințat în producerea radioactivității artificiale, deoarece substanțele astfel obținute — cum este fosforul și ferul — au aceleași proprietăți ca și cele radioactive naturale. Efectele asupra țesuturilor maligne par a captiva pe mulți cercetători. În Fizica nucleară, ciclotronul aduce, desigur, rezultate nebanuite, și desemenea utilizarea lui va fi mai frecventă.

În anul 1937, E. O. Lawrence a primit premiul Comstock al Academiei Naționale de Științe, iar mai apoi medalia Hughes

a Societății Regale din Londra. Revista engleză „Nature” consideră pe Lawrence — binemeritat — ca un experimentator genial. Revista adaugă că, Lawrence nu este numai un director respectat al unui laborator de cercetări, dar, mai cu samă, un valoros prieten al aceluia care lucrează cu el.

N. AL. F.

PERSONALIA

D-l N. Al. Florescu, asistent la Laboratorul de Electricitate, și-a susținut teza de doctorat în Fizică, intitulată: *Permeabilitatea magnetică axială a firelor și păturilor subțiri de fer, în câmpuri magnetice de înaltă frecvență*, în ziua de 17 Octombrie 1939.

D-l Sergiu Cărăușu, asistent la Stațiunea Zoologică marină de la Agigea, și-a susținut teza de doctorat în Zoologie, intitulată: *Amphipodele de tip caspian în apele românești*, în ziua de 17 Octombrie 1939.

Dări de samă

O carte elementară nouă de Biologie generală. — În editura Casei Școalelor și a Culturii Poporului, a apărut de curînd „Biologie generală” pentru clasa VII-a normală Buc. 1939, 166 pag., 90 fig. Lucrarea este datorită d-lui C. Lacrițeanu, unul dintre cei mai distinși profesori secundari de Șt. Naturale.

Scrisă într-un stil clar și curgător, ea cuprinde o serie de scurte capitole tratînd principalele probleme ale biologiei, ca de ex ; a apariției vieții, a evoluției sau transformismului, a eredității și a legilor ei, a adaptării la mediu ; apoi teoriile evoluției (Lamarckism, Darwinism, mutaționism).

Acest manual elementar de biologie mai cuprinde, noțiuni sumare de embriologie (ovogeneză, spermatogeneză, fecundație diviziunea oului, învelișuri embrionale); noțiuni de clasificare a regnului animal și vegetal; noțiuni despre specie, varietate, rasă.

În partea a doua: „Mediurile”, autorul dă caracterile sumare ale principalelor medii, mediul stepic, forestier, lacustru și marin, mai ales din țara noastră. Lucrarea se termină cu un interesant capitol asupra unității materiei în univers.

Recomand cu toată căldura, manualul elementar de biologie generală, al d-lui C. Lacrițeanu, în special profesorilor de curs secundar de Șt. Naturale.

C. MOTAȘ

I. Simionescu: *Flora României*. (Bibl. Enciclopedică Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 437 pag., 665 fig. și XII, planșe, Buc. 1939).

Este un nou volum adăugit la acele atît de numeroase ale academicianului nostru atît de sîrguitor, care ne-a prezentat de rînd pămîntul țării noastre, fauna și flora lui, în pagini din care reiese clar marea dragoste a sa pentru plaiurile noastre și pentru vietățile animale și vegetale care le locuiesc.

Ca și celelalte lucrări similare, după cum el însuși spune în prefața lămuritoare, nici această lucrare „nu e o lucrare savantă, care rămîne să fie alcătuită de specialiști”.

Autorul prezintă lumea plantelor din România sub aspectul variației ei, a asociațiilor în care trăiesc plantele și a biologiei lor.

Lucrarea aceasta, foarte bogat ilustrată, cuprinde cinci capitole: plantele de pri-

mavară, plantele de pădure, cele din locuri deschise, de pe lângă ape și plantele de pe terenurile cultivate.

Autoțul arată răspîndirea și biologia lor, dînd totdeauna numirea populară, pe lângă cea științifică. Versuri populare și strofe de poezie cultă, referitoare la flori și arbori, sînt presărate ici și colo și foarte la locul lor într-o astfel de lucrare, fără asprimea și rigiditatea lucrărilor strict științifice.

Flora Romîniei, va împlini un gol real, pînă se va alcătui una de către specialiști. Ea va servi profesorilor de științe naturale precum și studenților noștri, punîndu-le la îndămină o mulțime de date, cu privire la plantele pămîntului romînesc. C. M.

Ion Simionescu. *Mamiferele Pliocene dela Cimișlia (Romînia)* I Carnivore, 30 pag., 25 fig. și 3 planșe. II Helladotherium, 24 pag., 24 fig. și 4 planșe. III Proboscidiieni, 22 pag., 12 fig. și 3 planșe (Ac. Rom. Publ. Fond. Adamachi Tomul IX, fasc. L, LI și LII, Buc. 1938-39).

Condițiile de viață pe continentul Eurasiatic, în timpul Pliocenului inferior, au fost foarte prielnice dezvoltării mamiferilor, în cît așa zisa faună cu *Hiparion* se descopere destul de des sub formă de zăcăminte fosilifere importante. Aceste zăcăminte sînt răspîndite pe toată aria geografică care ar începe din Algeria, ar trece prin nordul și nord-estul Europei, apoi prin vestul Siberiei și ar ajunge pînă'n China de răsărit.

Pe lângă cele două zăcămintе fosilifere importante din răsăritul țării noastre, în care se găsesc mamifere pliocene ce au fost descrise de autorii ruși (e vorba de zăcămintele dela Turachia și Cioburciu, din estul jud. Tighina), s'a mai descoperit în ultimii zece ani încă un zăcămint, foarte bogat în mamifere, la Cimișlia în vestul județului Tigh'na.

Săpăturile au fost conduse de d-l N. Moroșan, însă descrierea speciilor găsite a început a fi făcută pînă acum în trei broșuri, de către d-l Prof. I. Simionescu, avînd în colaborarea sa pe D-nele El. Dobrescu și Virg. Barbu. Materialul prezentat este conservat ireproșabil, iar descrierea diferitelor forme, desenele cît și planșele sînt impecabile și sînt în acelaș timp o strălucită cheazășie că întreaga monografie, care va mai urma încă într'o altă serie de broșuri, va alcătui un tot ce va da încă o operă monumentală pentru știința paleontologică romînească, adăugîndu-se la celelalte existente datorite, în bună parte, tot d-lui Prof. Ion Simionescu.

N. MACAROVICI

Henry Le Chatelier : *De la Méthode dans les Science expérimentales.* Ed. Dunod Paris, 1936. 320 pag. Prețul 25 frs.

H. Le Chatelier (1850—1936) care a închinat cercetărilor din domeniul Chimiei un timp de aproape 60 de ani, este creatorul științei industriale. Spre deosebire de mulți ingineri, care servind tehnica nu înțeleg rostul muncii închinată acelei sublimе preocupări a științei pure, Le Chatelier a crezut în binefacerile științei. Deși pornit ca tehnician, preocuparea sa importantă a fost știința aplicată, fie dedicîndu-se desinteresat obținerii de noi cunoștințe, fie lucrînd în vederea rezultatelor industriale.

Începîndu-și cariera ca profesor, la Școala de Mine, trecînd apoi la College de France și în sfîrșit la Sorbonne, Le Chatelier a fost pătruns dela primele începuturi de rolul dascălului, care trebuie „să întipărească în mintea elevilor încrederea în întrebuițarea metodei științifice și să dezvolte astfel facultățile intelectuale, în loc să caute a mobila memoria lor“. Anii săi de profesorat i-au cristalizat astfel o serie de idei în ceiace privește metoda în științele experimentale, pe care le expune în cartea de față. Cu vreo 15 ani mai înainte aceleași idei au fost publicate sub titlul „Science et Industrie“; sub forma actuală, singura deosebire este doar în ceiace privește încrustarea cu un șir de exemple culese din cercetările personale ale autorului. Prin aceasta, cartea apare lipsită de generalitate, pentru că oricîtă experiență ar avea cineva, el este un specialist, și numai metodele specialității sale nu totdeauna pot fi luate ca exemple fericite pentru a indica valoarea și drumul metodei în științele experimentale.

Cartezian convins, Le Chatelier după ce enunță fraza: „Metoda este una din părțile cele mai importante ale științei“, care justifică, că scopul cărții este expunerea principiilor fundamentale ale metodei științifice, face să înțelegem că la baza științei există importanta noțiune filosofică, aceea a *determinismului*: „A nega determinismul, este a nega știința“.

Partea principală a lucrării — primele 9 capitole — începe prin expunerea a patru principii generale: principiul lui tabula rasa (Descartes), principiul diviziunii (Descartes), principiul organizării muncii (Taylor) și principiul întrebuițării ipotezelor (Claude Bernard).

Scopul ultim al științei fiind cunoașterea legilor naturii, mijloacele de investigații sînt, în mod necesar grupate. Autorul expune astfel, succesiv; despre

observația faptelor și mecanismul descoperirilor, despre măsuri experimentale, aparate de observație și erori, despre o raționament și despre legi.

Ultima parte, care alcătuiește restul de opt capitole, conține o interesantă expunere, și în același timp o pledoarie, asupra științei industriale. Se întâlnesc numeroase afirmații de o justă indiscutabilă, afirmații care în mod obișnuit sînt trecute cu vederea.

Prin expunerea principală a sistemului de organizare al muncii preconizat de Taylor, precum și al unor idei asupra învățămîntului științific și tehnic — ca complectare a primei părți — putem trage concluzia că materia tratată în cartea de față, avînd o aplicație absolut generală, se referă în special la metoda în științele experimentale *aplicate*. În acest sens, cartea lui H. de Chatelier își atinge ținta, și rămîne o carte utilă.

N. AL. FLORESCU

Albert Einstein et Léopold Infeld:
L'évolution des idées en physique. Bibliothèque de Philosophie scientifique. Ed. Flammarion, Paris, 1938. 198 pag. Preț 22 frs.

Firul conducător al prezentei cărți este evoluția cugetării și a ideilor în Fizică, în decursul timpului. Nu este vorba de ceiace mintea omenească a putut să nască, de aparatele simple sau complicate care ne ajută în orice clipă, ci de înțelegerea faptelor haotice, de mersul și tendințele raționamentului științific și de rezultatele gîndirii creatoare a omului.

Cea mai veche ramură a Fizicii teoretice este Mecanica, a cărui fondator a fost Galileu. Cu Galileu se introduce în știință pentru prima dată raționamentul științific. Epoca aceasta marchează trecerea dela modul de a gîndi a lui Aristot, la altul nou care a adus știința actuală.

Felul acesta superior de investigație în domeniul necunoscutului, prin raționament și prin concepte fizice — adică creații ale spiritului — duseseră încă dela început să se creadă că, s'a ajuns la o sinteză măiastră a fenomenelor naturii, la o disciplină perfectă: Mecanica. Huygens, un fizician olandez, scria în una din celebrele sale cărți, pe la 1690, că: nu se pot concepe fenomenele naturii decît prin raționamentele Mecanicii; fără acestea nu se va ajunge niciodată să se înțeleagă Fizica.

Astfel, în primul capitol autorii vorbesc despre nașterea conceptului mecanic, adică introducerea legilor lui Newton

ca o concepție fundamentală, atît în Mecanica clasică, cît și în toate ramurile Fizicii, căci „toate fenomenele fizice pot fi explicate prin acțiunea forțelor de atracție și de respingere, care depind numai de distanță și se exercită între particule invariabile“. Dar valabilitatea acestui concept mecanic, aplicat cu succes în vechile teorii, ale fluidelor electrice și în teoriile luminii, a întîmpinat dificultăți în domeniul fenomenelor electrice și magnetice. Valoarea forței de atracție sau de respingere depinde și de iuțeala încălzirii. În mod analog în Optică, enigma care stăruie în ceiace privește natura mediului în care se propagă undele, a dus deasemenea la declinul conceptului mecanic.

Locul conceptului mecanic îl ia conceptul de cîmp. Acest nou concept, apărut în veacul al XIX-lea, a prilejuit atît formularea ecuațiilor lui Maxwell — care s'au arătat atît de fecunde în domeniul fenomenelor optice și electrice — cît și nașterea teoriei relativității. Întreg capitolul al treilea, în care sînt expuse acestea, este de o claritate desăvîrșită, unul din autori fiind dealtfel promotorul unor îndrăznețe idei, ce se găsesc chiar enunțate în cuprins. Că teoria relativității accentuează importanța continuului spațiu-timp, că generalizează legile Mecanicii sau aduce accentuarea legăturii dintre masă și energie, nu înseamnă că Mecanica clasică rămîne fără de valoare. Deși autorii scriu că: „Teoria relativistă modifică legile Mecanicii“, adaugă apoi: „Consecințele experimentale ale teoriei relativității generale nu diferă decît foarte puțin din cele ale Mecanicii clasice“.

Ultimul concept, care s'a impus imperios în urma diverselor fapte din domeniul atomic, este acel al quantelor. Quantele au impus ca legile Fizicii să fie valabile pentru mulțimi iar nu pentru indivizi.

Cartea este scrisă cu un admirabil spirit critic, și va antrena pe mulți cetitori, dacă—după sfatul din prefață al autorilor—nu va fi citită în același fel ca un roman.

N. AL. FLORESCU

Erasmus Iuliu Nyárády: *Enumerarea plantelor vasculare din Cheia Turzii*. (Memor. Comit. Monum. Naturii din România. Nr. 1, 317 pag., 67 fig., 1 hartă. București, Monitorul Of., 1939).

Cu această frumoasă monografie asupra plantelor vasculare din vestitele chei ale Turzii, Comisia Monumentelor Naturii din România inaugurează o nouă serie

de publicații științifice intitulate „Memorii”. În prefața acestui prim memoriu, președintele Comisiei Monumentelor Naturii, prof. Al Borza arată în câteva cuvinte importanța monografiei d-lui Nyárády.

Este „după Borza, un valoros studiu sistematic o enumerație critică care pune la punct inventarul floristic al celei mai interesante stațiuni de plante din țară, și va fi temelia sigură pentru viitoare studii fitosociologice, ecologice și relative la istoria vegetației noastre, pentru care flora Turzii este o arhivă revelatoare, ca puține alte flore locale”.

M. C.

L. Rodewald: *Systematische und ökologische Beiträge zur Tardigradenfauna Rumäniens*. (Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. ökol., u. Geographie d. Tiere, Bd. 72, H. 3/4, 1939, p. 225—254, 8 fig. 3 hărți).

Autorul menționează 37 Tardigrade în România, din 1908 de când au fost studiate și pînă astăzi. Contribuția sa personală este cea mai importantă. El descrie pe scurt 15 forme și apoi dă ecologia acestor curioase animale. Tardigradele trăiesc în mușchii terestri, în ape dulci și în mușchii acuatici de genul *Sphagnum* și chiar în mediu uscat.

Autorul arată faunele care trăiesc în fiecare din acești biotopi și raporturile dintre ele și mediu. Citează și faune eurice sau euritope. La urma lucrării se găsesc considerații zoografice asupra Tardigradelor și interesante date despre „relictele glaciare”.

C. M.

Sălăgeanu N.: *Contribution à la méthode de détermination de l'intensité de l'assimilation chlorophyllienne et de la respiration des feuilles aériennes, à de courts intervalles de temps*. (Ann. Scient. Univ. Jassy, vol. XXV, fasc. I, pg. 240—258, 1939; 5 fig. în text și 4 tablouri).

Autorul descrie un aparat imaginat de d-sa pentru a determina, la intervale scurte, atât asimilația clorofiliană, cât și respirația într-o atmosferă de CO_2 normală. Construcția aparatului este bazată pe principiul microspirometrului lui *Thunberg-Winterstein* și se compune în esență dintr-un vas de asimilație-respirație și unul de compensație, identice, situate pe un sistem de agitație electric. În fiecare din aceste vase pune câte 100 cm^3 soluție tampon *Warburg*, care menține constantă concentrația normală de CO_2 a atmosferei vasului, iar în vasul de asimilație-respirație se pune și materialul viu (de exemplu, frunze).

Ambele vase sînt legate între ele printr-un capilar gradat, în care un index de petrol arată variațiile de volum din vase în timpul experienței.

Pentru ca temperatura să fie menținută foarte constantă, cele două vase sînt cufundate în apă într-un cristalizor. Temperatura dorită este dată de un încălzitor electric și menținută cu ajutorul unui termoregulator foarte sensibil, imaginat de autor și uniformizată printr-un agitator electric. Lumina necesară experienței provine din o sursă artificială (electrică).

În lucrarea sa, autorul arată și modul cum se poate calcula ușor valorile reale ale asimilației și ale respirației, ajungînd, printr-o serie de calcule, la o formulă relativ simplă care este constanta aparatului. Volumul în mm^3 de gaz absorbit sau emanat de plantă e obținut prin produsul acestei constante cu deplasare în mm a indexului de petrol în lungul capilarului.

În lucrare se găsesc detalii asupra construcției și funcționării aparatului, precum și a modului de iluminare și de calculare a intensității luminoase în cazul cînd se lucrează cu un singur aparat sau cu două simultan.

V. V. RADU

I. Gr. Mihăilescu: *Sur un cas de jaunissement rapide à l'obscurité chez les feuilles de *Polygonum cuspidatum** (Bull. Scientif. Acad. Roum. vol. XXI, No. 9-10, 1939; 6 pag. 4 fig. în planșă).

Autorul studiază factorii care contribuiesc la îngălbenirea frunzelor de *Polygonum cuspidatum* în timpul toamnei. Face două serii de experiențe. În o primă serie, acopere o parte din frunzele alese cu bande de hîrtie neagră, pentru a le feri de lumină. După zece zile constată că regiunile acoperite, deci ferite de lumină sînt decolorate, galbene; restul frunzei rămîne verde. Deci distrugerea clorofilei se face mai repede la întuneric decît la lumină. La această distrugere (în cazul experiențelor) contribuie și temperatura mai ridicată, căci hîrtia neagră absoarbe radiațiile calorice.

Într-o a doua serie de experiențe, autorul își alege o serie de frunze de *Polygonum cuspidatum* de diferite mărimi, și la fiecare întrerupe nervurile numai pe o parte a nimbului. După 6 zile, jumătatea frunzei cu nervurile intacte îngălbenise, pe cînd jumătatea operată rămăsese verde (afară de unele dintre frunzele cele mai mari). După aceia frunzele au fost recoltate și puse la în-

tuneric și mediu umed și la temperatura de 23° — 24° (superioară celei de afară, de unde au fost luate frunzele).

În aceste condiții se constată că părțile rămase verzi se îngălbenesc foarte repede și cu atât mai repede, cu cât frunzele sînt mai mari (cam într-o oră). Autorul presupune că această decolorare rapidă este posibilă dacă se socotește că în părțile menținute verzi, cloroplastele se găseau într-o stare de dezorganizare destul de avansată, cu pigmentul aproape separat de stromă. Cele mai mici schimbări ale condițiilor externe turburînd mediul intern al celulelor, provoacă desăvîrșirea distrugerii pigmentului.

V. V. RADU

Dr. V. D. Mârza: *Histophysiologie de l'Ovogenèse.* (Actualités Scient. Industr. Nr. 751, Paris, 1938).

Lucrarea de sinteză de 80 pagini, în care autorul arată, cu ajutorul datelor existente și prin cercetări personale, aspectele morfologice, biologice histofisiologice ale ovogenezei. Lucrarea cuprinde trei mari capitole: 1) Morfologia ovogenezei, 2) considerații biologice generale și 3) fiziologia ovogenezei și a vitelogenezei.

În primul capitol, după ce arată liniile generale ale ovogenezei începînd dela goniile primordiale, autorul stăruie mai îndelung asupra perioadei de creștere care cuprinde trei faze, fiecare cu cîte două etape bine caracterizate. În primele două faze ovulele cresc încet (faze de creștere lentă), iar în ultima din ele cresc foarte repede (fază de creștere rapidă). Această din urmă fază este caracteristică ouălor foarte bogate în vitelus și (sub alt aspect) ouălor dela Mamifere (oligolecite secundare) care se știe că în multe privințe se comportă ca ouăle telolecite. Această fază se deosebește de celelalte două premergătoare prin apariția vitelusului alb și a celui galben, formarea latebrei și a nucleului lui Pander.

În acest capitol se mai găsesc date interesante asupra perioadelor extra și intrafoliculare, asupra modului de formare a vitelusului, asupra varietăților de globule viteline, etc.

În al doilea capitol, după ce sînt arătate modalitățile principale după care ovulele sînt atașate de ovar, sînt studiate relațiile dintre cantitatea de vitelus din ouă și modul de dezvoltare al embrionilor (palingenică și coenogenică), apoi influența anumitor factori externi asupra cantității de vitelus (la t^0 joase precum

și la salinitate mare ouăle sînt mai numeroase și mai sărace în vitelus, în condiții opuse e invers). Relativ la schimbările de substanțe dintre embrionul în dezvoltare și mediul extern, autorul arată că ele sînt cu atât mai reduse cu cît ouăle sînt mai bogate în rezerve de săruri și de apă. Dezvoltarea intrauterină a embrionului la Mamifere (și la alte grupe de animale vivipare) ar fi similară cu o revenire la mediul oceanelor primitive (prin salinitatea mediului intern).

În capitolul al treilea d. dr. Mârza studiază ritmul și viteza de creștere a foliculilor ovarieni, studiînd în special asupra fazei de creștere rapidă în legătură cu factorul fiziologic și cu secrețiile interne. Este interesant paralelismul pe care autorul îl face între dezvoltarea ouălor lecitice și telolecitice dela Vertebrate și a ouălor oligolecitice secundare dela Mamifere: luînd în considerare dimensiunile întregului folicul, curba creșterii este superpozabilă în ambele cazuri. Cauza acestei asemănări este apariția unei mari cavități foliculare la Mamifere, care are drept rezultat situarea ovulului într-o cavitate liberă și apoi apropierea ovulului de suprafața ovarului, ușurînd astfel pontă.

Interesantă deasemeni este documentarea altui fenomen în legătură cu creșterea ovulelor și anume mobilizarea substanțelor de rezervă din organismul animalului, de multe ori tocmai în perioada de subalimentare sau de inaniție (la poikiloterme), inaniția prelungită provocînd această mobilizare a rezervelor.

La homeoterme, unde hrănirea se face în mod constant, o parte din materiile necesare vitelogenezei vin direct din alimente, o altă parte din rezerve. În acest caz însă inaniția nu mai joacă nici un rol în mobilizarea rezervelor, care este provocată aici de acțiunea secrețiilor interne și mai ales a hormonului oestrogen produs de hipofiză, care-și manifestă acțiunea sa în deosebi în faza de creștere rapidă a ovulelor. Alți hormoni hipofizari provoacă hiperfuncțiunea tiroidei, a paratiroidei, a timusului, a suprarenalei, modificînd astfel în mare grad metabolismul animalului paralel cu vitelogeneza. În acelaș timp pancreasul endocrin intră în hipofuncțiune, provocînd o hiperglicemie indispensabilă ovogenezei. Foliculina, care apare în ovar tot sub influența hipofizei, este antagonistă tocmai hormonilor gonadotropi ai acesteia, căreia-i contrabalansează acțiunea și-i dă o anumită ritmicitate. Acestei ritmicități îi corespunde o ritmicitate a pontei.

Regret că spațiul unei recenzii nu-mi permite să stăruiesc mai pe larg asupra acestei interesante lucrări, unde ansamblul de noțiuni legate de ovogeneza este bine documentat și susținut prin exemple alese din întreaga serie animală și prin numeroase figuri și grafice deosebit de sugestive. În felul cum este tratată chestiunea, autorul ne duce la convingerea nesilită că, în toată seria animală, ovogeneza poartă aceleași trăsături, dar că la diferitele grupe de animale ea nu parcurge toate etapele, ci se oprește mai de vreme sau mai târziu, după complexul condițiilor de viață în care trăesc animalele.

În legătură cu aceasta trebuie să apăsăm asupra unui fapt biologic de o importanță capitală și mult discutat în evoluția viețuitoarelor și anume că celulele germinale (germenul) nu au o viață independentă în organism (soma), ci, după cum este arătat atât de limpede în lucrarea de față, dezvoltarea lor este strâns legată de condițiile mediului în care trăiește animalul și prin acesta, indirect, de condițiile mediului extern.

V. GH. RADU

Alexe Arvat: *Vegetația dela Copanca.* (Tip. „Tiparul Moldovenesc”, Chișinău 1939).

Autorul acestei lucrări este un distins institutor din Chișinău, care de dragul Științelor Naturale a făcut și jiceul și apoi a studiat aceste științe la Universitatea din Iași. Fiind un botanist pasionat, încă înainte de a fi licențiat în Șt. Naturale se ocupa în mod foarte serios cu studiul acestei discipline.

D-l Arvat are câteva interesante contribuții la flora României, descoperind în același timp și câteva plante noi pentru știință. Lucrarea de față este o cercetare monografică făcută în cadrul Institutului Social Român, asupra satului Copanca din jud. Tighina. În prima parte a lucrării se tratează despre vegetația din împrejurimile satului arătându-se care sînt asociațiile tipice de plante. Tot în această parte se dă o listă completă a plantelor dela Copanca. În a doua parte a studiului se vorbește despre amestecul omului în viața asociațiilor vegetale, arătînd cum modifică omul în diferite moduri vegetația unei regiuni. Ultima parte este o interesantă contribuție etnobotanică, dînd o serie de numiri populare de plante

împreună cu credințele și întrebunțările cunoscute de populația dela Copanca. Dacă am avea în literatura noastră botanică numeroase asemenea lucrări asupra diferitelor regiuni ar fi foarte mult îndepărtată umbra botanică ce există asupra unei bune părți din România.

M. R.

Emilian Țopa: *Vegetația halofitelor din Nordul României în legătură cu cea din restul Țării.* (Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți, XIII, 1939, cu 1 schiță, 11 figuri și 13 tabele).

În această lucrare autorul studiază din punct de vedere fitosociologic după metoda Braun-Blanquet, un număr foarte mare de sărături din Nordul României fiind tratate vreo sută de specii. Cu această ocazie autorul verifică un număr de plante fie dubioase, greșit interpretate, critice sau neglijate din cuprinsul țării noastre. Lucrarea prezintă 6 capitole.

În primul se arată metoda de lucru întrebunțată în acest studiu.

În cap. II se vorbește despre sărăturile din nordul României arătîndu-se răspîndirea și originea lor, apoi raportul între solul sărat și vegetație.

În cap. III tratează despre ecologia halofitelor indigene, insistîndu-se asupra factorilor edafici, climatici și biotici. În special asupra factorilor biotici autorul ne dă relații prețioase despre: simbioză, polinizare, răspîndirea fructelor și a semințelor, parazitism, influența omului, etc. În cap. IV, autorul vorbește despre vegetația halofitelor din N. României, făcînd și o clasificare fitosociologică în care încadrează asociațiile holofite. Tot în acest capitol sînt date foarte numeroase releveuri fitosociologice efectuate în diferite sărături din regiunile studiate.

În concluzie, autorul printre altele, propune ca să se facă două rezervații naturale, una pe valea Jijiei (Iacobeni) și alta la Pîrlița (Ungheni).

Ar fi de dorit ca Com. Mon. Nat. regională din Moldova să țină samă de aceste propuneri.

Ca încheiere putem spune că lucrarea d-lui Emilian Țopa prezintă o deosebită valoare fiind singura lucrare de acest fel asupra halofitelor și aducînd o reală contribuție botanicii românești.

MIHAI RĂVĂRUȚ

Literatură științifică română

REVISTE:

Buletin Scientifique de l'École Polytechnique de Timișoara. Tome 9, Fasc. 1-2, 1939. Cu următorul sumar: *Michail St. Botez*: Sur la zone de convergence des quelques séries syntagmatiques; *M. Vincenzo G. Cavallaro*: Sur la géométrie du triangle; *M. V. Thébault*: Sur des cercles associés à un triangle; *W. Barrett*: Sur la structure des groupes semi-simples réels; *Théofil T. Vescan*: La théorie des courbes définies comme l'intersection des deux surfaces représentées paramétriquement; *M. Michel Ghemănescu*: Détermination de la pression dans les bouches à feu; *Ion Protopopescu*: Supralărgirea și supraînălțarea căii în curbă; *Prof. Ing. Bonea*: Citeva considerațiuni asupra determinării planului secant în proiecțiunea steriografică; *St. I. Mateescu*: Le sédiments de couleur rouge et la formation répétée des sols latéritiques dans les régions Carpatiques de Roumanie; *Ing. Ștefan A. Nadașan*: Rezistența dinamică a fontei.

Annales de l'Institut National Zootechnique de Roumanie. Tome VII, 1939, cu următorul sumar: *Personnel technique de l'Institut National Zootechnique*; *Publications de l'Institut National Zootechnique*; *Prof. G. K. Constantinescu*: Untersuchungen über die vererbung der schwarzen farbe bei den rumänischen schafen: tzurkana und tzigaiarasse; *Dr. G. Moldoveanu* et *Dr. I. Popa*: Recherches craniologiques sur le porc mangalitza de Roumanie; *Dr. A. Mauch*: Beitrag zur kenntnis der Körperform und der konstitution bei milchkühen; *Dr. P. Stanica*: Contribution à l'étude de l'élevage et de l'exploitation des moutons en liaison avec les mises bas précoces d'hiver; *Dr. G. Zaharia*: Recherches sur la dépigmentation de la laine des moutons de race karakul; *Dr. Maria Timoffeev*: Recherches sur le rapport qui existe entre la qualité de la fourrure à la naissance et la moëlle de la laine à l'âge adulte pour la race karakul; *Dr. E. Tatulea*: Contributions à la connaissance du matériel avicole de Roumanie; *Dr. Lucie Nicolau*: Recherches comparatives histo-etnologiques sur la peau des races porcines York et Mangalitza; *Dr. G. Dinulesco* et *Dr. O. Pîrvesco*: Recherches sur la pigmentation mélanique cutannée des truites et sur certains facteurs qui font varier l'intensité de la pimentation; *Dr. D. Foișoreano*: Recherches sur quelques substances larvicides pour les hypodermes; *Dr. I. Răduță*: Contributions à l'étude de la croissance et détermination de l'âge du turbot de la Mer Noire; *Rhombus-Maeoticus Pallas*; *Dr. Xenia Petrov*: Recherches morphologiques sur les races de vers à soie bombyx mori en Roumanie; Autres travaux de l'Institut National Zootechnique publiés pendant l'année 1937.

Natura. Revistă pentru răspîndirea științei. Apare lunar în București, str. Carol nr. 26, sub conducerea d-lor I. Simionescu și O. Onicescu, prof. universitari, secretar de redacție fiind d. R. Călinescu, conferențiar. Revista a încheiat anul al XXVIII-lea, Nr. 10, Oct.; Nr. 11 și 12, Dec. 1939. Conține articole din toate domeniile științei, numeroase note, rețete practice, însemnări și bibliografie științifică.

Gazeta matematică. Apare lunar în București, Calea Griviței 158, și este una din cele

mai vechi reviste românești. La 1 Septembrie 1939 a pășit în anul al 45-lea. Nr. 1, Sept.; Nr. 2, Oct.; Nr. 3, Noembrie și Nr. 4, Decembrie.

Revista Matematică din Timișoara. Este condusă de d. Prof. V. Alaci, dela Școala Politehnică. Anul XIX, Nr. 10, Decembrie 1939.

Pitagora. Revistă de Matematici. Condusă de d. prof. N. N. Mihăileanu; este utilă în special elevilor de liceu. Anul V, Nr. 1, Octombrie 1939. București, str. Popa Nan Nr. 157.

Gazeta Farmacilor. București, str. General Anghelescu 145. Este condusă de d. Aurel Scurtu. Anul 5, Nr. 55, Noembrie 1939.

Revista Științelor Medicale. București, Splaiul Independenței 105. Publică articole generale și lucrări originale. Vol. XXVIII, Nr. 10, Oct.; Nr. 11, Noembrie 1939.

Revista de Endocrinologie, Ginecologie și Obstetrică. Apare la Cluj, Clinica Ginecologică și Obstetricală. Publică articole de specialitate. Anul IV, Nr. 1, Oct.-Decembrie 1939.

Foaia Plugarilor. Anul XIII, Nr. 9-10, Sept.-Octombrie și Nr. 11-12, Noembrie-Decembrie 1939. Interesează în special pe agronomi și veterinari. Apare la Chișinău. Laboratorul de Zootehnic. Facultatea de Agronomie.

Revista Pădurilor. Organul Societății „Progresul Silvic”. Anul 51, Nr. 9, Septembrie; Nr. 10, Octombrie; Nr. 12, Decembrie 1939. Publică studii și articole de silvicultură. București, B-dul Take Ionescu Nr. 31.

Tinerimea Română. Apare lunar ca organ al vechii societăți științifico-literare Tinerimea Română. Anul 58, Nr. 1, Septembrie; Nr. 3, Noembrie și Nr. 4, Decembrie 1939. București, B-dul Schitu Măgureanu Nr. 4.

Școala Basarabeană. Revista Asociației corpului didactic primar din Municipiul Chișinău, str. I. C. Brăteanu Nr. 87.

Viața Basarabiei. Revistă lunară. Apare la Chișinău sub direcția d-lui Pantelimon Halipa. Anul VII, Nr. 9-10, Septembrie-Octombrie și Nr. 11-12, Noembrie-Decembrie 1939. Strada Hara-lambie Nr. 142.

CĂRȚI: 1)

Instrucțiuni pentru prepararea și întrebuințarea insecticidelor și fungicidelor. Editată de Stațiunea Fitopatologică din Chișinău. Ed. V-a, 1939.

Ing. At. M. Haralamb și Ing. M. Ene. — Monografia piscicolă a râului Cașoca, afluent al Buzăului. Extras din Analele Institutului de Cercetări și Experimentație Forestieră, Seria I, Vol. IV, 1938, 20 pagini.

V. Alaci, profesor. — Trigonometrie patratică. Tabela conținând logaritmi sin. și cos. patratice ale arcelor cuprinse între 0° și 90°, din minut în minut (cu cinci zecimale).

G. G. Constantinescu. Criteriile de convergență ale seriilor cu termeni constanți. Biblioteca Revistei Pitagora. Monografia Nr. 1, 1939, 48 pagini. Prețul 25 lei.

1) În ordinea primirii.

A APĂRUT:

FLORA ROMÂNIEI

de
ION SIMIONESCU

Biblioteca Enciclopedică.
Fundajia pentru Literatură și Artă
„Regele Carol II“

437 pag., 665 figuri și 12 planșe,
București, 1939

PREȚUL 200 LEI

A APĂRUT:

INTRODUCERE IN ELECTRICITATE ȘI MAGNETISM

Inducția. — Curentul alternativ. — Unde și oscilații electromagnetice. — T. F. S. — Electroni, raze pozitive, raze X. — Radioactivitatea. — Electricitatea atmosferică.

DE
ȘT. PROCOPIU

Profesor la Universitatea din Iași

EDIT. LABORATORULUI DE ELECTRICITATE

Vol. II, 336 pag., 214 figuri. Preț 250 lei

A APĂRUT:

Punerea în valoare a apelor de munte

de
Prof. C. MOTAȘ

și
Ing. Agr. V. ANGHELESCU

160 pag., 1 hartă și numeroase figuri

Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului
Imprimeria Națională, București 1939

A APĂRUT:

Cursul de Mecanică

Partea I-a

Noțiuni elementare asupra vectorilor
Calcul algebric, diferențial și integral.
Teoria potențialelor. Teoria câmpurilor.
Noțiuni asupra tenzorilor. Exerciții

DE
Dr. IOAN I. PLĂCINȚEANU

Profesor de mecanică la Universitatea din Iași

EDITURA LAB. DE MECANICĂ IAȘI — 1939

140 pag. Preț 100 lei, pt. studenți 50 lei

A apărut:

Călăuza Ceahlăului

Se poate comanda la Soc. de Gimnastică, Sport și Muzică, str. Șc. de Arte, IAȘI **Lei 30**

LES ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE JASSY

Organe de la Société Scientifique de Jassy

Apare în două părți:

I. Matematici și Fizico-Chimice. II. Științe Naturale.

Fiecare parte cuprinde două fascicule, care apar la 1 Ianuarie
și 1 Iunie.

Pentru orice privește redacția și administrația, a se adresa D-lor Profesori
OCTAV MAYER sau I. GH. BOTEZ (Universitatea Iași).

A APĂRUT:

INTRODUCERE ÎN ELECTROCHIMIE

DE

P. B O G D A N

Profesor la Universitatea din Iași

La autor

Lei 80

A APĂRUT:

CĂLĂUZA EXCURSIONISTULUI LA MAREA NEAGRĂ

DE

A. POPOVICI-BĂZNOȘANU

ȘI

M. A. IONESCU

Ed. Cartea Românească, Buc.

Lei 90

A APĂRUT:

FAUNA ROMÂNIEI

DE

Prof. I. SIMIONESCU

Membru al Academiei Române

Editura Fundației pentru Literatură și
Artă „Regele Carol II”, București

Lei 200

A APĂRUT:

ȚARA NOASTRĂ

Oameni—locuri—lucruri

de **I. SIMIONESCU**

Profesor la Universitatea din București

Cu 249 figuri, 4 hărți și 24 planșe

Prețul lei 200.

Se poate comanda prin
CARTEA ROMÂNEASCĂ

A APĂRUT:

PLANTE VASCULARE

cuprinzând și chei dichotomice pentru de-
terminarea până la genuri a Briofitelor din
împrejurimile orașului Iași

DE

CONSTANTIN PAPP

Profesor de Botanică la Facultatea de Științe
din Iași

ȘI

MIHAI RĂVĂRUT

Asistent al Laboratorului de Botanică
al Facultății de Științe din Iași

1938 — Editura Laborat. de Botanică din Iași
Prețul 20 lei

CEL MAI MODERN

INSTITUT DE ARTE
GRAFICE ȘI EDITURA

BRAWO

CONST. BRAHĂ & EM. WOLOTZKY

IAȘI, STRADA ARCU N^o. 9

execută ori-ce lucrări tipografice cu prețurile cele mai avantajoase